

副高卫生职称《中医内科学》（题库）预测试卷五

[单选题]1. 患者，男，60岁，患痢疾月余未愈。泻下（江南博哥）白凉，时或清稀，肛门坠胀，常久蹲于厕不起。腹部隐痛，喜温喜按，体瘦形寒，四肢不温，食少神疲，诊见舌淡苔白，脉沉弱。首选方剂为

- A. 黄连阿胶汤加减
- B. 桃花汤合真人养脏汤
- C. 不换金正气散加减
- D. 理中汤加减
- E. 连理汤加减

参考答案：B

[单选题]2. 对伤寒诊断及预后具有指导意义的检查是

- A. 血白细胞总数
- B. 肥达反应
- C. 嗜酸粒细胞计数
- D. 血小板计数
- E. 肝功能

参考答案：C

参考解析：血小板计数、肝功能对伤寒的诊断及预后均无意义；白细胞总数仅有参考价值；肥达反应对诊断有意义。只有嗜酸粒细胞计数对诊断及预后均有意义，伤寒患者该细胞减少或消失，若高于5%可除外伤寒，病情好转时该细胞逐渐恢复正常。故标准答案为C。

[单选题]3. 女，47岁。下痢反复发作4年余。3天前因食海鲜后，出现腹痛腹泻，大便每天3~4次，大便为黏液血便，纳食减少，倦怠怯冷，舌质淡苔白腻，脉虚数。首选治疗方为

- A. 连理汤
- B. 理中汤
- C. 桃花汤
- D. 补中益气汤
- E. 真人养脏汤

参考答案：A

[单选题]4. 某阳黄病人，经治黄疸消退后，症见脘腹作胀，胁肋臃痛，不思饮食，肢体困倦，大便时秘时溏，舌苔薄白，脉弦细。治疗宜用

- A. 香苏散
- B. 四逆散
- C. 逍遥散
- D. 柴胡疏肝散
- E. 归脾汤

参考答案：C

[单选题]5. 女，病由抑郁而起，症见腹部结块，或左或右，走窜不定，按之略痛，腕肋胀闷不舒，暖气频频，便艰纳呆，苔薄，脉弦，证属

- A. 聚证—肝气郁结
- B. 聚证—食滞痰阻
- C. 积证—气结血瘀
- D. 积证—气郁血阻
- E. 积证—瘀血内结

参考答案：A

[单选题]6. 男，34岁。近日腹胀或痛，时有如条状物聚起在腹部，按之则胀痛更甚，纳食减退，大便秘结，舌苔腻，脉弦滑，证属

- A. 气滞血阻型积证
- B. 气结血瘀型积证
- C. 肝郁气滞型聚证
- D. 食滞痰阻型聚证
- E. 肝气夹痰型聚证

参考答案：D

[单选题]7. 女，50岁。症见积块坚硬，疼痛渐重，面色萎黄或黧黑，肌肉瘦削，饮食锐减，舌淡紫，无苔，脉弦细。其治法为

- A. 理气活血，通络消积
- B. 理气活血，软坚散结
- C. 理气活血，祛瘀软坚
- D. 补益气血，活血化瘀
- E. 通滞去积，活血化瘀

参考答案：D

[单选题]8. 女，腹中积块，按之觉硬，痛处不移，面暗消瘦，体倦乏力，纳食减少，时有寒热，经闭不行，舌质青紫，脉涩。辨证属于

- A. 肝郁气滞型
- B. 食滞痰阻型
- C. 气郁血阻型
- D. 瘀血内结型
- E. 正虚痰结型

参考答案：D

[单选题]9. 男，38岁。症见腹中积块，胀满疼痛，按之软而不坚，固定不移，舌苔薄白，脉弦。最佳选方是

- A. 六磨汤
- B. 逍遥散
- C. 膈下逐瘀汤
- D. 少腹逐瘀汤

E. 柴胡疏肝散合失笑散

参考答案: E

[单选题]10. 病人腹部胀大3个月余, 肋下胀痛不适, 纳食欠佳, 食后腹胀, 小便短少, 下肢微肿, 面色晦暗, 周身皮肤发黄, 腹胀大, 肋下可触及包块, 双下肢按之微肿, 苔白腻, 脉弦细, 应诊断为

- A. 水肿
- B. 胁痛
- C. 黄疸
- D. 积聚
- E. 鼓胀

参考答案: E

[单选题]11. 男, 52岁。患肝病多年而不愈, 近月来胀大坚满。脘腹撑急难忍, 烦热口苦, 渴而不欲饮, 小便短赤, 大便溏垢, 舌边尖红, 苔黄腻, 脉弦数, 属何病证

- A. 气滞湿阻型鼓胀
- B. 寒湿困脾型鼓胀
- C. 水湿浸渍型水
- D. 水热蕴结型鼓胀
- E. 肝脾血瘀型鼓胀

参考答案: D

[单选题]12. 病人腹大胀满, 按之如囊裹水, 胸脘胀闷, 得热稍舒, 精神困倦, 怯寒懒动, 大便稀溏, 小便短少, 舌苔白腻, 脉缓。其治疗的主方为

- A. 胃苓汤
- B. 实脾饮
- C. 调营饮
- D. 柴胡疏肝散
- E. 中满分消丸

参考答案: B

[单选题]13. 男, 45岁。平素嗜酒10余年, 每天饮酒400g, 近半月来腹大坚满, 脉络怒张, 肋腹刺痛, 面色黯黑, 面颈胸臂有多个血痣, 呈丝纹状, 手掌赤痕, 口渴不欲饮, 舌质紫红, 脉细涩。此鼓胀证属于

- A. 气滞湿阻型
- B. 寒湿困脾型
- C. 湿热蕴结型
- D. 瘀结水留型
- E. 肝肾阴虚型

参考答案: D

[单选题]14. 某中年男性病人因情绪紧张诱发成疾, 烦渴多饮, 口干舌燥, 舌

红，苔黄燥，脉象洪大。该病例中医方剂当选

- A. 消渴方
- B. 二冬汤
- C. 白虎加人参汤
- D. 玉女煎
- E. 增液汤

参考答案：C

[单选题]15. 女，42岁。久病肌衄，头晕心悸，身疲乏力，低热，面色无华，甲爪色淡，失眠健忘，食少纳呆，月经量多，舌淡苔少，脉细弱。该病人中医病机为

- A. 气血亏虚，外受风邪
- B. 气不统血，血虚阳浮
- C. 气虚血脱
- D. 亡血气脱
- E. 血瘀致虚，气血亏虚

参考答案：B

[单选题]16. 男，21岁，长期偏食，晨起头面肿甚一年，动则下肢肿胀，能食而疲乏无力，纳可，便溏，小便多，舌淡胖大有齿痕苔薄腻，脉软弱。治以何方加减

- A. 真武汤
- B. 参苓白术散
- C. 实脾饮
- D. 己椒苈黄丸
- E. 五皮饮合葶苈大枣泻肺汤

参考答案：B

[单选题]17. 女，全身水肿，皮肤绷紧光亮，胸脘痞闷，烦热口渴，经与疏凿饮子治疗，未见好转，肿势日趋严重，兼见气粗喘满，倚息不得卧，脉弦有力，证属

- A. 瘀血内阻于胸
- B. 肾不纳气
- C. 清阳不升，浊阴不降
- D. 水在胸中，上迫于肺
- E. 痰湿壅肺

参考答案：D

[单选题]18. 女，低热3月。余，时觉身热心烦，热势随情绪好坏而起伏，平素急躁易怒，胸胁胀闷，两乳胀痛，月经不调，口苦，舌略红，苔薄黄，脉弦略数。中医辨证为

- A. 气郁发热

- B. 气滞血瘀
- C. 血瘀发热
- D. 阴虚火旺
- E. 郁热伤阴

参考答案：A

[单选题]19. 某病人干咳，咳血，口干咽燥，潮热，盗汗，面色潮红，舌红少津，脉细数。治疗宜

- A. 补肺汤
- B. 左归丸
- C. 右归丸
- D. 沙参麦冬汤
- E. 四物汤

参考答案：D

[单选题]20. 男，素体不强，易反复感冒，气短懒言，自汗，时寒时热，舌质淡，苔薄白，脉虚弱。此时治疗当选何法

- A. 健脾益气
- B. 养阴润肺
- C. 补益肺气
- D. 补益心气
- E. 益气固肾

参考答案：C

[单选题]21. 男，52岁。症见形寒肢冷，少气懒言，大便溏泄，腹痛肠鸣，且每因受寒而加重，舌淡，苔薄白，脉弱，治疗宜选用

- A. 拯阳理劳汤
- B. 右归丸
- C. 左归丸
- D. 附子理中丸
- E. 六君子汤

参考答案：D

[单选题]22. 女，32岁，一个月前感冒后发咳嗽，服药无明显好转，现干咳，咽燥，咯血，潮热，盗汗，面色潮红，舌红少津，脉细数，其辨证为

- A. 肺气虚
- B. 肺阴虚
- C. 气阴两虚
- D. 心阴虚
- E. 肾阴虚

参考答案：B

[单选题]23. 男，20岁，2天前因受凉后感头身酸痛、恶寒、发热、咽痛，旋即

出现颜面及双下肢浮肿，尿少色黄赤，腰痛，咽喉红肿疼痛，舌暗红、苔薄黄，脉浮滑数。辨证为

- A. 风热证
- B. 风水相搏
- C. 水湿浸渍
- D. 湿热壅盛
- E. 痰热壅肺

参考答案：B

[单选题]24. 男，69岁，平素体弱多病。现症见腰酸背痛，小便失禁，畏寒肢冷，下利清谷，舌质淡胖，苔白，脉沉迟。此时辨证属于

- A. 肾阳虚
- B. 脾阳虚
- C. 肾阴虚
- D. 脾气虚
- E. 肝血虚

参考答案：A

[单选题]25. 胸痹总属本虚标实之证，其标实之证，除下列哪项以外，均为常见

- A. 气滞
- B. 血瘀
- C. 痰浊
- D. 寒凝
- E. 火邪

参考答案：E

[单选题]26. 痫病的基本病理因素

- A. 风阳痰浊，蒙闭心窍，流窜经络
- B. 风火扰动，蒙闭心窍，流窜经络
- C. 心肝火盛，热闭心窍，流窜经络
- D. 气滞血瘀，神机失用
- E. 气机逆乱，风阳内动

参考答案：A

[单选题]27. 以下不属于肺癆主症的是

- A. 咳嗽
- B. 咯血
- C. 潮热
- D. 咳吐腥臭痰
- E. 盗汗

参考答案：D

[单选题]28. 下列哪一项不是癲病发病的主要因素

- A. 阴阳失调
- B. 情志抑郁
- C. 痰气上扰
- D. 气血凝滞
- E. 外感六淫

参考答案：E

[单选题]29. 除哪项外均为失眠的病因

- A. 情志所伤
- B. 饮食不节
- C. 外邪侵袭
- D. 素体虚弱
- E. 心虚胆怯

参考答案：C

[单选题]30. 咳嗽的基本病机是

- A. 肺气失宣
- B. 肺气虚弱
- C. 肺失宣肃，肺气上逆
- D. 痰气阻肺
- E. 卫表失和

参考答案：C

[单选题]31. 外感咳嗽常常以哪种邪气为先导

- A. 寒邪
- B. 暑邪
- C. 燥邪
- D. 风邪
- E. 湿邪

参考答案：D

[单选题]32. 下列哪项不是鉴别风寒与风热感冒的依据

- A. 恶寒发热的孰轻孰重
- B. 口渴与不渴
- C. 咽喉疼痛与否
- D. 鼻塞与否
- E. 脉象的浮紧与浮数

参考答案：D

[单选题]33. 痰浊壅肺，咳逆痰涌，胸满气急，苔浊腻，方宜用

- A. 二陈汤
- B. 桑白皮汤
- C. 三子养亲汤

- D. 葶苈大枣泻肺汤
- E. 泻白散合黛蛤散

参考答案: C

[单选题]34. 男, 78岁。喘促日久, 动则喘甚, 呼多吸少, 气不得续, 形瘦神疲, 跗肿, 汗出肢冷, 面白唇紫, 舌淡苔白脉沉弱。此时选方宜

- A. 六味地黄丸
- B. 左归丸
- C. 右归丸
- D. 金匱肾气丸
- E. 十全大补丸

参考答案: D

[单选题]35. 女, 26岁。近两月来因工作压力较大, 精神紧张, 夜间经常失眠, 入睡困难, 入睡后易惊醒, 心烦不安, 心悸, 头晕健忘, 偶有耳鸣, 腰酸, 口干咽燥, 舌质红, 脉细数。其治疗宜用

- A. 安神定志丸
- B. 交泰丸
- C. 丹栀逍遥丸
- D. 黄连阿胶汤
- E. 归脾汤

参考答案: D

[单选题]36. 男, 70岁。多种慢性病迁延难愈, 现虚烦不寐, 形体消瘦, 易疲劳, 头晕健忘, 纳少, 面色发白, 舌淡, 脉细弱。其治疗宜用

- A. 酸枣仁汤
- B. 天王补心丹
- C. 归脾汤
- D. 安神定志丸
- E. 朱砂安神丸

参考答案: C

[单选题]37. 男, 50岁。因失眠多梦半月余就诊。现不寐, 入睡困难, 心烦口苦, 头重如裹, 胸闷, 舌红苔黄腻, 脉滑数。其治法是

- A. 滋阴清热, 镇心安神
- B. 疏肝泻热, 佐以安神
- C. 补养心脾, 以生气血
- D. 化痰清热, 和中安神
- E. 益气镇惊, 安神定志

参考答案: D

[单选题]38. 女, 55岁。因反复失眠多梦3个月就诊, 现夜难入眠, 兼头重, 胸脘满闷, 心烦口苦, 头晕目眩, 痰多, 大便不爽, 舌红苔黄腻, 脉滑。其方剂



最佳选择为

- A. 归脾汤
- B. 黄连阿胶汤
- C. 半夏秫米汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 黄连温胆汤

参考答案: E

[单选题]39. 病人心烦不寐, 心悸不安, 有时头晕耳鸣, 手足心热, 口干津少, 腰酸, 大便干, 舌红苔少, 脉细数。此时方剂宜

- A. 黄连阿胶汤
- B. 归脾汤
- C. 交泰丸
- D. 琥珀多寐丸
- E. 安神定志丸

参考答案: A

[单选题]40. 女, 56岁。长期患精神抑郁症, 刻下见眩晕心悸少寐, 心烦易怒, 舌质红, 苔少, 脉弦细而数, 治疗方剂宜选

- A. 左归丸
- B. 右归丸
- C. 六味地黄丸
- D. 滋水清肝饮
- E. 归脾汤

参考答案: D

[单选题]41. 女, 26岁。有精神分裂症史, 刻下见性情急躁易怒, 胸闷胁胀, 嘈杂吞酸, 口干而苦, 大便秘结, 头痛, 目赤, 耳鸣, 舌质红, 苔黄, 脉弦数。治疗方剂宜选

- A. 柴胡疏肝散合左金丸
- B. 丹栀逍遥散合左金丸
- C. 滋水清肝饮合左金丸
- D. 知柏地黄丸合左金丸
- E. 龙胆泻肝汤合左金丸

参考答案: B

[单选题]42. 女, 39岁。长期精神抑郁, 刻下见多思善虑, 心悸胆怯, 少寐健忘, 面色不华, 头晕神疲, 食欲不振, 舌质淡, 脉细。此时辨证为

- A. 肝气郁结
- B. 气郁化火
- C. 阴虚火旺
- D. 心脾两虚

E. 忧郁伤神

参考答案: D

[单选题]43. 男, 36岁。平素性格内向, 近日情志不遂, 精神抑郁, 情绪不宁, 善太息, 胸胁胀痛, 痛无定处, 脘闷暖气, 腹胀纳呆, 大便时软时干, 苔薄腻, 脉弦。辨证属何证

- A. 肝气郁结
- B. 气郁化火
- C. 气滞痰郁
- D. 心脾两虚
- E. 忧郁伤神

参考答案: A

[多选题]1. 黄疸以哪几项为主症

- A. 目黄
- B. 爪甲黄
- C. 身黄
- D. 齿垢黄
- E. 小便黄

参考答案: ACE

[多选题]2. 虚喘治在肺肾, 针对脏腑病机, 可采用

- A. 补肺益气
- B. 纳肾
- C. 温阳
- D. 养阴
- E. 固脱

参考答案: ABCDE

[多选题]3. 脾胃虚寒之胃痛, 其治疗可选用:

- A. 黄芪建中汤
- B. 大建中汤
- C. 苓桂术甘汤
- D. 理中汤
- E. 正气天香散

参考答案: ABD

[多选题]4. 内伤发热之痰湿郁热证的选方是

- A. 丹栀逍遥散
- B. 黄连温胆汤
- C. 导痰汤
- D. 中和汤
- E. 归脾汤

参考答案：BD

[多选题]5. 石淋除有排尿涩痛外，还有如下特点

- A. 尿中夹有砂石
- B. 排尿时突然中断
- C. 尿色深红
- D. 尿道窘迫疼痛
- E. 突发一侧腰腹绞痛难忍

参考答案：ABDE

[多选题]6. 属于中满分消丸的药物组成有

- A. 厚朴、枳实、黄连、黄芩
- B. 苍术、白术、莪术、三棱
- C. 知母、半夏、陈皮、茯苓、猪苓
- D. 泽泻、砂仁、干姜
- E. 姜黄、人参、白术、炙甘草

参考答案：ACDE

[多选题]7. 腰痛主要与哪几种病症鉴别

- A. 腰软
- B. 痹病
- C. 痿病
- D. 痉病
- E. 肾着

参考答案：AE

[多选题]8. 何项不属厥证辨证论治范围

- A. 高血压脑病昏厥
- B. 低血糖昏厥
- C. 外感病中手足厥冷
- D. 休克所致晕厥
- E. 暑厥

参考答案：CE

[多选题]9. 下列哪项因素与黄疸的形成有关

- A. 长期嗜酒无度
- B. 过食肥甘厚腻
- C. 饮食污染不洁
- D. 饥饱失常
- E. 恣食生冷

参考答案：ABCDE

[多选题]10. 主要与胁痛相鉴别的病症为

- A. 痞满

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/198052031060006035>