专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年河北省馆陶县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库含答案【黄金题型】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.疾病预防和控制中心（www.cdagov.cn）收载的主要内容是

A：国内外医学新闻、最科研动态

B：有关感染性疾病的预防信息

C：综合药学信息，药学服务

D：卫生事业发展的总体规划和战略

答案：B

2.治疗滴虫性阴道炎可应用的处方药是

A：硝酸咪康唑栓

B：甲硝唑栓

C：聚甲酚磺醛栓

D：克霉唑栓

答案：C

3.属于渗透性泻药，成人起始剂量每日30ml，早餐时一次性服用，糖尿病患者应慎用的是

A：比沙可啶

B：欧车前

C：乳果糖

D：聚乙二醇4000

答案：C

4.顺应人体生物节律的变化，适宜清晨给药的是

A: 鞣酸蛋白

B: 地塞米松

C: 强力泻药

D: 洛伐他汀

答案：B

5.药学服务的特殊人群

A: 医务人员

B: 血液透析者

C: 广大公众

D: 护理人员

答案：B

6.可引起血清尿素氮降低的是

A: 严重肝病

B: 急性胰腺炎

C: 胃溃疡

D: 肾衰竭

答案：A

7.（2021年真题）头孢曲松钠与乳酸钠林格注射液直接混合,可导致（）

A: 产生胶状不溶物

B: 微浑浊或沉淀

C: 溶液变色

D: 产生气体

答案：B

8.以下的论述哪项是错误的

A：普萘洛尔不可抑制肾素的分泌

B：硝普钠可用于高血压危象和慢性心功能不全

C：氢氯噻嗪作为基础降压药可单用于轻度高血压，也可与其他降压药合用，提高疗效，减少不良反应

D：氢氯噻嗪不可与普萘洛尔合用于治疗高血压

答案：D

9.氟西汀与血浆蛋白的结合力强，使同服的华法林或洋地黄毒苷游离型浓度超出安全范围归属

A：药物制剂因素

B：药物的使用

C：药理作用

D：药动学相互作用

答案：D

10.“利大于弊才有实际意义”体现选择治疗药物的

A：有效性

B：安全性

C：经济性

D：方便性

答案：A

11.患尿路感染，在无病原学结果前，一般首选

A：针对革兰阴性杆菌有效的抗菌药物

B：针对革兰阳性球菌有效的抗菌药物

C: 针对革兰阳性杆菌有效的抗菌药物

D: 针对革兰阴性球菌有效的抗菌药物

答案：A

12.患者，男，65岁，慢性咳嗽、喘息10余年，活动后症状明显，近7天症状加重入院，伴便秘，每周2次排便。既往有高血压病史12年；长期口服硝苯地平控释片30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温36．6℃，P82次／分，R22次／分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿啰音，杵状指。辅助检查：血常规WBC11．2×109／L，肺功能FEV1／FVC60％，FEV155％。治疗方案如下：氨溴索注射液30mgtidivgtt，莫西沙星氯化钠注射液0.4gbidivgtt，异丙托溴铵溶液0.5mgbid雾化吸入，布地奈德混悬液1mgbid雾化吸入

A: 氨溴索注射液

B: 异丙托溴铵注射液

C: 布地奈德混悬液

D: 硝苯地平控释片

答案：B

13.某男性，27岁，间断上腹痛3年，表现为餐后痛，1～2小时后缓解，以冬春季多发。

A: 法莫替丁+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

B: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂

C: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

D: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁

答案：C

14.主要用于降低三酰甘油的药物是

A: 考来烯胺
B: 普罗布考
C: 贝丁酸类
D: 他汀类
答案：C

15.以下药物中，最可能引起嗜酸性粒细胞增多的是
A: 坎地沙坦
B: 甲基多巴
C: 泼尼松
D: 头孢哌酮
答案：D

16.患者，女，63岁，患有支气管哮喘3年。近日出现咳嗽、多痰、发热（体温38.7℃）等症状，家人来药店购药。针对患者的情况，药师给予的建议是
A: 建议头孢氨苄胶囊250mgqid、氨溴索10mlqd、右美沙芬15mgtid在家治疗
B: 建议家属送患者去医疗机构就诊
C: 建议左氧氟沙星胶囊400mgqd、氨溴索10mltid、对乙酰氨基酚300mgqid在家治疗
D: 建议头孢克洛干混悬剂250mgtid、愈创木酚甘油醚片0.2gtid、布洛芬0.2gqid在家治疗
答案：B

17.影响核酸合成的药物是
A: 放线菌
B: 培美曲塞

C：依托泊苷

D：顺铂

答案：B

18.与胆酸螯合剂合用，应提前至少2h服用的是

A：螺内酯

B：依折麦布

C：他汀类与烟酸联用

D：依曲康唑

答案：B

19.肾移植术后发生排斥反应时，会使淋巴细胞

A：不稳定

B：增多

C：前期减少后期增多

D：减少

答案：B

20.使用硫酸亚铁片预防缺铁性贫血，元素铁的预防量是

A：60mgqd

B：60mgbid

C：100mg/次

D：60mgtid

答案：A

21.静滴、静注不良反应发生率较高

A：生活和饮食习惯

B：药物的使用

C：生理因素

D：药物制剂因素

答案：B

22.关于透析患者使用磷结合剂的下列叙述错误的是

A：透析患者服用钙剂必须在进食的同时服用

B：高磷血症会导致心脏、血管的钙化

C：透析患者服用钙剂量大时易出现高钙血症

D：透析患者服用磷结合剂的钙剂，目的是为了补钙

答案：D

23.表现为“牛肉样舌”的疾病为()

A：缺铁性贫血

B：白血病

C：巨幼细胞性贫血

D：再生障碍性贫血

答案：C

24.以下治疗沙眼的药物中，属于处方药的是

A：2%硝酸银

B：硫酸锌滴眼剂

C：红霉素眼膏

D：酞丁安滴眼剂

答案：A

25.原发性失眠首选

A：米氮平

B：唑吡坦

C：阿戈美拉汀

D：氯氮

答案：B

26.药师应具备的素质中，开展药学服务工作的关键是()。

A：良好的教育背景

B：药历制订、修改

C：交流沟通能力

D：高尚的职业道德

答案：C

27.患者，男，58岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀40mgqd。患者用药期间应定期监测的生化指标是

A：BUN

B：RBC

C：Hb

D：ALT

答案：D

28.减少尿酸排泄，引起高尿酸血症的是

A：氢氯噻嗪

B：丙磺舒

C：苯溴马隆

D：吲哚美辛

答案：A

29.属于核苷酸类HIV逆转录酶抑制剂的是

A：沙奎那韦

B: 恩夫韦替

C: 奈韦拉平

D: 扎西他滨

答案：D

30.服药时饮茶可降低疗效的是

A: 维生素 A

B: 西咪替丁

C: 格列本脲

D: 硫酸亚铁

答案：D

31.中度贫血，Hb 为（）

A: 小于 60g/L

B: 60~90g/L

C: 60~120g/L

D: 90~120g/L

答案：B

32.（2017 年真题）高蛋白饮食在肠内产生氨基酸会影响其吸收、降低疗效的药物是（）

A: 维 A 酸片

B: 非洛地平片

C: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊

D: 左旋多巴片

答案：D

33.三环类抗抑郁药中毒的临床表现是（）

A: 谵妄、躁狂、幻觉

B: 明显的锥体外系症状

C: 心血管毒性

D: 肌肉震颤、抽搐

答案：C

34.对衣物或毛发具有氧化漂白作用，应尽量避免接触的痤疮治疗药是

A: 口服短效避孕药

B: 过氧化苯甲酰

C: 米诺环素

D: 维 A 酸

答案：B

35.脑梗死的分期恢复期

A: 1～3 个月

B: 1 个月内

C: 2 周

D: 1~6 个月

答案：D

36.（2015 年真题）使用前应用青霉素进行皮试的药物是（）。

A: 左氧氟沙星片

B: 阿莫西林胶囊

C: 阿奇霉素片

D: 注射用头孢曲松钠

答案：B

37.治疗痔疮的常用内服药是

A：地奥司明

B：聚甲酚磺醛栓

C：九华膏

D：联苯苄唑乳膏

答案：A

38.峰值一般在清晨7～8时，谷值则在午夜0时，是

A：胃酸的分泌

B：胰岛B细胞

C：糖皮质激素的分泌

D：肝脏合成胆固醇

答案：C

39.痛风缓解期在关节炎症控制1～2周开始使用

A：丙磺舒

B：阿司匹林

C：别嘌醇

D：秋水仙碱

答案：C

40.可降低性传播疾病感染风险的个体避孕措施是

A：口服复方短效避孕药

B：使用避孕套

C：外用杀精剂

D：宫内节育器

答案：B

41.（2017年真题）下列关于失眠药物治疗策略的说法,正确的是（）

A：失眠继发于或伴发于其他疾病时,应同时治疗原发或伴发疾病

B：药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测

C：焦虑症患者存在失眠时以失眠药物为主

D：原发性失眠在非药物治疗无效时首选苯二氮卓类抗失眠药

答案：A

42.为配制有效氯浓度为500mg/L的消毒剂10L,需要次氯酸钠溶液（有效氯浓度为6．0%）和纯化水的量分别是（）

A：120mL和9880mL

B：150mL和9850mL

C：830mL和9170mL

D：83mL和9917mL

答案：D

43.告知"人促红素可引起纯红细胞再生障碍性贫血"属于

A：新药信息

B：禁忌证

C：药品不良反应

D：药物相互作用

答案：C

44.（2016年真题）美国食品药品监督管理局（FDA）根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为A、B、C、D、X五个级别。

A：C级

B：B级

C：D级

D：A级

答案：C

45.可提示轻度黄疸的是

A: >342μmol/L

B: 34.2μmol/L～171μmol/L

C: 17.1μmol/L～171μmol/L

D: 17.1μmol/L～34.2μmol/L

答案：B

46.穿孔（消化性溃疡并发症）

A: 突发上腹剧痛，继而至全腹

B: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血

C: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物

D: 规律性上腹痛

答案：A

47.患者，女，30岁，情感低落、反应迟钝半年余，晨重夜轻，临床诊断为抑郁症。

A: 从最大有效剂量开始，逐步递减剂量

B: 不宜与MAOIs类药物联合使用

C: 药物治疗至少2周才会有显著的情绪反应

D: 如以上药物治疗无效，可考虑更换为同类的其他药物

答案：A

48.进行药学信息的收集、保管、整理、评价、传递、提供和利用，是

A: 处方点评

B: 处方审核

C: 药物信息服务

D: 参与健康教育

答案：C

49.能抑制性腺，造成男性不育和女性闭经的抗风湿药物是

A: 青藤碱

B: 肿瘤坏死因子(TNF 一 α)拮抗剂

C: 白芍总苷

D: 雷公藤多苷

答案：D

50.患者，女，27岁，2年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血T3、T4及TSH检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A: 粒细胞减少

B: 头痛

C: 肝功能损害

D: 皮疹

答案：A

51.轻症、慢性疾病适宜选用的给药途径是

A: 口服给药

B: 外用给药

C: 肌内注射

D: 腔道给药

答案：A

52.属于 β 受体阻断剂的是

A: 美托洛尔

B: 乙酰胆碱

C: 异丙托溴铵

D: 福莫特罗

答案：A

53.可引起尿液碱度增高的疾病是

A: 代谢性碱中毒

B: 痛风

C: 糖尿病

D: 呼吸性酸中毒

答案：A

54.（2015年真题）静脉注射青霉素的适宜溶媒是（）。

A: 0.9氯化钠注射液

B: 复方氯化钠注射液

C: 5%葡萄糖注射液

D: 50%葡萄糖注射液

答案：A

55.严重肝功能减退病人常伴功能性肾功能不全，以致使"经肝肾两种途径清除"的药物的血药浓度很高，因此用药原则是

A: 一般无须调整剂量

B: 尽可能避免使用

C: 必须减量应用

D: 须谨慎使用，必要时减量给药

答案：C

56.运动员禁用药物中，β 受体阻断剂产生的危害是

A: 易造成人体严重脱水、肾衰竭

B: 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖
C: 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患
D: 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡
答案：D

57.下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是
A: 剂量递增，尽可能采用最小有效剂量，使不良反应减至最小
B: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗
C: 当单药治疗无效时，可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药
D: 抗抑郁药起效较快，使用1周后可判定疗效
答案：D

58.皮下脂肪薄，局部循环差，致使皮下和肌内注射给药的吸收不规则，即
A: 药物代谢
B: 药物分布
C: 药物吸收
D: 药物排泄
答案：C

59.适合睡前服用的是
A: 吲哚美辛
B: 多潘立酮
C: 氟伐他汀
D: 奥利司他
答案：C

60.患者女，6岁，因发热体温38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查:白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

A: 右美沙芬

B: 溴己新

C: 乙酰半胱氨酸

D: 可待因

答案：A

61.无吞噬功能，但细胞颗粒中含有许多生物活性物质如肝素、组胺、慢反应物质等的细胞为

A: 嗜酸性粒细胞

B: 嗜碱性粒细胞

C: 淋巴细胞

D: 中性粒细胞

答案：B

62.患者男性，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 病理性骨折

B: 肺动脉栓塞

C: 下肢动脉栓塞

D: 下肢深静脉血栓形成

答案：D

63.一新生儿确诊感染乙型肝炎病毒，提示其生母妊娠期间血清免疫学检查结果应为

A: HBsAg 为阳性

B: HBsAg，HBeAg 均为阳性

C: HBsAb，HBeAg 均为阳性

D: HBeAg 为阳性

答案：B

64.服用维生素 B

A: 脂肪

B: 食盐

C: 食醋

D: 酒

答案：D

65.可引起“双硫仑样反应”，给药期间、给药结束 1 周内应禁止饮酒的是

A: 头孢哌酮

B: 阿米卡星

C: 莫西沙星

D: 阿奇霉素

答案：A

66.对购药患者讲授安全用药常识是

A: 教育方式

B: 主动方式

C: 协商方式

D: 指令方式

答案：B

67.妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

A：氯霉素

B：四环素

C：华法林

D：磺胺药

答案：C

68.就餐前15～30分钟给药的是

A：胰岛素

B：瑞格列奈

C：二甲双胍

D：阿卡波糖

答案：A

69.通过抑制磷酸二酯酶，升高cAMP水平，加强心肌收缩力的非苷类药物是

A：卡维地洛

B：地高辛

C：洋地黄毒苷

D：米力农

答案：D

70.属于胆固醇吸收抑制剂的药物是

A：辛伐他汀

B：非诺贝特

C：依折麦布

D: 甲基多巴

答案：C

71.药师在指导患者合理用药时应同时关注药物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是()

A: 硫酸亚铁与维生素C同服

B: 异烟肼与牛奶同服

C: 华法林与人参同服

D: 左甲状腺素与钙剂同服

答案：A

72.抗蠕虫药不宜长时间应用，如果长时间应用将

A: 影响蛋白代谢

B: 影响脂肪代谢

C: 影响糖代谢

D: 影响糖吸收

答案：C

73.以下所列治疗咳嗽的药物中，属于处方药物的是

A: 可待因

B: 喷托维林

C: 苯丙哌林

D: 美酚伪麻

答案：A

74.某男性，27岁，间断上腹痛3年，表现为餐后痛，约1～2h后缓解，以冬春季多发。

A: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂

B: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁

C: 法莫替丁+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

D: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

答案：D

75.血尿酸升高的相关疾病是

A: 痛风

B: 湿疹

C: 流感

D: 过敏性鼻炎

答案：A

76.消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

A: 维生素 B1

B: 胰酶片

C: 复方阿嗪米特肠溶片

D: 莫沙必利

答案：A

77.患者到药店购买鱼肝油,药师应给予()

A: 维生素 AD

B: 鱼油

C: 维生素

D: 维生素 A

答案：A

78.患者女45岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片20mgbid，甲硝唑片0.4gbid，克拉霉素片50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊0.6gbid。

A: 维生素B12缺乏

B: 维生素B6缺乏

C: 维生素A缺乏

D: 维生素B2缺乏

答案：A

79.作为退热药，布洛芬的优势是

A: 可诱发变态反应

B: 具有解热镇痛消炎作用

C: 对胃肠道的不良反应较轻

D: 镇痛作用较强

答案：C

80.高血压患者的降压目标老年高血压（）

A: <120/80mmHg

B: <140/90mmHg

C: <150/90mmHg

D: <130/80mmHg

答案：C

81.合并闭角型青光眼的前列腺增生症患者不宜选用的药物是

A: 多沙唑嗪

B: 托特罗定

C: 坦索罗辛

D：非那雄胺

答案：B

82.应在睡前服用，疗效较好的是

A：硫酸镁

B：沙丁醇胺

C：噻氯匹定

D：维生素B1

答案：B

83.配制青霉素输液的适宜溶媒是()

A：0.9%氯化钠注射液

B：复方氯化钠注射液

C：50%葡萄糖注射液

D：低分子右旋糖酐注射液

答案：A

84.冠心病二级预防的“ABCDE”方案中，“A”是指

A：健康教育和运动

B：β受体阻断剂和血压控制

C：阿司匹林和ACEI

D：控制饮食和糖尿病

答案：C

85.可提示肝细胞性黄疸的是

A：STB17.1μmol/L～34.2μmol/L

B：STB>342μmol/L

C：STB17.1μmol/L～171μmol/L

D: STB34.2μmol/L～171μmol/L

答案：C

86.蒽环类抗生素容易引起急、慢性心脏毒性，可导致左心室功能受损、心衰等，可以采用何种药物预防（）

A: 硝苯地平

B: 辅酶Q

C: 普萘洛尔

D: 阿托品

答案：B

87.COMT抑制剂

A: 恩托卡朋

B: 苯海索

C: 左旋多巴

D: 司来吉兰

答案：A

88.（2017年真题）可能影响儿童骨骼发育的药物是（）

A: 头孢克洛

B: 阿莫西林

C: 复方磺胺甲噁唑

D: 诺氟沙星

答案：D

89.不宜选静滴5%碳酸氢钠注射液、碱化尿液的情况是是

A: 苯妥英钠中毒

B: 异戊巴比妥中毒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/198056036044007022