

## 护士三基考试血液内科练习题

### 护士三基考试血液内科练习题

#### 一、单选题 A1 型

(每题只有一个正确答案)

1、慢性淋巴细胞白血病首发症状常是：( E )

A、肝大

B、脾大

C、发热

D、贫血

E、淋巴结肿大

2、多发性骨髓瘤最常见的早期症状是：( C )

A、贫血

B、出血

C、骨痛

D、淋巴结肿大

E、高黏滞血症

3、病人，男，22 岁。临床诊断为再生障碍性贫血。查体周身皮肤可见瘀点和瘀斑；左侧颊部可见一约 1.2cm×0.8cm 的口腔溃疡，口腔黏膜未见血疱形成；咽无充血，扁桃体不肿大；双肺未闻干湿啰音。为有效预防感染，目前该病人首要采取的护理措施是：( B )

A、加强营养

B、加强口腔护理

C、保护性隔离

D、保持皮肤清洁、干燥

E、保证会阴部清洁卫生

4、可确诊再生障碍性贫血的是( D )

A、进行性贫血、出血、感染、脾不肿大

B、网织红细胞减少

C、有氯霉素服药史

D、骨髓象见巨核细胞明显减少

E、服用抗贫血药物无效

5、使用维生素 B12 治疗时要注意补充 ( B )

A、钠盐

B、钾盐

C、镁

D、钙

E、磷

6、患者男，50 岁。主因头晕、乏力，来医院就诊，实验室检查：  
RBC  $3.95 \times 10^{12} / L$ ，Hb 90g / L，疑诊为 ( A )

A、贫血

B、神经衰弱

C、肾炎

D、脑水肿

E、白血病

7、造血干细胞移植患者进行中心静脉导管穿刺后应使用自粘弹性  
绷带对伤口进行局部加压包扎几小时 ( C )

A、8

B、12

C、24

D、30

E、48

8、关于铁的吸收，哪项错误 ( C )

A、与维生素 C 同时服好

B、低铁比高铁好

C、与维生素 B12 同时服好

D、主要在十二指肠上段吸收

E、每天约吸收 1mg

9、再生障碍性贫血不正确的治疗是 ( B )

A、贫血严重者可小量输新鲜血

B、并发肺部感染者给予氯霉素抗感染

C、可给予糖皮质激素治疗

D、内科治疗效果不佳可行脾切除

E、可给予胎肝细胞输注

10、急性再生障碍性贫血早期最突出表现是（ C ）

A、出血

B、贫血

C、出血和感染

D、肝脾大

E、感染

11、脑膜及中枢神经系统白血病的叙述不正确的是（ D ）

A、是由于白血病细胞浸润至脑膜或中枢神经系统所致

B、可出现头痛、恶心、呕吐

C、症状出现较晚，主要是因为化疗药物不易透过血脑屏障

D、起病急，多发于急性期

E、重者有呕吐、颈项强直等症状

12、营养性缺铁性贫血患儿最主要的特点是（ A ）

A、小细胞低色素性贫血

B、正细胞低色素性贫血

C、大细胞低色素性贫血

D、大细胞高色素性贫血

E、小细胞高色素性贫血

13、有关口服铁剂的注意事项，错误的是（ E ）

A、向患者说明服用铁剂后可出现黑便

B、服用铁剂前后 1 小时禁饮浓茶

C、避免铁剂溶液与牛奶同服

D、服铁剂溶液时要用吸管吸入咽下

E、症状改善后可停药

14、急性白血病病人最常见的症状是（ A ）

A、发热

- B、贫血
- C、出血
- D、胸骨局限性压痛
- E、疲乏

15、铁剂可用于治疗（ C ）

- A、溶血性贫血
- B、巨幼红细胞性贫血
- C、小细胞低色素性贫血
- D、自身免疫性贫血
- E、再生障碍性贫血

16、造血干细胞移植患者进行日常口腔护理的时间是（ C ）

- A、进食后 30 分钟后
- B、进食后 1 小时后
- C、进食后 30 分钟内
- D、进食后 1 小时内
- E、进食后 2 小时内

17、治疗慢性淋巴细胞白血病最常用的药物是：（ C ）

- A、马法兰
- B、羟基脲
- C、氟达拉滨
- D、干扰素
- E、单克隆抗体

18、下列哪项是缺铁性贫血的表现（ D ）

- A、牙龈出血
- B、发热伴大量出汗
- C、骨骼疏松
- D、毛发无光泽及“反甲”
- E、皮肤紫癜

19、不符合特发性血小板减少性紫癜临床表现的是（ A ）

- A、脾大和贫血

- B、多有畏寒和发热
- C、多见于四肢黏膜出血
- D、内脏出血
- E、皮肤瘀斑、血肿

20、下列药物禁用于 ITP 病人的是 ( D )

- A、强的松(泼尼松)
- B、阿莫西林
- C、红霉素
- D、阿司匹林
- E、地西洋

21、患者在进行药物淋浴过程中出现晕厥和虚脱时，以下护理方法错误的是 ( B )

- A、立即停止药物淋浴
- B、协助患者半坐卧位
- C、用手指掐压人中、内关、合谷等穴位
- D、并立即通知医师，遵医嘱进行处理
- E、待患者休息精神好转后继续药浴

22、由免疫因素引起血小板减少的出血性疾病是 ( C )

- A、白血病
- B、再生障碍性贫血
- C、ITP
- D、营养性贫血
- E、红细胞增多症

23、下列关于血小板的描述错误的是 ( E )

- A、由骨髓成熟巨核细胞所产生
- B、功能为保护毛细血管的完整性
- C、参与止血和凝血过程
- D、许多出血性疾病常与血小板质与量的变化有关
- E、参考值为  $100 \times 10^9 \sim 200 \times 10^9 / L$

24、使用下列药物不损伤血小板的是 ( E )

- A、阿司匹林
- B、右旋糖酐
- C、保泰松
- D、双嘧达莫
- E、硫酸亚铁

25、区分急性白血病和再生障碍性贫血的表现是（ E ）

- A、发热
- B、贫血
- C、皮肤出血
- D、颅内出血
- E、胸骨压痛

26、下列哪项不是白血病的临床表现（ C ）

- A、发热
- B、出血
- C、血糖降低
- D、贫血
- E、器官浸润

27、有关腹型过敏性紫癜病人腹痛特点的描述正确的是：（ B ）

- A、持续性胀痛
- B、阵发性绞痛
- C、针刺样痛
- D、持续性钝痛
- E、牵拉样痛

28、再生障碍性贫血应选用（ C ）

- A、叶酸
- B、铁剂
- C、丙酸睾酮
- D、硫酸亚铁
- E、维生素 B6

29、锁骨下双腔中心静脉导管穿刺后伤口 24 小时换药一次，之后

每几日维护一次 ( D )

- A、 2
- B、 3
- C、 5
- D、 7
- E、 8

30、临床上不出现发绀的疾病是 ( D )

- A、 急性肺炎
- B、 慢性阻塞性肺气肿
- C、 自发性气胸
- D、 严重贫血
- E、 右心衰竭

31、下列关于病人入无菌层流室后的护理不正确的是： ( B )

- A、 米饭用高压蒸汽消毒后食用
- B、 苹果用清水洗净即可食用
- C、 进食前后漱口
- D、 眼药水滴眼，每天 2 ~ 3 次
- E、 女性每天会阴冲洗

32、中性粒细胞增多见于 ( E )

- A、 伤寒
- B、 再生障碍性贫血
- C、 脾功能亢进
- D、 淋巴瘤
- E、 慢性粒细胞白血病

33、CsA 毒副作用主要为 ( E )

- A、 肝毒性
- B、 心脏毒性
- C、 肺纤维化
- D、 皮疹
- E、 肾毒性

34、预防脑膜或中枢神经系统白血病的主要措施是（ D ）

- A、放射治疗
- B、联合化疗
- C、骨髓移植
- D、缓解巩固期鞘内注射化疗药物
- E、激素治疗

35、慢性粒细胞白血病临床特征中最为突出的是：（ A ）

- A、巨脾
- B、广泛出血倾向
- C、胸骨压痛
- D、严重贫血
- E、合并感染

36、患儿，1 岁半。诊断为营养性缺铁性贫血，需口服铁剂治疗。

护士对家长进行应用铁剂

的指导，其中不正确的是（ C ）

- A、注意观察药物反应，可能有恶心、排便异常等
- B、应在两餐之间服用，减少对胃肠道的刺激
- C、可与牛奶同时服用，利于铁剂吸收
- D、可用吸管服用，以避免牙齿染黑
- E、患儿大便呈黑色是正常反应，停药后恢复正常

37、白血病患者行骨髓移植最适当的时机是（ C ）

- A、缓解诱导治疗前
- B、缓解期任何时机
- C、第一次完全缓解时
- D、合并严重感染时
- E、多次缓解之后

38、营养性巨幼细胞贫血出现震颤的护理措施有（ E ）

- A、预防感染
- B、防止心力衰竭
- C、提倡母乳喂养

D、绝对卧床休息

E、防止患儿受伤

39、铁剂治疗缺铁性贫血患儿后早期有效指标是（ C ）

A、血红蛋白量上升

B、红细胞数上升

C、网织红细胞上升

D、红细胞形态正常

E、白细胞数正常

40、急性白血病化疗诱导缓解后，病人头痛、呕吐、颈强直，但不发热，最可能发生（ C ）

A、脑出血

B、脑血栓

C、中枢神经系统白血病

D、脑膜炎

E、蛛网膜下腔出血

41、孕妇最易并发哪种贫血（ B ）

A、恶性贫血

B、缺铁性贫血

C、再生障碍性贫血

D、溶血性贫血

E、珠蛋白生成障碍性贫血

42、引起婴幼儿缺铁性贫血的最根本的原因是（ A ）

A、体内铁缺乏

B、铁的摄入不足

C、生长发育快，需铁量增加

D、某些疾病的影响

E、铁丢失过多

43、下列不是缺铁性贫血临床表现的是（ D ）

A、含铁酶的活性降低

B、皮肤干燥、角化、无光泽

C、舌炎、口腔炎

D、皮肤黏膜瘀点、瘀斑

E、神经、精神异常

44、关于巨幼细胞性贫血的临床表现，描述不正确的是：（ E ）

A、舌炎

B、腹泻

C、牛肉样舌

D、对称性远端肢体麻木

E、异食癖

45、下列缺铁性贫血的特殊表现正确的是：（ D ）

A、乏力

B、头晕

C、皮肤、黏膜苍白

D、异食癖

E、心悸

46、有关铁剂治疗缺铁性贫血的叙述，下列哪项不正确（ E ）

A、症状纠正后继续服药 3～6 个月

B、网织红细胞数增加是治疗有效的指标

C、于饭后服用

D、服药后可出现黑便

E、可防止缺铁性贫血的复发

47、缺铁性贫血最主要的是缺（ A ）

A、贮存铁

B、血清铁

C、蛋白质

D、甲状腺素

E、钴

48、营养性缺铁性贫血，服用铁剂停药的时间应是（ E ）

A、血红蛋白量恢复正常

B、血红蛋白量恢复正常后 1 周

- C、血红蛋白量恢复正常后 2 周
- D、血红蛋白量恢复正常后 1 个月
- E、血红蛋白量恢复正常后 2 个月

49、患儿，5 个月。人工喂养，未添加辅食。1 个月来皮肤、黏膜苍白，肝脾增大。血红蛋白 80g / L，以小细胞为主。该患儿贫血为（ A ）

- A、营养性缺铁性贫血
- B、溶血性贫血
- C、出血性贫血
- D、再生障碍性贫血
- E、营养性巨幼细胞贫血

50、营养性缺铁性贫血的好发年龄是（ D ）

- A、1 个月
- B、2~3 个月
- C、6 个月内
- D、6 个月~2 岁
- E、3 岁以上

51、血小板减少性紫癜病因（ B ）

- A、细菌直接感染
- B、自身免疫
- C、变态反应
- D、病毒
- E、寄生虫

52、关于自体外周血造血干细胞的回输，描述正确的是：（ C ）

- A、冷冻保存的造血干细胞可直接回输
- B、回输 2 袋外周血干细胞之间不用生理盐水冲管
- C、回输干细胞的同时，另一路静脉输注等量鱼精蛋白
- D、解冻融化后的干细胞应立即用有滤网输液器输注
- E、回输前不应用任何药物抗过敏

53、再生障碍性贫血患者应选用（ C ）

- A、铁剂
- B、叶酸
- C、丙酸睾酮
- D、硫酸亚铁
- E、维生素 B6

54、移植前化疗期间患者的饮食护理要点错误的是（ C ）

- A、移植前化疗阶段应进食含高蛋白、高维生素的饮食，如瘦肉、牛肉、剔刺的鱼肉、剔骨的排骨等，还要多吃新鲜的蔬菜
- B、有恶心症状时可少量进食，注意少食多餐。两餐之间可以吃不易引起恶心的辅助食物，如面包干、饼干等
- C、进餐与服药间隔应小于半小时
- D、不能食用腌制类、发酵类、罐头类、烧烤类、油炸类食物
- E、选择自己喜好的食物，特别注意的是所有的食物需要经过微波高温消毒 3～5 分钟

55、关于口服铁剂的护理，下列错误的是（ C ）

- A、宜在饭后服用
- B、禁饮浓茶
- C、忌与维生素 C 同服
- D、避免与牛奶、磷酸盐同服
- E、液体铁剂经稀释后用吸管服用

56、糖皮质激素对下列哪种疾病治疗最有效（ ）（ C ）

- A、血友病
- B、原发性血小板增多症
- C、特发性血小板减少性紫癜
- D、血栓性血小板减少性紫癜
- E、弥散性血管内凝血

57、特发性血小板减少性紫癜的护理诊断是（ C ）

- A、潜在并发症：心力衰竭
- B、营养失调
- C、潜在并发症：内脏出血

D、活动无耐力

E、有受伤的危险

58、警惕白血病患者颅内出血的血小板值为 ( D )

A、 $100 \times 10^9 / L$

B、 $80 \times 10^9 / L$

C、 $50 \times 10^9 / L$

D、 $20 \times 10^9 / L$

E、 $10 \times 10^9 / L$

59、血液病患者的白细胞低于下列哪项时需进行保护性隔离 ( A )

A、 $1.0 \times 10^9 / L$

B、 $1.5 \times 10^9 / L$

C、 $2.0 \times 10^9 / L$

D、 $2.5 \times 10^9 / L$

E、 $3.0 \times 10^9 / L$

60、中心静脉导管会出现堵塞时可用何种浓度的尿激酶进行通管 ( D )

A、1 : 2000

B、1 : 3000

C、1 : 4000

D、1 : 5000

E、1 : 6000

61、关于慢性粒细胞白血病加速期的表现，描述不正确的是： ( E )

A、不明原因高热

B、体重下降

C、骨、关节痛

D、进行性贫血

E、淋巴结迅速肿大

62、患儿，10 个月，面黄来诊，诊断为营养性小细胞性贫血。下述处理哪项是不必要的 ( D )

A、设法增进食欲

- B、口服铁剂
- C、口服维生素 C
- D、肌肉注射维生素 B12
- E、预防发生心功能不全

63、区别急性与慢性白血病的主要依据是（ D ）

- A、病程长短
- B、发病年龄、性别
- C、贫血程度
- D、骨髓幼稚白细胞的成熟程度
- E、血白细胞剧增的程度

64、某患者，因特发性血小板减少性紫癜而入院，长期应用糖皮质激素治疗。患者向护士询问此药常见的不良反应。护士的回答不应包括（ E ）

- A、感染
- B、糖尿病
- C、高血压
- D、多毛症
- E、末梢神经炎

65、患者女，发热、贫血。皮下有出血，脾大，占满腹部，胸骨隐痛。对此高热护理不宜采用的是（ D ）

- A、冷盐水灌肠
- B、供给足够的水分
- C、头部置冰袋
- D、酒精擦浴
- E、给予药物降温

66、血液患者化疗期间应维持尿量在（ A ）

- A、100ml / h
- B、50ml / h
- C、80ml / h
- D、300ml / h

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/198101105126006034>