

2024 河北省阜平县《执业药师之西药学专业二》考试题库含答案【达标题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 甲氧苄啶联用甲氨蝶呤使

- A: 半衰期缩短
- B: 抗凝作用增强
- C: 白细胞减少风险增加
- D: 肾毒性增加

答案：C

2. 夜盲症患者应选用的维生素是

- A: 维生素 D
- B: 维生素 B
- C: 维生素 B
- D: 维生素 A

答案：D

3. 环磷酰胺属于哪一类抗肿瘤药物

- A: 抗代谢抗肿瘤药
- B: 抗肿瘤金属配合物
- C: 抗肿瘤抗生素
- D: 烷化剂

答案：D

4. 属于阴道局部用药的是

- A: 聚甲酚磺醛
- B: 地屈孕酮
- C: 环磷酰胺
- D: 阿霉素

答案：A

5. 四环素类的主要作用靶点是

- A: 核糖体的 30S 亚基
- B: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- C: 核糖体的 50S 亚基
- D: 细胞内膜 PBP

答案：A

6. 与氯吡格雷合用，竞争 CYP2C19，使用氯吡格雷患者血栓不良反应事件增多的药物是

- A: 泮托拉唑
- B: 雷贝拉唑
- C: 西咪替丁
- D: 奥美拉唑

答案：D

7. （2019 年真题）患者，男，34 岁，晨起出现上腹部剧烈疼痛，考虑为胃肠道平滑肌痉挛，适宜该患者使用的治疗药物是（）

- A: 酚妥拉明
- B: 多潘立酮
- C: 山莨菪碱
- D: 溴吡斯的明

答案：C

8. 过量引起严重心脏毒性的药物是

- A: 氨氯地平
- B: 哌唑嗪
- C: 卡托普利
- D: 地高辛

答案：D

9. 关于铂类药物的描述，下列说法错误的是()

- A: 作用机制是破坏 DNA 的结构和功能
- B: 广谱抗瘤药物
- C: 顺铂是结直肠癌的首选药之一
- D: 细胞增殖周期非特异性抑制剂

答案：C

10. 关于利多卡因的叙述正确的是

- A: 可用于房颤的复律治疗和复律后的维持
- B: 为窄谱抗心律失常药，仅用于室性心律失常
- C: 可治疗房性期前收缩
- D: 可治疗阵发性室上性心动过速

答案：B

11. 用于耐甲氧西林的金葡萄菌引起的严重感染()

- A: 克林霉素
- B: 克拉霉素
- C: 万古霉素
- D: 红霉素

答案：C

12. (2018 年真题) 用于治疗疥疮的药物有 ()

- A: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏
- B: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比萘芬软膏
- C: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏
- D: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏

答案: A

13. 高血压合并痛风者不宜使用

- A: 硝苯地平
- B: 依那普利
- C: 阿替洛尔
- D: 氢氯噻嗪

答案: D

14. 对贝特类(苯氧芳酸类)的叙述正确的是 ()

- A: 可升高 T
- B: LDL-chC 主要用于原发性高胆固醇血症
- C: 可降低 HDL-ch
- D: 能明显降低血浆 TG、VLDL-ch

答案: D

15. 需要迅速抗血小板作用时，不能选用的二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂是

- A: 替格雷洛
- B: 替罗非班
- C: 氯吡格雷
- D: 噻氯匹定

答案：D

16. 下列药物组合有协同作用的是

- A: 青霉素+庆大霉素
- B: 青霉素+四环素
- C: 青霉素+氯霉素
- D: 青霉素+螺旋霉素

答案：A

17. 下列关于抗 M 胆碱药作用特点的描述中，错误的是

- A: 作用时间短
- B: 不同药物作用效能基本一致
- C: 使用眼膏剂可减少药物全身吸收
- D: 可散大瞳孔，麻痹睫状肌

答案：B

18. 患者，女，45 岁，因强直性脊柱炎住院，同时伴有胃溃疡、高血压及糖尿病，药师审核医嘱，发现应当禁用的药品是

- A: 双氯芬酸
- B: 格列齐特
- C: 雷尼替丁
- D: 硝苯地平

答案：A

19. 葡醛内酯属于

- A: 胃黏膜保护剂
- B: 抑酸剂
- C: 肝胆疾病辅助用药

D: 促胃肠动力药

答案：C

20. 用于抗结核杆菌的药物是

A: 庆大霉素

B: 妥布霉素

C: 新霉素

D: 异烟肼

答案：D

21. 用药时需关注肺毒性的药物是

A: 长春新碱

B: 博来霉素

C: 紫杉醇

D: 柔红霉素

答案：B

22. (2015 年真题) 属于超强效的外用糖皮质激素是 ()。

A: 卤米松

B: 氢化可的松

C: 地塞米松

D: 曲安奈德

答案：A

23. 血钾升高至

A: 大于 $265 \mu\text{mol/L}$

B: 大于 6mmol/L

C: 大于 $172 \mu\text{mol/L}$

D: 大于 $7\ \mu\text{mol/L}$

答案: B

24. 作用机制是抗代谢的是

A: 巯嘌呤

B: 枸橼酸他莫昔芬

C: 吉非替尼

D: 紫杉醇

答案: A

25. 患者，男性，46 岁，经常头痛，头晕近 8 年。2 天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压 $230/120\text{mmHg}$ 。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为 $202/120\text{mmHg}$ ，且气急不能平卧，心率 108 次/分，早搏 3 次/分。两肺底有湿啰音。

A: 硫氰酸盐不超过 $50\ \mu\text{g/ml}$ ，氰化物不超过 $2\ \mu\text{mol/ml}$

B: 硫氰酸盐不超过 $200\ \mu\text{g/ml}$ ，氰化物不超过 $4\ \mu\text{mol/ml}$

C: 硫氰酸盐不超过 $100\ \mu\text{g/ml}$ ，氰化物不超过 $3\ \mu\text{mol/ml}$

D: 硫氰酸盐不超过 $20\ \mu\text{g/ml}$ ，氰化物不超过 $1\ \mu\text{mol/ml}$

答案: C

26. 用于治疗鼓膜未穿孔的急性中耳炎、外耳道炎的药品是()。

A: 高锰酸钾溶液

B: 过氧乙酸溶液

C: 苯酚溶液

D: 酚甘油滴耳液

答案: D

27. 可诱导肝药酶活性的抗结核病药是()

- A: 吡嗪酰胺
- B: 对氨基水杨酸
- C: 利福平
- D: 异烟肼

答案：C

28. 下列不属于胃肠解痉药的是

- A: 阿托品
- B: 多潘立酮
- C: 山莨菪碱
- D: 颠茄

答案：B

29. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

- A: 托瑞米芬
- B: 己烯雌酚
- C: 他莫昔芬
- D: 氟他胺

答案：D

30. 患者，男，65岁。高血压病史8年，血压峰值180/110mmHg，冠心病史5年，双侧肾动脉狭窄，不宜选用的抗高血压药是

- A: 普萘洛尔
- B: 氨氯地平
- C: 赖诺普利
- D: 吧达帕胺

答案：C

31. 对磺胺类药物有严重过敏史的患者应避免使用的药物是

- A: 十一酸睾酮
- B: 西地那非
- C: 特拉唑嗪
- D: 坦洛新

答案: D

32. 维 A 酸类药物不能用于下述哪种疾病()

- A: 角化性皮肤病
- B: 银屑病
- C: 光敏性皮肤病
- D: 扁平疣

答案: C

33. 为高分子聚合物，通过增加局部渗透压软化大便，对肠道 pH 没有影响的是

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 乳果糖
- C: 开塞露
- D: 酚酞

答案: A

34. 肝素过量可选用的拮抗药是()

- A: 鱼精蛋白
- B: 氨基己酸
- C: 维生素 K
- D: 葡萄糖酸钙

答案: A

35. 氢氯噻嗪的药理作用是()

- A: 与醛固酮受体结合
- B: 提高血浆渗透性，产生组织脱水作用
- C: 抑制远曲小管 Na
- D: 抑制近曲小管的碳酸酐酶活性

答案：C

36. 维生素 B12 主要用于治疗的疾病是

- A: 再生障碍性贫血
- B: 巨幼细胞性贫血
- C: 缺铁性贫血
- D: 慢性失血性贫血

答案：B

37. 干扰敏感菌有丝分裂，对深部真菌无效的药物是

- A: 伏立康唑
- B: 灰黄霉素
- C: 两性霉素 B
- D: 氟胞嘧啶

答案：B

38. 痛风缓解期(关节炎症控制后 1~2 周)，为控制血尿酸水平，应选用的药品是()。

- A: 布洛芬
- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱
- D: 泼尼松龙

答案：B

39. 下列药物使用期间需要缓慢停药的是

- A: 依那普利
- B: 氨氯地平
- C: 比索洛尔
- D: 地尔硫?

答案：C

40. 下列关于胺碘酮的叙述，错误的是()

- A: 阻滞心肌细胞钠、钙及钾通道
- B: 对室上性和室性心律失常均有效
- C: 降低窦房结和普肯耶纤维的自律性
- D: 对 α 、 β 受体有激动作用

答案：D

41. (2020 年真题) 可改善心肌缺血症状，但高磷血症患者禁用的药物是

- A: 门冬氨酸钾镁注射液
- B: 二磷酸果糖注射液
- C: 乳酸钠注射液
- D: 葡萄糖注射液

答案：B

42. (2019 年真题) 因易导致新生儿溶血，妊娠晚期妇女禁用的抗菌药物是()

- A: 呋喃妥因
- B: 庆大霉素

C: 甲硝唑

D: 苜星青霉素

答案: A

43. 下列属于非选择性 β 受体阻断药的是()

A: 比索洛尔

B: 普萘洛尔

C: 阿替洛尔

D: 美托洛尔

答案: B

44. (2020 年真题) 患者，女，63 岁。急性心肌梗死行经皮冠状动脉介入 (PCI) 治疗，术后为预防支架内血栓形成，常与阿司匹林联合使用的药物是

A: 氯吡格雷

B: 华法林

C: 双氯芬酸

D: 奥美拉唑

答案: A

45. 治疗良性前列腺增生症宜选用

A: 托特罗定

B: 坦洛新

C: 尼莫地平

D: 利血平

答案: B

46. 变异型心绞痛不宜选用

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 地尔硫
- D: 维拉帕米

答案：A

47. 属于破坏 DNA 的铂类化合物的抗肿瘤药物是

- A: 紫杉醇
- B: 依托泊苷
- C: 顺铂
- D: 来曲唑

答案：C

48. （2016 年真题）属于促胰岛素分泌剂的是

- A: 二甲双胍
- B: 艾塞那肽
- C: 阿卡波糖
- D: 那格列奈

答案：D

49. （2015 年真题）治疗侵袭性念珠菌病首选（）。

- A: 伏立康唑
- B: 灰黄霉素
- C: 氟康唑
- D: 氟胞嘧啶

答案：C

50. 属于第二代 α_1 肾上腺素受体阻断剂的是

- A: 特拉唑嗪
- B: 西地那非
- C: 他达拉非
- D: 度他雄胺

答案：A

51. 以下关于制霉菌素的描述中，错误的是

- A: 对念珠菌属抗菌活性较高，但易产生耐药性
- B: 口服吸收很少
- C: 作用机制与两性霉素 B 相似
- D: 局部外用治疗浅表真菌感染

答案：A

52. （2019 年真题）吸收后代谢成活性产物而发挥抗甲型和乙型流感病毒的前体药物是（）

- A: 金刚烷胺
- B: 奥司他韦
- C: 扎那米韦
- D: 金刚乙胺

答案：B

53. 患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶。下列关于氟尿嘧啶的说法中错误的是（）

- A: 属于嘌呤核苷合成酶抑制剂
- B: 用药期间不宜饮酒或同用阿司匹林类药物
- C: 与甲氨蝶呤合用，两者可产生协同作用
- D: 典型不良反应是恶心、呕吐、腹泻

答案：A

54. (2021 年真题) 乙内酰胺类药通过减少钠离子内流而使神经细胞稳定，限制 Na⁺通道介导的发作性放电的扩散，属于该类的抗癫痫药物是 ()

- A: 苯妥英钠
- B: 卡马西平
- C: 左乙拉西坦
- D: 加巴喷丁

答案：A

55. 激动 β 受体，对慢性心力衰竭疗效较好 ()

- A: 多巴酚丁胺
- B: 硝普钠
- C: 氨力农
- D: 地高辛

答案：A

56. 对癫痫小发作疗效最好的药物是

- A: 卡马西平
- B: 氯硝西泮
- C: 地西泮
- D: 乙琥胺

答案：D

57. 头孢菌素类药的主要作用靶点是

- A: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- B: 细胞内膜 PBP

C: 核糖体的 50S 亚基

D: 核糖体的 30S 亚基

答案: B

58. 成人使用乙胺嘧啶用于疟疾的预防，服用的时间是

A: 应于进入疫区前 6~8 天开始服用，一般宜服至离开疫区后 6~8 天

B: 应于进入疫区前 1~2 周开始服用，一般宜服至离开疫区后 1~2 周

C: 应于进入疫区前 1~2 周开始服用，一般宜服至离开疫区后 6~8 周

D: 应于进入疫区前 1~2 天开始服用，一般宜服至离开疫区后 1~2 天

答案: C

59. 下述药物中不属于消毒防腐药的是

A: 氨茶碱

B: 过氧乙酸

C: 戊二醛

D: 硼酸

答案: A

60. 肥胖性 2 型糖尿病患者控制血糖的一线药物是

A: 格列齐特

B: 格列本脲

C: 格列吡嗪

D: 二甲双胍

答案: D

61. 易被胃酸破坏，口服吸收少，故临床一般服用其肠衣片或酯化物的
是

A: 红霉素

- B: 氨曲南
- C: 阿奇霉素
- D: 克拉霉素

答案：A

62. (2017 年真题) 属于抗孕激素类药, 用于终止早孕的药物是 ()

- A: 米非司酮
- B: 甲地孕酮
- C: 左炔诺孕酮
- D: 黄体酮

答案：A

63. 下列药物中, 能促进食物消化的是 ()

- A: 胶体果胶铋
- B: 雷尼替丁
- C: 兰索拉唑
- D: 乳酶生

答案：D

64. 与肝素比较, 低分子量肝素的特点不包括 ()

- A: 应用期间应常规检测抗凝疗效及调整剂量
- B: 半衰期长, 皮下注射吸收较好
- C: 达肝素钠对延长 APTT 的作用较弱
- D: 不易致出血

答案：A

65. 下列关于托吡卡胺的描述错误的是

- A: 滴眼后不应压迫泪囊

- B: 可诱发闭角型青光眼
- C: 哺乳期慎用
- D: 可给予拟胆碱类药物解毒

答案：A

66. (2018 年真题) 关于地高辛作用特点的说法, 正确的是 ()

- A: 地高辛口服生物利用度小于 50%
- B: 地高辛不经细胞色素 P450 酶代谢, 以原形药物从肾脏排泄
- C: 地高辛通过激动 Na^+ , K^+ -ATP 酶增强心肌收缩力
- D: 地高辛消除半衰期为 12h

答案：B

67. 可使后者疗效显著下降的是

- A: 红霉素
- B: 氯丙嗪
- C: 他莫昔芬
- D: 维生素 C

答案：D

68. 主要作用于有丝分裂 M 期, 干扰微管蛋白合成的药物是

- A: 多柔比星
- B: 顺铂
- C: 氟尿嘧啶
- D: 高三尖杉酯碱

答案：D

69. 以下关于奥利司他使用的叙述, 错误的是

- A: 体重指数为 23 的人可使用

B: 药效在给药后 24~48 小时即可显现，停止治疗后 48~72 小时恢复

C: 应在餐时或餐后 1 小时内服用，如有一餐未进或食物中不含脂肪，可省略一次服药

D: 脂溶性维生素应在服用本品 2 小时后或在睡前服用

答案：A

70. 瑞舒伐他汀用于原发性高胆固醇血症和混合型高脂血症的初始剂量是

A: 5mg

B: 15mg

C: 10mg

D: 20~40mg

答案：A

71. 周某，男，31 岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

A: 尽量选择三价铁

B: 注意预防铁负荷过重

C: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离

D: 选择适宜的病期、疗程和监测

答案：A

72. 用于散瞳的眼用药物是

A: 复方托吡卡胺

B: 毛果芸香碱

C: 溴莫尼定

D: 噻吗洛尔

答案：A

73. 小剂量碘主要用于

- A: 抑制甲状腺素的释放
- B: 呆小病
- C: 黏液性水肿
- D: 地方性甲状腺肿

答案：D

74. 庚酸炔诺酮()

- A: 促进蛋白质合成
- B: 抗着床
- C: 抑制排卵作用
- D: 减少精子数目

答案：C

75. 患者，男，41 岁。有吸烟史，间断少量饮酒。因“嗝气、反酸、上腹部疼痛”就诊。经查，医师诊断为“反流性食管炎”此时应给予治疗的药物是

- A: 泮托拉唑
- B: 东莨菪碱
- C: 雷尼替丁
- D: 昂丹司琼

答案：C

76. 属于钙通道阻滞剂（第 IV 类）的抗心律失常药是

- A: 拉贝洛尔
- B: 美西律
- C: 胺碘酮

D: 维拉帕米

答案: D

77. 甲羟孕酮口服用于功能失调性子宫出血(功血)止血的用法用量是

A: 于月经后半周期(撤退性出血的第 16~25 日)开始口服，一次 10mg，一日 1 次，连用 10~14 日，酌情应用 3~6 个周期

B: 口服，一次 10~20mg，每 4~8 小时一次，连用 2~3 日；血止后每隔 3 日递减 1/3 剂量，直至维持量每日 100mg，连续用药至血止后 21 日停药

C: 一日 30mg，连服 6 个月

D: 口服一日 4~8mg，连服 5~10 日

答案: B

78. 糖皮质激素用于中毒性感染及各种休克宜选择的给药方法是

A: 隔日一次给药法

B: 一般剂量长期疗法

C: 小剂量替代疗法

D: 大剂量冲击疗法

答案: D

79. 与西地那非合用，可导致严重低血压的药品是()。

A: 硝酸甘油

B: 丙酸睾酮

C: 甲睾酮

D: 非那雄胺

答案: A

80. (2020 年真题) 属于第一代抗精神病药物的是

- A: 氯氮平
- B: 氯丙嗪
- C: 利培酮
- D: 奥氮平

答案：B

81. 可能导致牙龈出血的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 拉西地平
- C: 普伐他汀
- D: 依诺肝素

答案：D

82. 下列哪项不是血管紧张素转换酶抑制药的主要临床应用

- A: 心律失常
- B: 高血压
- C: 心肌梗死
- D: 充血性心力衰竭

答案：A

83. 属于 M 受体阻断剂的药物是

- A: 阿托品
- B: 奥布卡因
- C: 布林佐胺
- D: 拉坦前列素

答案：A

84. 有关可乐定的叙述，错误的是

- A: 可乐定是中枢性降压药
- B: 可乐定可用于治疗中度高血压
- C: 可乐定可用于治疗高血压危象
- D: 可乐定可用于治疗重度高血压

答案：D

85. 易发生持续干咳不良反应的药品是

- A: 硝酸甘油
- B: 氢氯噻嗪
- C: 福辛普利
- D: 硝苯地平

答案：C

86. 人工合成的第一个应用于临床的单环 β -内酰胺类抗生素是()

- A: 氨苄西林
- B: 头孢唑林
- C: 氨曲南
- D: 舒巴坦

答案：C

87. 容易引起周围神经炎的抗结核药物是

- A: 链霉素
- B: 乙胺丁醇
- C: 利福平
- D: 异烟肼

答案：D

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

88. 下列药物中与酚磺乙胺合用可引起中毒的是()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/198114052042007022>