临床执业医师考试考试真题及答案

一、A1 题型

1.下列关于中暑治疗描述不正确的为

A.迅速将患者转移到阴凉通风处休息或静卧

B.热痉挛时可口服凉盐水。

C.热射病时需紧急抢救，在一小时内使腋窝体温降至 38.5℃以内

D.药物降温可应用氯丙嗪

E.烦躁不安或抽搐可用地西泮

【正确答案】C

【答案解析】热射病：须紧急抢救，降温速度决定预后。应在 1h 内使直肠温度降至 38.5℃以内。体外降温：将患者转移到通风良好的低温环境，脱去衣服，按摩四肢皮肤，使皮肤血管扩张和加速血液循环，促进散热。对无循环虚脱的患者，可用冷水擦浴或将躯体浸入 27～30℃水中传导散热降温。对循环虚脱的患者可用蒸发散热降温，如用 15℃冷水反复擦拭皮肤或同时应用电风扇或空气调节器。或在头部、腋窝、腹股沟处放置冰袋，并用电扇吹风，加速散热。农村无上述条件时可用井水或泉水擦洗，促进蒸发降温。

2.下列哪项不是阿米巴肝脓肿的典型特点

A.多有阿米巴痢疾的病史

B.起病缓，病程长，症状轻

C.结肠镜检可见结肠黏膜有慢性溃疡

D.肝穿刺脓液常为棕褐色

E.肝穿刺脓液常为黄白色

【正确答案】E

【答案解析】此题主要目的是应掌握阿米巴肝脓肿的特点。阿米巴性肝脓肿是肠道阿米巴感染的并发症，故多有阿米巴痢疾的病史。起病较缓慢，病程长，发热等症状较细菌性肝脓肿轻，乙状结肠镜检时可见到结肠黏膜有慢性溃疡，穿刺肝脏脓肿时可抽出褐色脓液。脓肿绝大多数是单发的，所以根据以上特点，E 是细菌性肝脓肿的征象，而不是阿米巴性肝脓肿的征象。

3.诊断支气管扩张症首选的检查是

A.胸部 x 线片

B.胸部高分辨率 CT

C.支气管造影

D.胸部 B 超

E.胸部磁共振

【正确答案】B

【答案解析】高分辨率 CT 是确诊支气管扩张症的首选 。

4.某患者，57 岁，2 小时前与人发生争吵后，突然出现剧烈头痛、呕吐、意识障碍等表现，入院后 CT 检查提示蛛网膜下腔高密度影。对于本病最常见的病因应想到

A.动脉瘤

B.血管畸形

C.烟雾病

D.颅内肿瘤

E.垂体卒中

【正确答案】A

【答案解析】蛛网膜下腔出血最常见的病因应想到颅内有动脉瘤，约占本病的 50～80%，脑血管畸形则多见于青年人，约占 10%，其他原因占 10%。

5.青年女性，烧伤急诊入院，其右侧臀部及右侧小腿烧伤，考虑其烧伤面积为

A.9.5%

B.18%

C.18.5%

D.20%

E.20.5%

【正确答案】A

【答案解析】女性臀部面积为 6%，男性臀部为 5%，此外还有不同之处是女性双足面积为 6%，而男性为 7%；故本题总面积为单侧臀部 3%+单侧小腿 6.5%为 9.5%。

6.男，40 岁，进行性吞咽困难 3 个月，行消化道钡餐显示食管胸部狭窄。诊断考虑食管癌。1)以下关于食管狭窄的描述不正确的是

A.食管有 3 处生理狭窄

B.第一狭窄在第 6 颈椎体下缘

C.第二狭窄在左主支气管的后方

D.第三狭窄为通过膈的食管裂孔处

E.管径上下均匀一致

【正确答案】E

【答案解析】食管的管径并非上下均匀一致，这与食管本身的结构特点以及邻近器官有关，最重要和有意义的是食管的 3 处生理性狭窄。第一狭窄为食管的起始部，相当于第 6 颈椎体下缘水平，距中切牙约 15cm；第二狭窄为食管在左主支气管的后方与其

交叉处，相当于第 4、5 胸椎体之间水平，距中切牙约 25cm；第三狭窄为食管通过膈的食管裂孔处，相当于第 10 胸椎水平，距中切牙约 40cm。这三处狭窄部是食管异物嵌顿和食管癌的好发部位。

7.女婴，10 个月，由母亲抱至儿童保健门诊接受常规体检。护士教其母亲抚爱孩子的方法和频率、并告知建立依恋关系和防止分离焦虑的重要性。此时护士所依据的婴幼儿期心理卫生的原则是

A.促进运动能力

B.促进大脑发育

C.增进母爱

D.母乳喂养

E.活动性原则

【正确答案】C

【答案解析】儿童心理健康的常见问题维护方法有母爱、拥抱、抚摸儿童，是使儿童产生安全感，促进其心理健康发展的关键。

8.在下列医务人员的行为中，不符合有利原则的是

A.使患者受益，但却给别人造成了较大的伤害

B.在人体实验中，可能使受试者暂不得益，但却使社会、后代受益很大

C.与解除患者的疾苦有关

D.使患者受益且产生的不良反应很小

E.可能解除患者的疾苦

正确答案：A

答案解析：要求医务人员的行为对患者确有助益，必须符合以下条件：患者的确患有疾病；医务人员的行动与解除患者的疾苦有关；医务人员的行动可能解除患者的疾苦；患者受益不会给别人带来太大的损害。有利原则与不伤害原则的冲突时，要求医务人员使医疗行为能够得到最大可能的益处。在人体实验中，受试者可能并不得益，但这种实验对社会有好处。

9.肺癌常见的症状是

A.脓性痰

B.白色泡沫痰

C.刺激性咳嗽和血痰

D.胸闷、气短

E.肺部干啰音

【正确答案】C

【答案解析】肺癌常见的症状是刺激性咳嗽和血痰。刺激性咳嗽是癌肿在带较大支气管内生长所致，血痰为痰中带血点血丝或断续少量咯血。中年以上久咳不愈或出现血痰，就应提高警惕。

10.患者表现为食欲不振，厌油，恶心，腹胀，肝区疼痛，黄疸。诊断为乙肝患者。HBV 基因组为

A.DNA 病毒

B.小 RNA 病毒科

C.单股正链 RNA

D.单股环状 RNA

E.以上均不是

【正确答案】A

【答案解析】乙型肝炎病毒（HBV）属嗜肝 DNA 病毒科正嗜肝病毒属。

11.属于生酮兼生糖的氨基酸

A.亮氨酸

B.苯丙氨酸

C.赖氨酸

D.精氨酸

E.甲硫氨酸

【正确答案】B

【答案解析】在 20 种组成人体蛋白质的氨基酸中，生糖兼生酮氨基酸有 5 种，及异亮、苯、酪、色、苏，记忆“一本落色书”。

12.正常二尖瓣口面积是

A.3～5cm2

B.4～6cm2

C.2～4cm2

D.5～6cm2

E.3～4cm2

【正确答案】B

【答案解析】正常二尖瓣口面积是 4～6cm2。

13.男，25 岁。反复腹痛、腹泻、便血 10 个月。近日加重伴发热，体温 39℃，1 天前因腹痛肌注阿托品治疗 6 小时后腹胀明显。查体：70/50mmHg，心率 120 次/分。最可能出现的情况是

A.肠套叠

B.肠穿孔

C.肠梗阻

D.肠出血

E.中毒性巨结肠

【正确答案】E

【答案解析】患者的临床表现考虑溃疡性结肠炎，应用阿托品后引起中毒性巨结肠，病情加重。中毒性巨结肠，多发生在暴发型或重症溃疡性结肠炎患者。此时结肠病变广泛而严重，累及肌层与肠肌神经丛，肠壁张力减退，结肠蠕动消失，肠内容物与气体大量积聚，引起急性结肠扩张，一般以横结肠为最严重。常因低钾、钡剂灌肠、使用抗胆碱能药物或阿片类制剂而诱发。临床表现为病情急剧恶化，毒血症明显，有脱水与电解质平衡紊乱，出现鼓肠、腹部压痛，肠鸣音消失。血常规白细胞计数显著升高。X 线腹部平片可见结肠扩大，结肠袋消失。

14.Dugas 征表现阳性的是

A.肩关节脱位

B.肩锁关节脱位

C.肱骨外科颈骨折

D.肘关节脱位

E.锁骨骨折

【正确答案】A

【答案解析】Dugas 征为肩关节脱位的主要特征性表现。

15.判断心脏骤停迅速简便的方法是

A.触摸大动脉搏动是否存在

B.测量有无血压

C.作心电图检查有无心电图活动

D.看瞳孔是否散大

E.看呼吸是否存在

【正确答案】A

【答案解析】心脏骤停是指心脏射血功能突然终止。导致心脏骤停其机制最常见的是心室颤动，其次为心室停顿、缓慢心律失常、室性心动过速或电-机械分离。以下体征有助于立即判断是否心脏停搏：意识丧失，颈动脉、股搏动消失，心音消失，呼吸断续或停止。最简便的方法是触摸颈动脉或股动脉搏动存在与否，而测量血压、作心电图检查等均费时间。

16.女，35 岁。间断黏液脓血便 2 年。伴里急后重，大便每日 3 次，反复应用多种抗生素治疗，症状无明显缓解，最有可能诊断的是

A.慢性细菌性痢疾

B.肠伤寒

C.阿米巴痢疾

D.溃疡性结肠炎

E.肠易激综合征

【正确答案】D

【答案解析】根据题干中所述，黏液脓血便提示为溃疡性结肠炎，且使用多种抗生素治疗无效。选 D。

17.男性，50 岁，患有胸骨后甲状腺肿伴甲亢。治疗宜选择

A.放射性 131I 治疗

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

B.抗甲状腺药物

C.普萘洛尔

D.甲状腺次全切除术

E.碘剂

【正确答案】D

【答案解析】胸骨后甲状腺肿伴甲亢是手术的指征。

18.牛牛，男孩，5岁，因发热3日到县医院就诊，门诊接诊医师张某检查后发现牛牛的颊黏膜上有科氏斑，拟诊断为麻疹。张某遂嘱家长带牛牛去市传染病医院就诊。按照传染病防治法的规定，张某应当

A.向医院领导报告，确诊后对刘某就地进行隔离

B.在规定时间内，向当地防疫机构报告

C.请上级医师会诊，确诊后隔离治疗

D.向医院领导报告，确诊后由防疫部门进行转送隔离

E.请上级医师会诊，确诊后再转诊

【正确答案】B

【答案解析】按照传染病防治法的规定，张某应当在规定时间内，向当地防疫机构报告。

19.女，35岁，因输卵管破裂出血1小时急诊入院，怀孕3次，自然流产2次，顺产1胎，术前查Hb75g/L，术中输注悬浮红细胞5单位，术后第1天复查Hb100g/L，术后第8天出现皮肤、巩膜黄染，发热，体温38℃，检查HB70g/L，该患者可能发生的输血不良反应是

A.输血性肝炎

B.过敏反应

C.细菌污染反应

D.非溶血性发热反应

E.迟发型溶血反应

【正确答案】E

【答案解析】溶血性输血反应是输血后红细胞受到破坏而引起的一系列反应，有急性溶血性输血反应和迟发型溶血性输血反应之分。

20.下丘脑控制生物节律的可能部位是

A.外侧区

B.腹内侧区

C.视前区

D.视交叉上核

E.室旁核

正确答案：D

答案解析：机体内许多功能活动都按一定的时间顺序发生周期性变化，称为生物节律。下丘脑的视交叉上核是控制生物节律的中心。

21.女，70 岁。间断咳嗽、咳痰 10 年，活动后气短半年，查体：双肺呼吸音减弱，心率 80 次/分，律齐。 胸部 X 线未见明显异常。为明确诊断首选的检查是

A.肺功能

B.胸部 X 线

C.胸部 MRI

D.胸部 CT

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/198133066062007035