

神经内科出科试题及答案

1、诊断运动终板功能障碍最敏感的方法是（ ）

- A、运动功能传导速度测定
- B、重复神经电刺激
- C、单纤维肌电图
- D、感觉功能传导速度测定
- E、高频刺激肌电图

答案：C

2、癫痫大发作的诊断依据不包括（ ）

- A、突然性、间歇性发作
- B、发作时意识障碍
- C、可有自伤、尿失禁
- D、瞳孔缩小、对光反射消失
- E、脑电图异常

答案：D

3、尽管 Parkinson 病是由于多巴胺缺乏所致，治疗用 L-dopa 而不是多巴胺的原因是（ ）

- A、L-dopa 较多巴胺会产生较少的恶心、呕吐
- B、多巴胺在胃肠道容易代谢成无效成分
- C、L-dopa 更易于在胃肠道吸收
- D、多巴胺不能穿过血脑屏障，对中枢神经系统没有治疗效果
- E、L-dopa 较多巴胺在受体部位的效率更高

答案：D

4、当 C5~T2 脊髓前连合受损时可出现（ ）

- A、双上肢深浅感觉均减退或丧失
- B、双上肢痛温觉减退或丧失，但触觉及深感觉保留
- C、双上肢及上胸部深浅感觉均减退或丧失
- D、双上肢及上胸部痛温觉减退或丧失，但触觉及深感觉保留
- E、双上肢痛温觉及触觉障碍，但深感觉保留

答案：B

5、患者左侧动眼神经麻痹，右侧中枢性面神经、舌下神经瘫及上、下肢中枢性瘫痪，病灶定位在（ ）

- A、左侧内囊
- B、右侧丘脑
- C、左侧脑桥

D、左侧中脑

E、右侧中脑

答案：D

6、脊髓侧索急性损伤可导致受损平面以下（ ）

A、同侧肌肉瘫痪

B、对侧肌肉瘫痪

C、同侧腱反射永远消失

D、对侧腱反射永远消失

E、同侧痛温觉丧失

答案：A

7、癫痫持续状态是指（ ）

A、小发作持续 24 小时以上

B、大发作持续 24 小时以上

C、大发作接连发生，间歇期仍处于昏迷状态

D、癫痫大发作药物控制不良者

E、短期内小发作接连发生

答案：C

8、判定下列何项正确（ ）

A、MRI 图像呈黑色时，称为低强度信号，也即长 T1 加权像，或短，T2 加权像

B、图像呈白色时，称为高强度信号，也即短 T1 加权像，或长，T2 加权像

C、在 T1 加权像上，脑脊液 T1 长，呈黑色，在 T2 加权像上，脑脊液 T2 长，磁共振信号强，呈白色

D、在 T1 加权像上，脂肪 T1 短，磁共振信号强，呈白色

E、以上全正确

答案：E

9、男，70 岁，右利手，某日晨起家人发现他不能讲出物体的名称及家人的姓名。该患者言语障碍是（ ）

A、运动性失语

B、感觉性失语

C、命名性失语

D、混合性失语

E、癔病性失语

答案：C

10、低钾型周期性瘫痪的常见发病诱因是（ ）

- A、饱餐和寒冷
- B、嗜睡和少尿
- C、多汗和烦渴
- D、心率缓慢和 u 波出现
- E、嗜盐

答案：A

11、急性感染性多发性神经炎起病前常有（ ）

- A、外伤史
- B、感染病史
- C、药物中毒史
- D、发作性低钾史
- E、糖尿病史

答案：B

12、12岁男孩，两年来常出现发作性发呆，历时数秒自动缓解，半年来出现全身强直，阵挛样抽搐发作，治疗应首选（ ）

- A、乙琥胺
- B、卡马西平
- C、丙戊酸钠
- D、苯妥英钠
- E、苯巴比妥鲁米那

答案：C

13、去皮质综合征的特征性临床表现为（ ）

- A、病理征阴性
- B、对光反射消失，角膜反射存在
- C、觉醒-睡眠周期消失
- D、上肢屈曲，下肢伸直
- E、有意识的咀嚼和吞咽动作

答案：D

14、视辨距障碍试验，出现“过射现象”，提示（ ）

- A、周围性前庭病变
- B、中枢性前庭病变
- C、脑桥病变
- D、小脑病变
- E、巴比妥类药物中毒

答案：D

15、急性感染性多发性神经炎的首发症状通常为 ()

- A、四肢远端对称性无力
- B、呼吸困难
- C、双侧周围性面瘫
- D、吞咽困难
- E、大、小便潴留

答案：A

16、癫痫失神发作最不宜应用的药物是 ()

- A、氯硝安定
- B、乙琥胺
- C、苯琥胺
- D、苯妥英钠
- E、丙戊酸钠

答案：D

17、18岁男孩，2年来动作缓慢逐渐加重，近6个月出现双手明显震颤、构音含糊。体检：面色灰暗，肝脾肿大，四肢肌张力增高，反射对称，无锥体束征和感觉障碍，裂隙灯检查示角膜后弹力层有绿褐色沉积物。本病最可能的诊断为 ()

- A、迟发性运动障碍
- B、肌张力障碍
- C、肝豆状核变性
- D、特发性震颤
- E、帕金森病

答案：C

18、1917~1928年伴随病毒性流感出现的传染性 von Economo's 脑炎(嗜睡性脑炎)，其最显著的神经系统并发症是 ()

- A、失明
- B、听力下降
- C、截瘫
- D、帕金森病
- E、失禁

答案：D

19、主侧半球的哪个部位受损会造成感觉性失语 ()

- A、颞中、下回后部
- B、额中回后部

- C、颞上回后部
- D、顶叶的中央后回
- E、顶叶缘上回

答案：C

20、颈内动脉系统短暂脑缺血发作最常见的症状是（ ）

- A、对侧上肢或下肢的发作性瘫痪
- B、对侧偏身感觉障碍
- C、失语
- D、同侧单眼失明
- E、对侧偏瘫

答案：A

21、关于癫痫的药物治疗，下述哪项是不正确的（ ）

- A、药物选择决定于发作类型
- B、药物自低限量开始
- C、定期复查，注意毒性反应及副作用
- D、不能突然停药、换药
- E、开始即用数药同时治疗

答案：E

22、急性脊髓炎与急性感染性多发性神经炎的鉴别是（ ）

- A、是否呈弛缓性瘫痪
- B、有无感觉障碍
- C、有无尿潴留
- D、有无脑脊液蛋白增高
- E、有无自主神经功能障碍

答案：C

23、全脑非惊厥性发作的发作形式不包括（ ）

- A、典型失神小发作
- B、非典型失神发作
- C、失张力性发作
- D、肌阵挛性发作
- E、单纯部分性发作

答案：E

24、一位 67 岁的男性 2 年来出现进行性记忆力减退，其他方面检查未见异常，诊断为 Alzheimer 病。语言检查最可能发现下列哪种异常（ ）

- A、无异常

- B、缄默
- C、传导性失语
- D、经皮质感觉性失语
- E、经皮质完全性失语

答案：D

25、特发性面神经麻痹的治疗原则下列哪项不正确（）

- A、早期手术治疗
- B、改善局部血液循环
- C、减轻面神经水肿
- D、促进炎症消退
- E、促进神经功能恢复

答案：A

26、日本脑炎的主要病原体为（）

- A、HSV-I
- B、狂犬病毒
- C、脊髓灰质炎病毒和其他肠道病毒
- D、虫媒病毒
- E、带状疱疹病毒

答案：D

27、MS 患者 CSF 的典型表现是（）

- A、葡萄糖水平低于血清中葡萄糖水平的 20%
- B、蛋白水平持续升高
- C、IgG 水平持续升高
- D、单个核细胞计数超过 100 个/mm³
- E、红细胞计数超过 10 个/mm³

答案：C

28、男性，62 岁，4 小时前因与他人争吵突然出现头痛、恶心、呕吐及右侧肢体无力，10 分钟后意识不清。查体：血压 180/120mmHg，浅昏迷，脑膜刺激征阳性。右肢体肌力 0 级。脑 CT 示左基底节区类圆形高密度影，该患者的诊断是（）

- A、脑出血
- B、脑栓塞
- C、蛛网膜下腔出血
- D、高血压脑病
- E、脑血栓形成

答案：A

29、原发性帕金森病主要病变部位在（ ）

- A、丘脑
- B、黑质-纹状体
- C、蓝斑
- D、中脑核
- E、迷走神经背核

答案：B

30、患者 15 岁，于 3 年前开始有发作性意识丧失，全身抽搐，持续 5~6 分钟恢复，发作时面色青紫，有时伴尿失禁，舌咬伤，有时夜间睡眠中发作。体检及各项检查均正常。患者叔父有与患者相同的病史。该患者应诊为何病（ ）

- A、癔症
- B、特发性失神发作
- C、症状性失神发作
- D、特发性全面强直阵挛发作
- E、症状性全面强直阵挛发作

答案：D

31、下列情况中不符合急性脊髓炎的临床表现为（ ）

- A、病前常有呼吸道感染症状
- B、损害平面以下传导束型感觉障碍
- C、尿便障碍
- D、损害平面以下运动障碍
- E、急性起病，早期出现肌张力增高，腱反射亢进

答案：E

32、男性，9 岁，反复肢体抽搐伴意识不清 3 年及记忆力减退 1 年。体检：鼻翼旁颧部对称分布粟米大小散在的浅粉色丘疹，智商测定为 48。余神经系统检查无异常。该患者可能的诊断为（ ）

- A、神经纤维瘤病
- B、红斑狼疮
- C、脑面血管瘤病
- D、结节硬化症
- E、肝豆状核变性

答案：D

33、患者清晨起床后出现左眼不能闭合，左侧眼裂较右侧大，左侧额纹消失，左侧鼻唇沟变浅，口角右歪，其病变累及（ ）

- A、左侧动眼神经
- B、左侧三叉神经
- C、左侧面神经
- D、左侧大脑半球
- E、以上都不是

答案：C

34、急性脊髓炎与格林巴利综合征鉴别在于后者（）

- A、多为截瘫或四肢瘫，锥体束征阳性
- B、明显的传导束型感觉障碍
- C、早期出现括约肌功能障碍
- D、脑脊液偶见细胞稍增多
- E、脑脊液呈蛋白-细胞分离现象

答案：E

35、一患者因车祸出现腰膨大损害，并有阳痿症状，说明病变在（）

- A、腰1～腰2
- B、腰2～腰4
- C、腰5～骶1
- D、骶1～3
- E、骶3～5

答案：E

36、下列哪项不符合失语症（）

- A、运动性失语的病损在主侧半球额下回后部
- B、感觉性失语的病损在主侧半球颞中、下回后部
- C、运动性失语是不能讲话，但能听懂问话
- D、感觉性失语表现为说话多，流利，但答非所问
- E、检查失语症患者必须意识清醒，检查合作，无精神症状

答案：B

37、女性，26岁，傍晚时易出现复视、四肢乏力和酸痛，难以支持整白天工作，休息和晨起时有好转。检查：双眼睑轻下垂，左眼外展差，右眼下视差，双眼球其余各向活动正常。四肢肌力4度，肌张力正常，无其他异常神经损害体征。正常肌电图，但尺神经处重复电刺激后，支配肌的动作电位波幅递减30%。最佳的对症治疗为（）

- A、泼尼松
- B、维生素B12
- C、口服氧化钾

D、溴吡斯的明

E、阿托品

答案：D

38、54岁女性，劳动中突感头晕，相继左半身失灵，右眼闭合不全，双眼向左侧凝视，10余分钟后昏迷，高热、双瞳孔小、四肢软瘫，首先考虑的诊断是（）

A、小脑出血

B、脑桥出血

C、基底节脑出血

D、中脑出血

E、脑叶出血

答案：B

39、男，60岁，4个月来发作性左上肢无力、麻木3次，每次历时40分钟左右。神经系统检查正常。最可能的诊断是（）

A、颈椎病

B、短暂性脑缺血发作

C、局限性发作

D、脑占位病变

E、偏头痛

答案：B

40、脊髓半离断综合征常见于（）

A、急性脊髓炎

B、脊髓空洞症

C、急性硬膜外脓肿

D、脊髓髓外硬膜内肿瘤

E、脊髓亚急性联合变性

答案：D

41、患者有偏瘫，偏身感觉障碍和偏盲，最可能有下述哪条血管闭塞（）

A、大脑前动脉

B、大脑中动脉

C、大脑后动脉

D、内听动脉

E、脊髓前动脉

答案：B

42、成年Chiari(1型)畸形通常表现下述哪种症状（）

- A、癫痫
- B、脑积水
- C、共济失调
- D、痴呆
- E、精神病

答案：C

43、多发性硬化的典型临床表现特点为（ ）

- A、慢性起病后中枢神经上有多发病灶，病程中缓解复发
- B、急性和亚急性起病后中枢神经上多发病灶
- C、急性和亚急性起病后病情缓解和复发
- D、慢性起病后，中枢神经上多发病灶，进行性加重
- E、急性和亚急性起病后中枢神经上有多发病灶，病程中缓解复发

答案：E

44、同侧面部痛、温觉节段性丧失，触觉存在，呈葱皮样分布的感觉分离，见于（ ）

- A、同侧三叉神经脊束核病变
- B、对侧三叉神经脊束核病变
- C、同侧三叉神经感觉主核病变
- D、对侧三叉神经感觉主核病变
- E、以上都不对

答案：A

45、重症肌无力患者禁用的药物是（ ）

- A、氢氯噻嗪双氢克尿塞
- B、肾上腺皮质激素
- C、麻黄碱
- D、环磷酰胺
- E、氨基糖苷类抗生素

答案：E

46、急性脊髓炎不应出现（ ）

- A、脊髓休克
- B、病变节段以下感觉消失
- C、大小便潴留
- D、眼肌麻痹
- E、病变节段以下无汗

答案：D

47、原发性三叉神经痛有哪种表现（ ）

- A、面部感觉消失
- B、角膜反射消失
- C、张口下颌偏斜
- D、下颌反射减弱
- E、以上均没有

答案：E

48、有关 willis 环的位置，下列哪点是错误的（ ）

- A、脑底下方
- B、蝶鞍上方
- C、蝶鞍下方
- D、视交叉、灰结节及乳头体的周围

答案：C

49、Brudzinski 征阳性的表现为（ ）

- A、下肢抬不到 30° ，出现由上而下的放射性疼痛
- B、从掌面弹拨中间三指指尖，各指屈曲
- C、伸膝受限伴疼痛和屈曲痉挛
- D、颈抵抗存在
- E、双侧髋关节屈曲和膝关节屈曲

答案：E

50、一个 28 岁有癫痫病史的妇女，到医院就诊时显示注意力不集中，步态不稳。血液中苯妥英钠的浓度是 38，患者双眼的检查最可能出现的体征是（ ）

- A、患者左眼外展受限
- B、双眼外视时有粗大眼震
- C、双眼辐辏障碍
- D、视乳头水肿
- E、患者上视障碍

答案：B

51、患者 15 岁，有癫痫大发作史，服药后已 1 年未发，近来自动停药。今晨开始有多次惊厥发作，在两次发作之间意识不恢复，来院急诊时有频繁发作的抽搐伴神志昏迷，一般的首要治疗是（ ）

- A、副醛 8~10ml 保留灌肠
- B、苯巴比妥钠 0.2g，肌肉注射
- C、地西洋安定 10~20ml，静脉缓慢注射
- D、苯妥英钠 0.25g，肌肉注射

E、异戊巴比妥 500mg，静脉缓慢注射

答案：C

52、一 36 岁患者，临床上先出现脊髓的压迫症状，后期出现缺血性损害，应考虑（）

- A、脊柱病变
- B、脊髓外硬膜内病变
- C、脊髓硬膜外病变
- D、脊髓和脊柱的病变
- E、脊髓内病变

答案：E

53、椎基底动脉系统短暂脑缺血发作，不出现的症状是（）

- A、失写
- B、眩晕
- C、构音障碍
- D、复视
- E、交叉瘫

答案：A

54、脑栓塞最常见的病因是（）

- A、动脉粥样硬化
- B、风心病房颤
- C、感染性心内膜炎
- D、冠心病心肌梗死
- E、脑动脉炎症

答案：B

55、一位 67 岁的男性 2 年来出现进行性记忆力减退，其他方面检查未见异常，诊断为 Alzheimer 病。下列哪种药物可以减少患者入住老入院的可能（）

- A、维生素 B12
- B、维生素 E
- C、雌激素治疗
- D、金刚烷胺
- E、氟哌啶醇

答案：B

56、60 岁男性，活动中突感眩晕，枕部疼痛、呕吐、步态不稳，20 分钟后昏迷，呼吸节律不整，诊断脑出血，其部位是（）

- A、脑颞叶

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/198137100054006033>