

2023-24 年黑龙江省鸡东县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题真题答案下载

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2018 年真题）可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是（）

- A: 头孢呋辛
- B: 头孢他啶
- C: 头孢米诺
- D: 头孢唑林

答案：B

2. 下列维生素中，属于水溶性的是（）。

- A: 维生素 A
- B: 维生素
- C: 维生素
- D: 维生素

答案：D

3. 体内缺乏维生素 E 会导致

- A: 佝偻病
- B: 夜盲症
- C: 脚气病
- D: 孕育异常

答案：D

4. 典型不良反应为恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性的是

- A: 顺铂
- B: 亚叶酸钙
- C: 卡铂
- D: 奥沙利铂

答案：A

5. (2021 年真题) 促进尿酸排泄的抗痛风药物是 ()

- A: 双醋瑞因
- B: 苯溴马隆
- C: 双氯芬酸
- D: 秋水仙碱

答案：B

6. 双膦酸盐类药物的作用机制不包括

- A: 增加小肠和肾小管对钙的重吸收
- B: 直接改变破骨细胞的形态学
- C: 与骨基质理化结合，干扰骨吸收
- D: 抑制骨吸收性

答案：A

7. 属于头孢三代的是

- A: 拉氧头孢
- B: 头孢唑林
- C: 头孢曲松
- D: 头孢呋辛

答案：C

8. 与细菌核糖体的 30S 亚基结合，抑制细菌蛋白质合成的是 ()

- A: 青霉素
- B: 四环素
- C: 万古霉素
- D: 林可霉素

答案：B

9. 现有调脂药中降低 LDL 作用最强的一类药是

- A: 胆汁酸结合树脂
- B: 抗氧化剂
- C: 胆固醇吸收抑制剂
- D: 他汀类药物

答案：D

10. 铁剂用于治疗

- A: 巨幼细胞贫血
- B: 溶血性贫血
- C: 再生障碍性贫血
- D: 小细胞低血红蛋白性贫血

答案：D

11. 硝酸甘油的药理作用不包括

- A: 增加心率
- B: 扩张容量血管
- C: 减少回心血量
- D: 增加心室壁张力

答案：D

12. 每 1mg 硫酸鱼精蛋白可中和肝素约

A: 1000U

B: 1U

C: 10U

D: 100U

答案：D

13. 华法林过量导致的出血可选用的拮抗剂是()

A: 维生素 K

B: 氨甲苯酸

C: 维生素 B

D: 硫酸鱼精蛋白

答案：A

14. 需与氨基糖苷类联合应用治疗布鲁菌病和鼠疫的是

A: 红霉素

B: 氯霉素

C: 四环素

D: 青霉素

答案：C

15. 作用更为持久和抑制新骨形成的作用极低，可长期滞留于骨组织中，半衰期最长可达 300 日的第二代钙代谢调节药是

A: 依替膦酸二钠

B: 帕米膦酸二钠

C: 阿仑膦酸钠

D: 唑来膦酸

答案：B

16. 抗血小板药西洛他唑属于

- A: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂
- B: 维生素 K 拮抗剂
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: 整合素受体阻断剂

答案：C

17. 阿糖胞苷属于

- A: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- B: DNA 多聚酶抑制剂
- C: 胸苷酸合成酶抑制剂
- D: 核苷酸还原酶抑制剂

答案：B

18. 治疗滴虫病宜选用

- A: 甲硝唑
- B: 吡喹酮
- C: 甲苯咪唑
- D: 氯喹

答案：A

19. 与肝素相比，华法林的作用特点不包括

- A: 起效快
- B: 口服有效，应用方便
- C: 价格便宜
- D: 作用持久

答案：A

20. 硝酸甘油抗心绞痛的机制主要是

- A: 选择性扩张冠脉，增加心肌供血
- B: 扩张静脉，降低前负荷；扩张动脉，降低心肌耗氧
- C: 阻断 β 受体，降低心肌耗氧量
- D: 减慢心率，降低心肌耗氧量

答案：B

21. 神经毒性较严重的是

- A: 顺铂
- B: 卡铂
- C: 亚叶酸钙
- D: 奥沙利铂

答案：D

22. 高血压合并脑血管功能不全不宜选用

- A: 胍屈嗪
- B: 普萘洛尔
- C: 胍乙啶
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

23. 不明原因的腹痛、阑尾炎、胃肠道梗阻患者禁用()

- A: 硫酸镁
- B: 乳果糖
- C: 甘油
- D: 聚乙二醇 4000

答案：B

24. 下列降压药中属于血管紧张素 II 受体阻断药的是 ()

- A: 地尔硫
- B: 坎地沙坦
- C: 左旋氨氯地平
- D: 阿利克仑

答案: B

25. 长期使用应定期检查甲状腺功能的药物是

- A: 利多卡因
- B: 胺碘酮
- C: 普罗帕酮
- D: 索他洛尔

答案: B

26. 镇静作用明显的 H

- A: 阿司咪唑
- B: 苯海拉明
- C: 西咪替丁
- D: 组胺

答案: B

27. 对抗香豆素类过量引起出血可选用

- A: 鱼精蛋白
- B: 维生素 K
- C: 垂体后叶素
- D: 维生素

答案: B

28. 布美他尼属于下列哪类利尿药

- A: 保钾利尿药
- B: 中效能利尿药
- C: 碳酸酐酶抑制药
- D: 高效能利尿药

答案：D

29. 下列有关奎尼丁的叙述，不正确的是

- A: 具有抗胆碱和仅受体阻断作用
- B: 抑制 Na^+ 内流和 K^+ 外流
- C: 可用于治疗心房扑动和心房颤动
- D: 可用于强心苷中毒

答案：D

30. 患者，男，38 岁。因“发作性喘息”3 个月入院，发作时憋喘、全身大汗、端坐不能平卧，肺部可闻及哮鸣音。诊断为支气管哮喘，静脉滴注地塞米松。

- A: 特布他林
- B: 异丙托溴铵
- C: 氨茶碱
- D: 氟替卡松

答案：D

31. 口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 柳氮磺吡啶
- C: 磺胺甲
- D: 磺胺米隆

答案：B

32. 利多卡因的电生理作用错误的是

- A: 提高心室颤动阈值
- B: 明显影响动作电位 0 相
- C: 使传导减慢
- D: 缩短复极时间

答案：B

33. 可替代氯霉素用于治疗伤寒的药物是()

- A: 氨基糖苷类
- B: 四环素类
- C: 氟喹诺酮类
- D: 青霉素类

答案：C

34. 慢性外耳道炎时局部滴用，促使耳道干燥，可选用

- A: 伪麻黄碱
- B: 赛洛唑啉
- C: 3%硼酸乙醇
- D: 2%酚甘油

答案：C

35. 可增加肝毒性的药物是

- A: β 受体阻断剂
- B: 甲氨蝶呤
- C: 利福平
- D: 阿糖胞苷

答案：C

36. 刺激胰岛 B 细胞分泌胰岛素的是

- A: 磺酰脲类
- B: 胰岛素
- C: 二甲双胍
- D: A 和 B 均无效

答案：A

37. 早产系指妊娠在多少周之间结束者

- A: 18~37 周
- B: 25~37 周
- C: 28~37 周
- D: 28~38 周

答案：C

38. 可对第八对脑神经造成损害的是()

- A: 异烟肼
- B: 利福平
- C: 链霉素
- D: 乙胺丁醇

答案：C

39. ACEI 与其联用，除可增强降压效果外，还可减少后者引起的高肾素血症以及对血尿酸和血糖的不良影响的是()

- A: 人促红素
- B: 噻嗪类利尿药
- C: β 受体阻断药

D: 留钾利尿药

答案: B

40. 噻嗪类利尿药发挥利尿作用的作用点是

A: Na^+-Cl^- 共转运子

B: 磷酸二酯酶

C: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子

D: 碳酸酐酶

答案: A

41. 用于颅脑损伤的氨基酸制剂的是

A: 复方氨基酸注射液 (6AA)

B: 复方氨基酸注射液 (9AA)

C: 赖氨酸注射液

D: 复方氨基酸注射液 (18AA)

答案: C

42. 可使后者疗效显著下降的是

A: 红霉素

B: 他莫昔芬

C: 氯丙嗪

D: 维生素 C

答案: D

43. 氢氯噻嗪的利尿作用部位在 ()

A: 肾小球

B: 集合管

C: 远曲小管初段

D: 髓祥升支粗段

答案: C

44. 用于血氨升高所致精神症状的治疗

A: 赖氨酸

B: 精氨酸

C: 复方氨基酸注射液(18AA)

D: 复方氨基酸注射液(3AA)

答案: B

45. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

A: 抑制 H

B: 阻断组胺 H

C: 中和胃酸

D: 保护胃黏膜

答案: B

46. 下列属于非选择性 β 受体阻断剂的是

A: 阿替洛尔

B: 比索洛尔

C: 美托洛尔

D: 普萘洛尔

答案: D

47. 不得与碱性物质或铁器接触的是

- A: 林旦霜
- B: 克罗米通
- C: 阿达帕林
- D: 苯甲酸苄酯

答案：A

48. (2018 年真题) 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐, 宜选用的止吐治疗方案是 ()

- A: 化疗前使用昂丹司琼, 化疗后不需要继续使用止吐药
- B: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松, 化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼
- C: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦, 化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松
- D: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

答案：C

49. β -内酰胺类抗生素的抗菌机制是

- A: 影响胞浆膜的通透性
- B: 影响叶酸代谢
- C: 抑制细菌细胞壁的合成
- D: 抑制蛋白质合成的全过程

答案：C

50. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38. 8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82. 1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0. 59，每 6 小时一次。

- A: 氟康唑可减慢硝苯地平代谢引起下肢水肿
- B: 氟康唑抑制卡马西平代谢
- C: 氟康唑可延长口服降糖药的半衰期导致低血糖
- D: 氟康唑可使华法林代谢加快

答案：D

51. 属于雌激素的是

- A: 地塞米松
- B: 泼尼松龙
- C: 尼尔雌醇
- D: 甲羟孕酮

答案：C

52. 关于苯丙哌林与可待因镇咳作用强度比较，正确的是

- A: 苯丙哌林镇咳作用约为可待因的 2~4 倍
- B: 可待因镇咳作用约为苯丙哌林的 2 倍
- C: 可待因镇咳作用约为苯丙哌林的 2~4 倍
- D: 苯丙哌林镇咳作用约为可待因的 2 倍

答案：A

53. 属于肾上腺受体激动剂的降眼压药是()

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 拉坦前列素
- B: 噻吗洛尔
- C: 地匹福林
- D: 毛果芸香碱

答案：C

54. 对高肾素型高血压病有特效的是

- A: 尼群地平
- B: 肼屈嗪
- C: 依那普利
- D: 卡托普利

答案：D

55. 下述药物中属于缓解鼻黏膜充血引起的鼻塞、鼻出血的是()

- A: 过氧化氢
- B: 酚甘油
- C: 硼酸
- D: 盐酸麻黄碱

答案：D

56. 加重洋地黄中毒的易感因素为

- A: 低钾血症
- B: 伴有房颤的心功能不全
- C: 低镁血症
- D: 甲状腺功能减退症

答案：D

57. 甲氧氯普胺治疗呕吐和促胃肠运动的机制是()

- A: 抑制胃壁细胞的 H
- B: 抗幽门螺杆菌
- C: 阻断 CTZ 的 D
- D: 阻断 H

答案：C

58.（2021 年真题）属于阳离子型表面活性剂，可用于治疗咽喉炎的药物是（ ）

- A: 羟甲唑啉
- B: 度米芬
- C: 氨溴索
- D: 西地碘

答案：B

59. 可导致“类流感样”反应的药物是

- A: 降钙素
- B: 骨化三醇
- C: 糖皮质激素
- D: 阿仑膦酸钠

答案：D

60. 格列本脲的降糖作用机制是

- A: 艾塞那肽
- B: 二甲双胍
- C: 胰岛素皮下注射
- D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：D

61.（2016 年真题）属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

- A: 他莫昔芬
- B: 乙烯雌酚

C: 托瑞米芬

D: 氟他胺

答案：D

62. 乙胺丁醇的抗结核杆菌作用原理是

A: 抑制 RNA 多聚酶

B: 抑制分枝菌酸合成

C: 抑制蛋白质合成

D: 与锌离子络合、影响戊糖代谢

答案：D

63. 属于糖皮质激素引起的隐匿或延迟不良反应与并发症的是

A: 青光眼

B: Cushing 综合征体型

C: 胰腺炎

D: 骨质疏松症

答案：D

64. 主要用于经他莫昔芬辅助治疗 2~3 年后，绝经后雌激素受体阳性的妇女的早期浸润性乳腺癌的辅助治疗，直至完成总共 5 年的辅助内分泌治疗，以及经他莫昔芬治疗后，其病情仍有进展的自然或人工绝经后妇女的晚期乳腺癌，该药物是

A: 他莫昔芬

B: 依西美坦

C: 氟维司群

D: 来曲唑

答案：B

65. 单纯性下尿路感染可选择的药物是

- A: 利奈唑胺+哌替啶
- B: 磷霉素钠+万古霉素
- C: 利奈唑胺+苯丙醇胺
- D: 磷霉素氨丁三醇

答案：D

66. 对衣原体有效的是

- A: 替硝唑
- B: 克林霉素
- C: 红霉素
- D: 万古霉素

答案：C

67. 抑酸剂泮托拉唑长期应用可引起的典型不良反应是

- A: 定向力障碍
- B: 血尿酸升高
- C: 血糖升高
- D: 低镁血症

答案：D

68. 关于维 A 酸软膏治疗痤疮的说法，错误的是

- A: 不宜用于皮肤皱褶部位
- B: 使用初期可能出现皮肤干燥或脱屑，对紫外光敏感性增强，宜在睡前使用
- C: 为了加强疗效，可以一日多次给药
- D: 有明确的致畸性，妊娠期妇女禁用

答案：C

69. 属于可供静脉注射的胰岛素 / 胰岛素类似物的是

- A: 精蛋白锌胰岛素
- B: 预混胰岛素
- C: 地特胰岛素
- D: 普通胰岛素

答案：D

70. 可导致视神经炎的抗结核药是

- A: 利福喷丁
- B: 乙胺丁醇
- C: 利福平
- D: 吡嗪酰胺

答案：B

71. 雷尼替丁在使用中应注意

- A: 对食管有刺激性，需整片吞服
- B: 糖尿病患者避免使用
- C: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗
- D: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用

答案：B

72. 糖尿病合并酮症酸中毒的患者()

- A: 可促进周围组织细胞(肌肉等)对葡萄糖的利用和抑制肝糖原异生作用
- B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- C: 抑制葡萄糖苷酶
- D: 胰岛素皮下注射

答案：D

73. 低精蛋白锌胰岛素是

- A: 磺酰脲类
- B: 中效类胰岛素
- C: 长效类胰岛素
- D: α -葡萄糖苷酶抑制剂

答案：B

74. 属于第二代喹诺酮类药物的是

- A: 莫西沙星
- B: 吡哌酸
- C: 诺氟沙星
- D: 萘啶酸

答案：B

75. 作用于 DNA 拓扑异构酶 II 的抗肿瘤药物是

- A: 来曲唑
- B: 顺铂
- C: 依托泊苷
- D: 紫杉醇

答案：C

76. (2015 年真题) 用于低分子肝素过量时解救的药品是 ()。

- A: 酚磺乙胺
- B: 鱼精蛋白
- C: 氨甲环酸
- D: 维生素 K1

答案：B

77. 周某，男，31 岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

- A: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离
- B: 注意预防铁负荷过重
- C: 选择适宜的病期、疗程和监测
- D: 尽量选择三价铁

答案：D

78. 联用治疗细菌性心内膜炎的是()

- A: 青霉素和磺胺嘧啶
- B: 链霉素和磺胺嘧啶
- C: 青霉素和链霉素
- D: 链霉素和异烟肼

答案：C

79. 糖尿病酮症酸中毒患者宜选用

- A: 珠蛋白锌胰岛素
- B: 格列喹酮
- C: 正规胰岛素
- D: 二甲双胍

答案：C

80. 对伴有同型半胱氨酸升高的高血压患者在降压的同时应注意补充

- A: 维生素 K+维生素 B
- B: 维生素 B₂+维生素 C
- C: 叶酸+维生素 B₁₂

D: 维生素 C+维生素

答案：C

81. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 肾功能不全者

B: 老年人

C: 推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在 15~20mg/L 并且长疗程的患者

D: 肝功能不全者

答案：D

82. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的药品是()。

A: 哌唑嗪

B: 替米沙坦

C: 坦洛新(坦索罗辛)

D: 依那普利

答案：B

83. 用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病时能够出现寒战、咽痛、心率加快等症状，其原因可能是大量病原体被杀灭后出现的全身性反应，这种反应称为

A: 吉海反应

B: 瑞夷综合征

C: 青霉素脑病

D: 金鸡纳反应

答案：A

84. 抗菌谱广，对厌氧菌也有强大抗菌活性，对 β -内酰胺酶高度稳定的药物是()

- A: 他唑巴坦
- B: 克拉维酸
- C: 美罗培南
- D: 氨曲南

答案：C

85. 伴有（）的患者在应用 ACEI 首剂治疗时可能出现严重低血压

- A: 干咳
- B: 低钠血症
- C: 脑水肿
- D: 蛋白尿

答案：B

86. 属于促动力药的是()

- A: 胃蛋白酶
- B: 奥美拉唑
- C: 胶体果胶铋
- D: 莫沙必利

答案：D

87. 患者，男，50 岁。旅游登山时突发头晕，症状持续不缓解。查体：148 / 90mmHg，心率 80 次 / 分，医嘱卡托普利、氢氯噻嗪治疗。

- A: 氢氯噻嗪可增加卡托普利的肾血流量

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 卡托普利可提高氢氯噻嗪的血尿酸水平

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/206042230104011030>