2024年河北省固安县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库【】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.正常成人血清尿素氮(BUN)的正常参考区间为()：

A：3.2～7.1mmol/L

B：3.8～6.1mmol/L

C：1.8～6.5mmol/L

D：2.2～5.1mmol/L

答案：A

2.患者向药师咨询停用口服避孕药后多久可备孕。下列答复中正确的是()

A：长效避孕药停药后即可备孕

B：复方短效口服避孕药停药后即可备孕

C：复方短效口服避孕药停药6个月后方可备孕

D：复方短效口服避孕药停药3个月后方可备孕

答案：B

3.（2015年真题）下列药物属于肝药酶诱导剂的是（）。

A：环丙沙星

B：卡马西平

C：氟康唑

D：胺碘酮

答案：B

4.患者，女，64岁，既往高血压病病史15年，活动后心悸、气短3年，2小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190／110mmHg，R307欠／分，Bp108次／分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿哕音。

A: 心房颤动

B: 室性期前收缩

C: 阵发性室上性心动过速

D: 心室颤动

答案：A

5.可消除便秘，避免腹腔感染和腹膜透析液引流不畅的药物是

A: 对乙酰氨基酚

B: 阿法骨化醇

C: 乳果糖

D: 铁剂

答案：C

6.属于促动力药的是（）

A: 埃索美拉唑

B: 铝碳酸镁

C: 多潘立酮

D: 法莫替丁

答案：C

7.可用于紫癜辅助治疗的药物是

A: 维生素A

B: 维生素C

C: 维生素

D: 复合维生素B

答案：B

8.以下药物中，最可能引起嗜酸性粒细胞增多的是

A: 泼尼松

B: 头孢哌酮

C: 甲基多巴

D: 坎地沙坦

答案：B

9.运动员禁用药物中，β 受体阻断剂产生的危害是

A: 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡

B: 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患

C: 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖

D: 易造成人体严重脱水、肾衰竭

答案：A

10.患者，女，48岁，因耐药菌引起的心内膜炎使用万古霉素治疗。

A: 低浓度、快速滴注

B: 低浓度、缓慢滴注，时间控制在6小时以上

C: 低浓度、缓慢滴注，时间控制在2小时以上

D: 高浓度、快速滴注，时间控制在1小时以内

答案：C

11.急性肠炎可出现()。

A: 脐状便

B：稀糊便

C：鲜血便

D：脓血便

答案：B

12.以下毒物中毒，适宜服吐根糖浆催吐的是

A：磷化锌

B：阿米替林

C：氯硝西泮

D：苯巴比妥

答案：B

13.长期大量应用容易导致体重明显增加的是

A：酮替芬

B：盐酸异丙嗪

C：氯雷他定

D：色甘酸钠

答案：A

14.青霉素钠注射液作为皮肤过敏试验的浓度是

A：100U/ml

B：250U/ml

C：750U/ml

D：500U/ml

答案：D

15.避免用于儿童退热，可能引起Reye’s综合征的药物是

A：对乙酰氨基酚

B：塞来昔布

C：阿司匹林

D：布洛芬

答案：C

16.可应用于有反复性偏头痛的抗偏头痛药是

A：对乙酰氨基酚

B：苯噻啶

C：阿司匹林

D：地西泮

答案：B

17.服用他达拉非后，如果舌下含服硝酸甘油，建议服药间隔时间应为

A：48小时

B：24小时

C：4小时

D：1周

答案：A

18.关于癌症疼痛患者止痛药使用原则的说法，错误的是（）

A：提倡无创给药方式，尽量口服

B：应个体化用药

C：按阶梯给药

D：疼痛时用药，不痛时无需用药

答案：D

19.患者，女，59岁，一月前患胃溃疡，近日查体发现血脂异常化验结果：TC7.2mmol/L，TG1.7mmol/L，LDL-C4.3mmol/L，ALT56U/L，AST80U/L。该患者首选的调脂药是()

A: 阿昔莫司胶囊

B: 阿托伐他汀钙片

C: 非诺贝特片

D: 普罗布考片

答案：B

20.可引起驾驶员视力模糊的药物是

A: 东莨菪碱

B: 阿米洛利

C: 双嘧达莫

D: 抗过敏药

答案：A

21.（2015年真题）患者，女，55岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的NSAID的药物是（）。

A: 双氯芬酸

B: 布洛芬

C: 塞来昔布

D: 吲哚美辛

答案：C

22.使用前应用原药进行皮试的药物是

A: 阿莫西林胶囊

B: 左氧氟沙星片

C：注射用头孢曲松钠

D：阿奇霉素片

答案：C

23.病毒性肝炎、肝硬化等可引起

A：尿蛋白检测阳性

B：尿酸碱度增高

C：尿酸碱度降低

D：尿胆红素检测阳性

答案：D

24.评估房颤患者血栓栓塞风险的方法是

A：CHA，DS，-VASe评分

B：HAS-BLED评分

C：FEV1占预计值%

D：CTP分级

答案：A

25.患者，女，30岁，妊娠7个月，既往有磺胺类药过敏史。近日双眼沙眼症状加剧，发痒、分泌物增多并有烧灼感。药师应推荐的治疗药物是

A：硫酸锌滴眼液

B：氯霉素滴眼液

C：利巴韦林滴眼液

D：磺胺醋酰钠滴眼液

答案：A

26.分娩前应用可引起新生儿循环障碍和灰婴综合征的药物是

A: 丙硫氧嘧啶

B: 维生素D

C: 维生素A

D: 氯霉素

答案：D

27.兴奋交感神经，引起高血压的药物是

A: 伪麻黄碱

B: 咖啡因

C: 糖皮质激素

D: 重组人促红细胞生成素

答案：B

28.慎用硝酸甘油的原因是

A: 引起多尿或多汗

B: 致使视力模糊

C: 致使定向力障碍

D: 引起嗜睡

答案：B

29.据统计，妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达80%左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则，以确保胎儿及乳儿的安全。

A: 米非司酮

B: 阿莫西林

C: 水溶性维生素

D: 青霉素

答案：A

30.患者女，68岁体重54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查ALT20IU/L，血肌酐(Cr)1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为1日1.5～6g，分2～3次给药肌酐清除率为31~50ml/min时剂量为每12小时1g；肌酐清除率为16～30ml/min时剂量为每24小时1g；肌酐清除率为6~15ml/min时量为每24小时0.5g；肌酐清除率≤5ml/min时剂量为每48小时0.5g。

A: 40ml/min

B: 25.5ml/min

C: 30ml/min

D: 34ml/min

答案：B

31.属于H2受体拮抗剂的是（）

A: 铝碳酸镁

B: 埃索美拉唑

C: 多潘立酮

D: 法莫替丁

答案：D

32.会干扰乙醇代谢过程导致双硫仑样反应,用药期间不宜饮酒的药物是()

A: 阿奇霉素

B: 对乙酰氨基酚

C: 阿司匹林

D: 甲硝唑

答案：D

33.能降LDL也降HDL的药物是

A：普罗布考

B：非诺贝特

C：烟酸

D：塞伐他汀

答案：A

34.抗结核治疗中，细胞内外均有杀菌作用，且单一杀菌力最强的药物是

A：乙胺丁醇

B：吡嗪酰胺

C：利福平

D：异烟肼

答案：D

35.《药物事实与比较》属于

A：药物综合信息

B：药品标准

C：药物相互作用

D：药品不良反应

答案：A

36.氟乙酰胺中毒的特效解毒剂是

A：乙酰胺

B：青霉胺

C：维生素K

D：纳洛酮

答案：A

37.癫痫持续状态首选的药物是

A：丙戊酸钠

B：卡马西平

C：地西泮

D：拉莫三嗪

答案：C

38.根据中国营养学会推荐，老年人在每日饮食之外，应补充的元素钙剂量为（??）

A：50mg

B：100mg

C：2000—4000mg

D：500—600mg

答案：D

39.患者,女,71岁,2型糖尿病史10年。化验结果糖化血红蛋白(HbA)9.2%,空腹血糖10.5mmol/L,餐后血糖15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片0.5gtidpo,格列美脲片2mgtidpo,罗格列酮片2mgbidpo,甲钴胺片0.5mgtidpo,羟苯磺酸钙胶囊250mgbidpo。

A：立刻舌下含服硝酸甘油片

B：立刻喝白开水200mL

C：立刻口服糖水或糖块

D：立刻服用美托洛尔片

答案：C

40.不得将咨询档案等患者的资料用于商业目的

A：特别关注特殊人群

B: 解释的技巧

C: 保护患者的隐私

D: 及时回答不拖延

答案：C

41.糖尿病患者一旦出现尿酮体阳性，可以提示患者

A: 病情尚未控制

B: 胰岛素分泌过度

C: 伴甲状腺功能亢进

D: 生长激素分泌过度

答案：A

42.妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常，其中最易受到药物影响，可能产生形态或者功能上异常而造成胎儿畸形的阶段是：

A: 妊娠1～2周

B: 妊娠3～12周

C: 妊娠27～32周

D: 妊娠13～27周

答案：B

43.适用于早期、轻度症状者

A: 苯海索

B: 司来吉兰

C: 左旋多巴

D: 恩托卡朋

答案：B

44.荨麻疹患者常出现

A：中性粒细胞增多

B：嗜酸性粒细胞增多

C：血红蛋白减少

D：血小板计数增高

答案：B

45.某患者，女性，28岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示Hb＜90g／L。

A：白消安

B：维生素B12

C：叶酸

D：富马酸亚铁

答案：D

46.提示：可能引起咳嗽，是针对

A：氯苯那敏

B：铋制剂

C：氟西汀

D：卡托普利

答案：D

47.（2018年真题）患者,男,65岁,诊断为高血压（2级）,同时有哮喘病史,不宜选用的药物是（）

A：多沙唑嗪

B：非洛地平

C：卡托普利

D：普萘洛尔

答案：D

48.如万络（罗非昔布）撤市市发现大剂量服用万络者患心肌梗死和心脏猝死的危险增加了3倍

A: 药品上市后风险评估

B: 药品上市前风险评估

C: 发现与规避假、劣药流入市场

D: 发现药品质量问题

答案：A

49.用于锑、铅、汞、砷中毒的解救药物是()。

A: 谷胱甘肽

B: 氯丙嗪

C: 二巯基丁二钠

D: 盐酸烯丙吗啡

答案：C

50.有时需要利用所提供的参考文献去验证信息的正确性是指

A: 二级信息源

B: 四级信息源

C: 一级信息源

D: 三级信息源

答案：D

51.季节性过敏性鼻炎主要的诱因是

A: 尘埃

B: 季节

C: 真菌

D：花粉

答案：D

52.患者用药咨询的内容是

A：减肥、补钙、补充营养素

B：栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法

C：抗菌药物的合理使用

D：不宜选用氯化钠注射液溶解的药品

答案：B

53.心力衰竭伴心绞痛应首选的药物是

A：美托洛尔

B：单硝酸异山梨酯

C：硝酸甘油

D：氨氯地平

答案：A

54.酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之对中枢神经出现抑制，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加发生不良反应的几率。

A：呋喃唑酮

B：克林霉素

C：依替米星

D：庆大霉素

答案：A

55.美国食品药品监督管理局(FDA)根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为A、B、C、D、X五个级别。卡托普利属于()

A：A级

B：D级

C：C级

D：B级

答案：B

56.治疗反复性偏头痛推荐应用的处方药是

A：麦角胺咖啡因

B：谷维素

C：阿司匹林

D：苯妥英钠

答案：A

57.以下所列项目中，处理误服毒物不久、神志尚清醒的中毒患者的首要措施是

A：导泻与洗肠

B：催吐、洗胃

C：给氧气吸入

D：静脉补液

答案：B

58.低比重尿主要见于

A：急性肾衰竭少尿期

B：尿崩症

C：糖尿病

D：急性肾小球肾炎

答案：B

59.（2017年真题）下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法,错误的是（）

A：应避免同时使用两种双膦酸盐

B：口服后30分钟内应保持立位或坐位

C：食管炎为典型不良反应

D：随餐服用,并大量饮水,可增加吸收、减少胃肠道刺激

答案：D

60.（2019年真题）某批次青霉素钠原料1mg相当于1670单位效价，生产规格为80万U/支的青霉素钠产品，每支所需的装量是

A：1.33g

B：0.48g

C：2.088mg

D：1.33mg

答案：B

61.抗高血压不能合用的药物

A：钙通道阻滞药和硫酸镁

B：钙通道阻滞药和ACEI或ARB

C：α受体阻滞药和β受体阻滞药

D：利尿药和β受体阻滞药

答案：A

62.典型结核病的临床表现错误的是

A：咳嗽

B：食欲减退

C：乏力

D：高热

答案：D

63.（2021年真题）影响药物治疗有效性的因素不包括（）

A：患者的病生理状态

B：给药途径

C：药品价格

D：药物相互作用

答案：C

64.患者女27岁确诊慢性乙型肝炎3年，近日化验结果:HBV-DNA2×105opies/ml,ALT122U/L.拟予以病毒治疗首选的药物是()

A：阿糖腺苷

B：利巴韦林

C：泛昔洛韦

D：恩替卡韦

答案：D

65.溶栓作用无选择性，降解纤维蛋白凝块，也降解纤维蛋白原和其他血浆蛋白的药物是

A：噻氯匹定

B：华法林

C：链激酶

D：肝素

答案：C

66.应用格列本脲时，应注意的事项是

A：用药期间宜吃高蛋白食物

B：服药期间不宜饮茶

C：服药期间不宜饮酒

D：用药期间不宜食用富含组胺类的食物

答案：C

67.（2015年真题）治疗大肠埃希菌所致的尿路感染，不宜选用的抗菌药是（）。

A：阿奇霉素

B：左氧氟沙星

C：阿莫西林

D：头孢呋辛

答案：A

68.痛风急性发作期应禁用的药物是

A：布洛芬

B：秋水仙碱

C：别嘌醇

D：碳酸氢钠

答案：C

69.巩固期隔日用药、初治短程化疗方案是

A：2S(E)HR2/4HR

B：2S(E)HR2/4H3R3

C：2HSP(E)/10HP(E)

D：1HS/11H2S2

答案：B

70.流行性出血性结膜炎宜选用

A：双氯芬酸

B：酞丁安

C：益康唑

D：羟苄唑

答案：D

71.可能导致局部缺血性结肠炎（药源性胃肠道疾病）的药物是

A：呋塞米

B：依他尼酸

C：阿洛司琼

D：利血平

答案：C

72.以下药物中，肝病患者应该慎用的是

A：泛酸钙

B：氯丙嗪

C：甘草酸二铵

D：谷氨酸

答案：B

73.某患者，男，64岁，身高174cm，体重92kg，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊。临床处方：阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A：特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液

B：特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片

C：特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他汀片

D: 特拉唑嗪片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片

答案：A

74.某女性，64岁，既往高血压病病史15年，活动后心悸、气短3年，2小时前无明显诱因突发喘憋。体检:端坐体位，BP190/110mmHg，R30次/分，HR108次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 心房颤动?

B: 窦性心动过缓?

C: 室性期前收缩?

D: 阵发性室上性心动过速?

答案：A

75.（2017年真题）患者，男52岁，身高168cm，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖7.8mmol/L（正常值:3.9～6.1mmol/L）,餐后血糖148mmo/L（正常值:＜7.8mmol/L），血尿酸580μmol/L（正常值:男性180～440μmol/L）,LDL-c3.7mmo/L（正常值:2.1~3.1mmo/L）肌酐清除率100ml/min。颈动脉彩超提示:动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症.

A: 格列齐特

B: 甘精胰岛素

C: 二甲双胍

D: 阿卡波糖

答案：D

76.下列复方制剂中，不具有联合增效意义的是

A: 左旋多巴一苄丝肼

B: 头孢哌酮一舒巴坦

C: 口服左氧氟沙星和硫酸亚铁

D: 磺胺甲噁唑一甲氧苄啶

答案：C

77.起效快，可迅速缓解急性哮喘发作和支气管平滑肌痉挛的药品是

A: 布地奈德

B: 羧甲司坦

C: 扎鲁司特

D: 沙丁胺醇

答案：D

78.（2015年真题）患者，男，70岁，右手抖动和行走缓慢3个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病。既往前列腺肥大史3年，临床上对该患者不宜选用（）。

A: 司来吉兰

B: 苯海索

C: 左旋多巴

D: 多巴丝肼

答案：B

79.“尽量为患者选择给药方便的药物和剂型”体现选择治疗药物的

A: 经济性

B: 安全性

C: 有效性

D: 方便性

答案：D

80.对强心苷类中毒引起的快速型心律失常疗效最佳的药物是

A: 普萘洛尔
B: 苯妥英钠
C: 普鲁卡因胺
D: 阿托品
答案：B

81.会使运动员情绪高涨、斗志昂扬，还能产生欣快感，能忍受竞技造成的伤痛，并提高攻击力的药物是
A: 阿米替林
B: 利血平
C: 异戊巴比妥
D: 可卡因
答案：D

82.融合抑制剂（）
A: NNRTIs
B: PIs
C: FIs
D: NRTIs
答案：C

83.化学刺激引起消化道黏膜损伤造成的腹泻宜选用的药物是
A: 双歧三联活菌制剂
B: 胰酶
C: 双八面体蒙脱石散
D: 山莨菪碱
答案：C

84.患者，男，56岁，慢性乙型肝炎患者，ALT120U/L。下列药物中可以使用的是

A：氟康唑

B：异烟肼

C：利福平

D：水飞蓟素

答案：D

85.下列关于肾功能不全患者给药方案调整的方法，错误的是

A：肾功能不全者首选经肝胆代谢和排泄的药物

B：肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以延长给药间隔或减少给药剂量

C：肾功能不全而肝功能正常者，可选用经双通道（肝、肾）消除的药物

D：肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以同时服用碳酸氢钠以碱化尿液，促进药物排泄。防止药源性疾病

答案：D

86.对多数药品而言，贮藏环境与药品保管的关系是

A：在0℃以下时，温度越低，对保管越有利

B：在10℃以上时，温度越低，对保管越有利

C：在2℃以上时，温度越低，对保管越有利

D：在8℃以上时，温度越低，对保管越有利

答案：C

87.抗高血压药物中，保钾利尿药的主要不良反应为()。

A：房屋传导阻滞，心功能抑制

B: 血钾增高

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/206114101101011030