

2024 甘肃省宁县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题大全附参考答案（培优 B 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于抗雄激素类，首选用于晚期前列腺癌的药物是

- A: 乙烯雌酚
- B: 氟他胺
- C: 他莫昔芬
- D: 甲羟孕酮

答案：B

2. 治疗肝胆疾病比较好的是

- A: 土霉素
- B: 青霉素
- C: 氯霉素
- D: 红霉素

答案：D

3. 两性霉素 B 与 () 合用具有协同作用。

- A: 利福平
- B: 氟胞嘧啶
- C: 酮康唑
- D: 伊曲康唑

答案：B

4. 属于抗雌激素类的抗肿瘤药是

- A: 他莫昔芬
- B: 阿那曲唑
- C: 炔雌醇
- D: 氟他胺

答案：A

5. 下列抗心律失常药中，属于 β 受体阻断剂的代表药是()。

- A: 溴苄胺
- B: 胺碘酮
- C: 普萘洛尔
- D: 索他洛尔

答案：C

6. 甲地孕酮与利福平合用()

- A: 子宫内膜突破性出血
- B: 代谢加速而导致意外怀孕
- C: 代谢加快而失效
- D: 抑制排酸作用

答案：A

7. (2021 年真题) 关于钠-葡萄糖协同转运蛋白-2 (SLG-2) 抑制剂达格列净作用特点和不良反应的说法，错误的是()

- A: 降糖效果受肾小球滤过的葡萄糖负荷的影响
- B: 重度肾功能不全患者禁用
- C: 降糖作用不依赖于胰岛 B 细胞的功能及机体对胰岛素的敏感性
- D: 适用于 1 型糖尿病或糖尿病酮症酸中毒

答案：D

8. (2016 年真题) 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的药品是

- A: 依那普利
- B: 坦洛新 (坦索罗辛)
- C: 哌唑嗪
- D: 替米沙坦

答案: D

9. (2015 年真题) 不属于抗乙型肝炎病毒的药品是 ()。

- A: 泛昔洛韦
- B: 拉米夫定
- C: 干扰素
- D: 恩替卡韦

答案: A

10. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡(A1 期)伴出血。13C 呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。

医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1U，静脉滴注，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，15 服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 硝苯地平缓释片
- B: 胶体果胶铋胶囊
- C: 克拉霉素
- D: 埃索美拉唑钠

答案：D

11.（2020 年真题）对环氧化酶 2（COX-2）具有高选择性的药物是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 塞来昔布
- C: 阿司匹林
- D: 吲哚美辛

答案：B

12. 四环素类的主要作用靶点是

- A: 细胞内膜 PBP
- B: 核糖体的 30S 亚基
- C: 核糖体的 50S 亚基
- D: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

答案：B

13.（2018 年真题）可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是（ ）

- A: 阿司匹林
- B: 塞来昔布
- C: 双氯芬酸
- D: 对乙酰氨基酚

答案：A

14. 铁剂用于治疗

- A: 小细胞低血红蛋白性贫血
- B: 溶血性贫血
- C: 巨幼细胞贫血

D: 再生障碍性贫血

答案：A

15. (2019 年真题) 患者，女，52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动、严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片，每日 1 次，每次 2mg。

A: 骨质疏松症

B: 血栓性静脉炎

C: 泌尿系统感染

D: 血脂异常

答案：B

16. 镇静催眠药佐匹克隆的禁忌证是 ()

A: 低蛋白血症

B: 癫痫

C: 糖尿病

D: 重症肌无力

答案：D

17. 利福平

A: 禁用于 8 岁以下儿童

B: 禁用于胆道阻塞患者

C: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

D: 禁用于早产儿、新生儿

答案：B

18. 属于叶酸类抗代谢类药物的是 ()

- A: 吉西他滨
- B: 甲氨蝶呤
- C: 长春瑞滨
- D: 巯嘌呤

答案：B

19. 可杀灭疥虫的药物是

- A: 甲苯达唑
- B: 阿苯达唑
- C: 林旦
- D: 维 A 酸

答案：C

20. 为高分子聚合物，通过增加局部渗透压软化大便，对肠道 pH 没有影响的是

- A: 酚酞
- B: 聚乙二醇 4000
- C: 开塞露
- D: 乳果糖

答案：B

21. 可选择性抑制 MAO-B，用于帕金森病对症治疗的药物是

- A: 司来吉兰
- B: 苯海索
- C: 左旋多巴
- D: 恩他卡朋

答案：A

22. 用于治疗妊娠期妇女子痫和先兆子痫的首选药物是

- A: 依那普利
- B: 普萘洛尔
- C: 硫酸镁
- D: 丙戊酸钠

答案：C

23. 以下关于非磺酰脲类促胰岛素分泌药使用的叙述，错误的是

- A: 对磺酰脲类敏感性差或效果不佳者可换此类药物，也可与磺酰脲类联合应用
- B: 瑞格列奈无肾脏功能不全者使用的禁忌，在体内无蓄积，适用于老年和糖尿病肾病者
- C: 可以作为初始治疗，用于不能耐受二甲双胍或磺酰脲类药物或存在使用这些药物的禁忌证患者，尤其是有低血糖风险的慢性肾脏病患者
- D: 常见不良反应是低血糖和体重增加

答案：A

24. 属于嘌呤类抗代谢类药物的是

- A: 吉西他滨
- B: 长春瑞滨
- C: 甲氨蝶呤
- D: 巯嘌呤

答案：D

25. 仅在体内有抗凝血作用的药物是

- A: 肝素
- B: 噻氯匹定
- C: 尿激酶

D: 华法林

答案: D

26. 易引起低血钾的利尿药是

A: 氢氯噻嗪

B: 阿米洛利

C: 山梨醇

D: 氨苯蝶啶

答案: A

27. 刺激胰岛细胞分泌胰岛素的是()

A: 磺酰脲类

B: 二甲双胍

C: A 和 B 均无效

D: 胰岛素

答案: A

28. (2016 年真题) 没有镇静和“宿醉”现象，不属于巴比妥类和苯二氮类的镇静催眠药是

A: 阿普唑仑

B: 佐匹克隆

C: 地西泮

D: 异戊巴比妥

答案: B

29. (2020 年真题) 患者，男，45 岁。初始诊断肾病综合征合并严重肝功能不全者，宜选用的糖皮质激素是

A: 泼尼松

B: 氟替卡松

C: 泼尼松龙

D: 可的松

答案: C

30. 治疗青光眼宜选用

A: 碘苷滴眼液

B: 左氧氟沙星滴眼液

C: 复方托吡卡胺滴眼液

D: 毛果芸香碱滴眼液

答案: D

31. 对地高辛中毒出现异位心律者可静脉注射

A: 氯化钾、葡萄糖注射液

B: 苯妥英钠

C: 阿托品

D: 利尿剂

答案: B

32. 双环醇片作为保护肝细胞药的作用机制是

A: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平

B: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞

C: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

D: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用

答案: A

33. (2017 年真题) 属于抗雌激素的肿瘤药是 ()

- A: 他莫昔芬
- B: 阿那曲唑
- C: 氟他胺
- D: 炔雌醇

答案: A

34. 用于肾病的氨基酸制剂的是

- A: 复方氨基酸注射液 (9AA)
- B: 复方氨基酸注射液 (18AA)
- C: 复方氨基酸注射液 (6AA)
- D: 赖氨酸注射液

答案: A

35. 维生素 A 缺乏时引起

- A: 脚气病
- B: 坏血病
- C: 角膜软化症
- D: 成人佝偻病

答案: C

36. 可用于烧伤及伤后感染的是

- A: 磺胺甲噁唑
- B: 磺胺嘧啶
- C: 磺胺米隆
- D: 柳氮磺吡啶

答案: C

37. 利尿作用极弱，具有降低眼内压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 呋塞米
- C: 螺内酯
- D: 乙酰唑胺

答案：D

38. 滴药过频易致反跳性鼻充血，久用可致药物性鼻炎

- A: 硼酸
- B: 羟甲唑啉
- C: 克罗米通
- D: 过氧化氢

答案：B

39. 可发生双硫仑样反应的是

- A: 甲硝唑+乙醇
- B: 奥硝唑+乙醇
- C: 替硝唑+苯巴比妥
- D: 替硝唑+华法林

答案：A

40. 以下不属于胰岛素的不良反应的是()

- A: 低血糖
- B: 脂肪萎缩与肥厚
- C: 胰岛素抵抗
- D: 高钾血症

答案：D

41. 患者，女，55 岁，2 型糖尿病史 5 年；心律失常病史 2 年长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法，错误的是

- A: 可致甲状腺功能亢进，同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常
- B: 可掩盖低血糖症状（如心悸、手抖），但低血糖的其他症状（如出汗）仍然存在
- C: 可致肺毒性，早期一般表现为咳嗽，但病情发展时可出现发热和呼吸困难，表现为急性肺炎
- D: 可致甲状腺功能减退较为常见发病隐匿

答案：B

42. 以下激素的关系错误的是

- A: 糖皮质激素抑制促皮质素的分泌
- B: 促皮质素促进糖皮质激素的分泌
- C: 糖皮质激素促进促皮质素释放激素的分泌
- D: 促皮质素释放激素促进促皮质素的分泌

答案：C

43. 急性化脓性中耳炎早期最有效的治疗是()

- A: 抗生素加激素全身应用
- B: 抗生素溶液滴耳
- C: 及早足量抗生素应用
- D: 2%酚甘油滴耳

答案：C

44. 作用机制是有丝分裂抑制剂的是

- A: 巯嘌呤

B: 枸橼酸他莫昔芬

C: 紫杉醇

D: 吉非替尼

答案: C

45. 过量会引起严重心脏毒性的药物是()

A: 氨氯地平

B: 哌唑嗪

C: 地高辛

D: 卡托普利

答案: C

46. 用于治疗单纯性甲状腺肿的是

A: None

B: 甲状腺素

C: 大剂量碘制剂

D: 小剂量碘制剂

答案: B

47. 下列哪项不是血管紧张素转换酶抑制药的主要临床应用

A: 心肌梗死

B: 高血压

C: 心律失常

D: 充血性心力衰竭

答案: C

48. 伴有糖尿病肾病的高血压患者应首选的降压药是

A: 氢氯噻嗪

B: 氨氯地平

C: 吲达帕胺

D: 氯沙坦

答案: D

49. (2017 年真题) 属于选择性 5-HT₄ 受体激动剂, 促进乙酰胆碱释放的促胃肠动药是 ()

A: 莫沙必利

B: 甲氧氯普胺

C: 多潘立酮

D: 昂丹司琼

答案: A

50. (2019 年真题) 长期大量使用可致泌尿系统尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石的维生素是 ()

A: 维生素

B: 维生素 B₆

C: 维生素 A

D: 维生素 B₂

答案: A

51. 艾达司珠单抗可用来解救

A: 华法林

B: 达比加群

C: 阿哌沙班

D: 肝素

答案: B

52. 可抑制心肌重构，改善临床左室功能，进一步降低总死亡率、降低心脏猝死率，所有慢性收缩性心力衰竭、心功能 I ~ III 级的患者都必须使用的药物是

- A: 伊伐布雷定
- B: 卡托普利
- C: 美托洛尔
- D: 沙库巴曲缬沙坦

答案：C

53. 口服存在首关效应的药物是

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 溴己新
- C: 羧甲司坦
- D: 氨溴索

答案：A

54. 作用于髓袢升支厚壁段皮质部和远曲小管的利尿剂是

- A: 袢利尿剂
- B: 醛固酮受体阻断剂
- C: 碳酸酐酶抑制剂
- D: 噻嗪类和类噻嗪类利尿剂

答案：D

55. 对服用双炔失碳酯后月经周期延长或闭经者，可加服

- A: 去氧孕烯
- B: 维生素 B6
- C: 炔雌醇
- D: 甲羟孕酮和炔雌醇

答案：D

56. 毛果芸香碱对眼的作用是

- A: 扩瞳、降眼压，调节痉挛
- B: 缩瞳、升眼压，调节痉挛
- C: 扩瞳、升眼压，调节麻痹
- D: 缩瞳、降眼压，调节痉挛

答案：D

57. 用于慢性活动性肝炎的是

- A: 复方氨基酸注射液(3AA)
- B: 复方氨基酸(18AA)
- C: 赖氨酸
- D: 精氨酸

答案：A

58. 需与氨基糖苷类联合应用治疗布鲁菌病和鼠疫的是

- A: 青霉素
- B: 氯霉素
- C: 四环素
- D: 红霉素

答案：C

59. 属于促凝血因子活性药的是

- A: 凝血酶
- B: 卡巴克洛
- C: 酚磺乙胺
- D: 氨苯甲酸

答案：C

60. (2021 年真题) 可用于治疗蛔虫病、蛲虫病、钩虫病和鞭虫病的广谱驱虫药物是 ()

- A: 氯硝柳胺
- B: 乙胺嗪
- C: 甲苯咪唑
- D: 甲硝唑

答案：C

61. 流行性脑脊髓膜炎首选药是

- A: 磺胺米隆
- B: 磺胺嘧啶
- C: 柳氮磺吡啶
- D: 磺胺甲噁唑

答案：B

62. 以下可作为缓解轻、中度急性哮喘症状首选药的是

- A: 沙美特罗
- B: 氨茶碱
- C: 特布他林
- D: 孟鲁司特

答案：C

63. 易发生持续性干咳不良反应的药品是 ()。

- A: 硝酸甘油
- B: 氢氯噻嗪
- C: 福辛普利

D: 硝苯地平

答案：C

64. 不能减小前列腺的体积,也不能降低 PSA 水平但可松弛前列腺平滑肌,缓解膀胱和下尿道急性症状的药物是()

A: 坦索罗辛

B: 西地那非

C: 非那雄胺

D: 他达拉非

答案：A

65. (2018 年真题) 具有强大的抗凝血因子 Xa 功能及微弱的抗凝血酶作用,可用于预防深静脉血栓形成的药物是 ()

A: 华法林

B: 阿加曲班

C: 尿激酶

D: 那屈肝素钙

答案：D

66. 患者,女,26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊,实验室检查游离甲状腺

A: 普萘洛尔

B: 特布他林

C: 利多卡因

D: 碘化钾

答案：A

67. 可特异性拮抗肝素抗凝作用的是

- A: 酚磺乙胺
- B: 鱼精蛋白
- C: 甲萘氢醌
- D: 氨甲环酸

答案：B

68. 连续使用应间隔 4 小时以上()

- A: 赛洛唑啉
- B: 麻黄碱
- C: 羟甲唑啉
- D: 酚甘油滴耳液

答案：C

69. 属于 IB 类钠通道阻滞剂的抗心律失常药是()

- A: 利多卡因
- B: 普鲁卡因胺
- C: 胺碘酮
- D: 维拉帕米

答案：A

70. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药的是()。

- A: 阿瑞吡坦
- B: 托烷司琼
- C: 甲氧氯普胺
- D: 维生素 B

答案：C

71. 司来吉兰用于

- A: 特发性震颤
- B: 慢性脑功能不全
- C: 早期帕金森病
- D: 神经源性尿崩症

答案：C

72. 噻嗪类利尿药可用于治疗肾性尿崩症及加压素无效的垂体性尿崩症，是因为其可以抑制

- A: Na^+-Cl^- -共转运子
- B: 远曲小管近端
- C: 磷酸二酯酶
- D: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ -同向转运子

答案：C

73. 治疗急性阿米巴痢疾和阿米巴肝脓肿应首选

- A: 氯喹
- B: 二氯尼特
- C: 依米丁
- D: 甲硝唑

答案：D

74. 可诱导肝药酶活性的抗结核病药是()

- A: 利福平
- B: 吡嗪酰胺
- C: 对氨基水杨酸
- D: 异烟肼

答案：A

75. (2015 年真题) 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是 ()。

- A: 文拉法辛
- B: 氟西汀
- C: 吗氯贝胺
- D: 阿米替林

答案: B

76. 适应症仅应用于治疗失眠的药物是 ()

- A: 佐匹克隆
- B: 氟西汀
- C: 苯巴比妥
- D: 地西泮

答案: A

77. 抑制真菌中由细胞色素 P450 介导的 14 α -甾醇去甲基化，从而抑制真菌细胞膜主要固醇类——麦角固醇的生物合成，损伤真菌细胞膜并改变其通透性，以致细胞内重要物质摄取受影响或流失而使真菌死亡的是

- A: 伊曲康唑
- B: 万古霉素
- C: 两性霉素
- D: 氟胞嘧啶

答案: A

78. 使用多塞平治疗无效时可换用的抗抑郁药是

- A: 吗氯贝胺
- B: 阿米替林
- C: 氯米帕明

D: 丙米嗪

答案: A

79. (2015 年真题) 属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂的是 ()。

A: 阿司匹林

B: 替罗非班

C: 奥扎格雷

D: 氯吡格雷

答案: D

80. 金刚烷胺和美金刚合用

A: 增加锥体外系不良反应的风险

B: 可增加抗胆碱不良反应的危险

C: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)

D: 增加肾毒性

答案: C

81. 异烟肼联用氢氧化铝使

A: 疗效减弱

B: 吸收减少

C: 月经不规则

D: 肝毒性增加

答案: B

82. 中枢性或肾性尿崩症可选用

A: 氢氯噻嗪

B: 乙酰唑胺

C: 呋塞米

D: 螺内酯

答案：A

83. 属于助消化药的是()

A: 胶体果胶铋

B: 胃蛋白酶

C: 莫沙必利

D: 奥美拉唑

答案：B

84. 患者,女 75 岁,既往有 2 型糖尿病史 18 年,有青霉素过敏史,因车祸导致左下肢开放性骨折,术后发生骨髓炎,给予克林霉素治疗 10 余天,临床应关注的典型不良反应是

A: 急性溶血性贫血

B: 肌肉震颤

C: 抗生素相关性腹泻

D: 红人综合征

答案：C

85. 癫痫部分性发作首选()。

A: 氯巴占

B: 苯妥莫钠

C: 乙琥胺

D: 奥卡西平

答案：D

86. 下列抗肿瘤药物中存在高致吐风险的是

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 顺铂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/206115231054011030>