# 2024年重庆高考数学试题及答案

**本试卷共10页，19小题，满分150分.**

**注意事项：**

**1.答题前，先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置.**

**2.选择题的作答：每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.**

**3.填空题和解答题的作答：用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内.写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.**

**4.考试结束后，请将本试卷和答题卡一并上交.**

**一、单项选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的. 请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上.**

1．已知$z=-1-\mathrm{i}$，则$|z|=$（　　）

A．0　　B．1　　C．$\sqrt{2}$　　D．2

2．已知命题$p$：$\forall x\in\mathbf{R}$，$|x+1|>1$；命题$q$：$\exists x>0$，$x^3=x$，则（　　）

A．$p$和$q$都是真命题　　B．$\neg p$和$q$都是真命题

C．$p$和$\neg q$都是真命题　　D．$\neg p$和$\neg q$都是真命题

3．已知向量$\vec{a},\vec{b}$满足$|\vec{a}|=1,|\vec{a}+2\vec{b}|=2$，且$(\vec{b}-2\vec{a})\perp\vec{b}$，则$|\vec{b}|=$（　　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D．1

4．某农业研究部门在面积相等的100块稻田上种植一种新型水稻，得到各块稻田的亩产量（单位：kg）并部分整理下表

| 亩产量 | [900，950） | [950，1000） | [1000，1050） | [1100，1150） | [1150，1200） |
|---|---|---|---|---|---|
| 频数 | 6 | 12 | 18 | 24 | 10 |

据表中数据，结论中正确的是（　　）

A．100块稻田亩产量的中位数小于1050kg

B．100块稻田中亩产量低于1100kg的稻田所占比例超过80%

C．100 块稻田亩产量的极差介于 200kg 至 300kg 之间

D．100 块稻田亩产量的平均值介于 900kg 至 1000kg 之间

5．已知曲线 $C$：$x^2+y^2=16$（$y>0$），从 $C$ 上任意一点 $P$ 向 $x$ 轴作垂线段 $PP'$，$P'$ 为垂足，则线段 $PP'$ 的中点 $M$ 的轨迹方程为（　　）

A．$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$（$y>0$）　　B．$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$（$y>0$）

C．$\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{4}=1$（$y>0$）　　D．$\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{8}=1$（$y>0$）

6．设函数 $f(x)=a(x+1)^2-1$，$g(x)=\cos x+2ax$，当 $x\in(-1,1)$ 时，曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 恰有一个交点，则 $a=$（　　）

A．$-1$　　B．$\frac{1}{2}$　　C．1　　D．2

7．已知正三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 $\frac{52}{3}$，$AB=6$，$A_1B_1=2$，则 $A_1A$ 与平面 $ABC$ 所成角的正切值为（　　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．1　　C．2　　D．3

8．设函数 $f(x)=(x+a)\ln(x+b)$，若 $f(x)\geq 0$，则 $a^2+b^2$ 的最小值为（　　）

A．$\frac{1}{8}$　　B．$\frac{1}{4}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．1

**二、多项选择题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对得 6 分，选对但不全的得部分分，有选错的得 0 分．**

9．对于函数 $f(x)=\sin 2x$ 和 $g(x)=\sin(2x-\frac{\pi}{4})$，下列正确的有（　　）

A．$f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同零点　　B．$f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同最大值

C．$f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期　　D．$f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴

10．抛物线 $C$：$y^2=4x$ 的准线为 $l$，$P$ 为 $C$ 上的动点，过 $P$ 作 $\odot A:x^2+(y-4)^2=1$ 的一条切线，$Q$ 为切点，过 $P$ 作 $l$ 的垂线，垂足为 $B$，则（　　）

A．$l$ 与 $\odot A$ 相切

B．当 $P$，$A$，$B$ 三点共线时，$|PQ|=\sqrt{15}$

C．当 $|PB|=2$ 时，$PA\perp AB$

D．满足 $|PA|=|PB|$ 的点 $P$ 有且仅有 2 个

11．设函数 $f(x)=2x^3-3ax^2+1$，则（　　）

A．当$a>1$时，$f(x)$有三个零点

B．当$a<0$时，$x=0$是$f(x)$的极大值点

C．存在 $a$，$b$，使得$x=b$为曲线$y=f(x)$的对称轴

D．存在 $a$，使得点$\left(1,f\left(1\right)\right)$为曲线$y=f(x)$的对称中心

**三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.**

12．记$S_n$为等差数列$\{a_n\}$的前 $n$ 项和，若$a_3+a_4=7$，$3a_2+a_5=5$，则$S_{10}=$_____.

13．已知$\alpha$为第一象限角，$\beta$为第三象限角，$\tan\alpha+\tan\beta=4$，$\tan\alpha\tan\beta=\sqrt{2}+1$，则$\sin(\alpha+\beta)=$_____.

14．在如图的 4×4 方格表中选 4 个方格，要求每行和每列均恰有一个方格被选中，则共有_____种选法，在所有符合上述要求的选法中，选中方格中的 4 个数之和的最大值是_____.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | 21 | 31 | 40 |
| 12 | 22 | 33 | 42 |
| 13 | 22 | 33 | 43 |
| 15 | 24 | 34 | 44 |

**四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.**

15．记$\triangle ABC$的内角 $A$，$B$，$C$的对边分别为 $a$，$b$，$c$，已知$\sin A+\sqrt{3}\cos A=2$.

(1)求 $A$.


(2)若$a=2$，$\sqrt{2}b\sin C=c\sin 2B$，求$\triangle ABC$的周长.

16．已知函数$f(x)=\mathrm{e}^x-ax-a^3$.

(1)当$a=1$时，求曲线$y=f(x)$在点$\left(1,f(1)\right)$处的切线方程；

(2)若$f(x)$有极小值，且极小值小于 0，求 $a$ 的取值范围.

17．如图，平面四边形 $ABCD$中，$AB=8$，$CD=3$，$AD=5\sqrt{3}$，$\angle ADC=90^\circ$，$\angle BAD=30^\circ$，点 $E$，$F$满足$\overrightarrow{AE}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，将$\triangle AEF$沿 $EF$对折至$\triangle PEF$，使得$PC=4\sqrt{3}$.




(1)证明：$EF \perp PD$；

(2)求面 $PCD$ 与面 $PBF$ 所成的二面角的正弦值.

18．某投篮比赛分为两个阶段，每个参赛队由两名队员组成，比赛具体规则如下：第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次，若 3 次都未投中，则该队被淘汰，比赛成员为 0 分；若至少投中一次，则该队进入第二阶段，由该队的另一名队员投篮 3 次，每次投中得 5 分，未投中得 0 分. 该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和．某参赛队由甲、乙两名队员组成，设甲每次投中的概率为 $p$，乙每次投中的概率为 $q$，各次投中与否相互独立.

(1)若 $p=0.4$，$q=0.5$，甲参加第一阶段比赛，求甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率.

(2)假设 $0<p<q$，

（i）为使得甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大，应该由谁参加第一阶段比赛？

（ii）为使得甲、乙，所在队的比赛成绩的数学期望最大，应该由谁参加第一阶段比赛？

19．已知双曲线 $C:x^2-y^2=m(m>0)$，点 $P_1(5,4)$ 在 $C$ 上，$k$ 为常数，$0<k<1$．按照如下方式依次构造点 $P_n(n=2,3,...)$，过 $P_{n-1}$ 作斜率为 $k$ 的直线与 $C$ 的左支交于点 $Q_{n-1}$，令 $P_n$ 为 $Q_{n-1}$ 关于 $y$ 轴的对称点，记 $P_n$ 的坐标为 $(x_n,y_n)$.

(1)若 $k=\frac{1}{2}$，求 $x_2,y_2$；

(2)证明：数列 $\{x_n-y_n\}$ 是公比为 $\frac{1+k}{1-k}$ 的等比数列；

(3)设 $S_n$ 为 $\triangle P_nP_{n+1}P_{n+2}$ 的面积，证明：对任意的正整数 $n$，$S_n=S_{n+1}$.

1．C

【分析】由复数模的计算公式直接计算即可.

【详解】若$z=-1-\mathrm{i}$，则$|z|=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2}=\sqrt{2}$.

故选：C.

2．B

【分析】对于两个命题而言，可分别取$x=-1$、$x=1$，再结合命题及其否定的真假性相反即可得解.

【详解】对于$p$而言，取$x=-1$，则有$|x+1|=0<1$，故$p$是假命题，$\neg p$是真命题，

对于$q$而言，取$x=1$，则有$x^3=1^3=1=x$，故$q$是真命题，$\neg q$是假命题，

综上，$\neg p$和$q$都是真命题.

故选：B.

3．B

【分析】由$\left(\vec{b}-2\vec{a}\right)\perp\vec{b}$得$\vec{b}^2=2\vec{a}\cdot\vec{b}$，结合$|\vec{a}|=1,|\vec{a}+2\vec{b}|=2$，得$1+4\vec{a}\cdot\vec{b}+4\vec{b}^2=1+6\vec{b}^2=4$，由此即可得解.

【详解】因为$\left(\vec{b}-2\vec{a}\right)\perp\vec{b}$，所以$\left(\vec{b}-2\vec{a}\right)\cdot\vec{b}=0$，即$\vec{b}^2=2\vec{a}\cdot\vec{b}$，

又因为$|\vec{a}|=1,|\vec{a}+2\vec{b}|=2$，

所以$1+4\vec{a}\cdot\vec{b}+4\vec{b}^2=1+6\vec{b}^2=4$，

从而$|\vec{b}|=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

故选：B.

4．C

【分析】计算出前三段频数即可判断A；计算出低于1100kg的频数，再计算比例即可判断B；根据极差计算方法即可判断C；根据平均值计算公式即可判断D.

【详解】对于 A，根据频数分布表可知，$6+12+18=36<50$，

所以亩产量的中位数不小于 $1050\mathrm{kg}$，故 A 错误；

对于B，亩产量不低于$1100\mathrm{kg}$的频数为$24+10=34$，

所以低于$1100\mathrm{kg}$的稻田占比为$\frac{100-34}{100}=66\%$，故B错误；

对于C，稻田亩产量的极差最大为$1200-900=300$，最小为$1150-950=200$，故C正确；

对于D，由频数分布表可得，亩产量在$[1050,1100)$的频数为$100-(6+12+18+24+10)=30$，

所以平均值为$\frac{1}{100}\times(6\times925+12\times975+18\times1025+30\times1075+24\times1125+10\times1175)=1067$，故D错误.

故选；C.

5．A

【分析】设点$M(x,y)$，由题意，根据中点的坐标表示可得$P(x,2y)$，代入圆的方程即可求解.

【详解】设点$M(x,y)$，则$P(x,y_0),P'(x,0)$，

因为$M$为$PP'$的中点，所以$y_0=2y$，即$P(x,2y)$，

又$P$在圆$x^2+y^2=16(y>0)$上，

所以$x^2+4y^2=16(y>0)$，即$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1(y>0)$，

即点$M$的轨迹方程为$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1(y>0)$.

故选：A

6．D

【分析】解法一：令$F\left(x\right)=ax^2+a-1,G\left(x\right)=\cos x$，分析可知曲线$y=F(x)$与$y=G(x)$恰有一个交点，结合偶函数的对称性可知该交点只能在$y$轴上，即可得$a=2$，并代入检验即可;

解法二：令$h\left(x\right)=f(x)-g\left(x\right),x\in\left(-1,1\right)$，可知$h\left(x\right)$为偶函数，根据偶函数的对称性可知$h\left(x\right)$的零点只能为0，即可得$a=2$，并代入检验即可.

【详解】解法一：令$f(x)=g\left(x\right)$，即$a(x+1)^2-1=\cos x+2ax$，可得$ax^2+a-1=\cos x$，

令$F\left(x\right)=ax^2+a-1,G\left(x\right)=\cos x$，

原题意等价于当$x\in(-1,1)$时，曲线$y=F(x)$与$y=G(x)$恰有一个交点，

注意到$F\left(x\right),G\left(x\right)$均为偶函数，可知该交点只能在$y$轴上，

可得$F\left(0\right)=G\left(0\right)$，即$a-1=1$，解得$a=2$，

若$a=2$，令$F\left(x\right)=G\left(x\right)$，可得$2x^2+1-\cos x=0$

因为$x\in\left(-1,1\right)$，则$2x^2\geq0,1-\cos x\geq0$，当且仅当$x=0$时，等号成立，

可得$2x^2+1-\cos x\geq0$，当且仅当$x=0$时，等号成立，

则方程$2x^2+1-\cos x=0$有且仅有一个实根0，即曲线$y=F(x)$与$y=G(x)$恰有一个交点，

所以$a=2$符合题意；

综上所述：$a=2$.

解法二：令$h\left(x\right)=f(x)-g\left(x\right)=ax^2+a-1-\cos x,x\in\left(-1,1\right)$，

原题意等价于$h\left(x\right)$有且仅有一个零点，

因为$h\left(-x\right)=a\left(-x\right)^2+a-1-\cos\left(-x\right)=ax^2+a-1-\cos x=h\left(x\right)$，

则$h\left(x\right)$为偶函数，

根据偶函数的对称性可知$h\left(x\right)$的零点只能为0，

即$h\left(0\right)=a-2=0$，解得$a=2$，

若$a=2$，则$h\left(x\right)=2x^2+1-\cos x,x\in\left(-1,1\right)$，

又因为$2x^2\geq0,1-\cos x\geq0$当且仅当$x=0$时，等号成立，

可得$h\left(x\right)\geq0$，当且仅当$x=0$时，等号成立，

即$h\left(x\right)$有且仅有一个零点0，所以$a=2$符合题意；

故选：D.

7．B

【分析】解法一：根据台体的体积公式可得三棱台的高$h=\frac{4\sqrt{3}}{3}$，做辅助线，结合正三棱台的结构特征求得$AM=\frac{4\sqrt{3}}{3}$，进而根据线面夹角的定义分析求解；解法二：将正三棱台$ABC-A_1B_1C_1$补成正三棱锥$P-ABC$，$A_1A$与平面$ABC$所成角即为$PA$与平面$ABC$所成角，根据比例关系可得$V_{P-ABC}=18$，进而可求正三棱锥$P-ABC$的高，即可得结果.


【详解】解法一：分别取$BC,B_1C_1$的中点$D,D_1$，则$AD=3\sqrt{3},A_1D_1=\sqrt{3}$，

可知$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times6\times6\times\frac{\sqrt{3}}{2}=9\sqrt{3},S_{\triangle A_1B_1C_1}=\frac{1}{2}\times2\times\sqrt{3}=\sqrt{3}$，

设正三棱台$ABC-A_1B_1C_1$的为$h$，

则$V_{ABC-A_1B_1C_1}=\frac{1}{3}\left(9\sqrt{3}+\sqrt{3}+\sqrt{9\sqrt{3}\times\sqrt{3}}\right)h=\frac{52}{3}$，解得$h=\frac{4\sqrt{3}}{3}$，

如图，分别过$A_1,D_1$作底面垂线，垂足为$M,N$，设$AM=x$，




则 $AA_1=\sqrt{AM^2+A_1M^2}=\sqrt{x^2+\frac{16}{3}}$，$DN=AD-AM-MN=2\sqrt{3}-x$，


可得 $DD_1=\sqrt{DN^2+D_1N^2}=\sqrt{\left(2\sqrt{3}-x\right)^2+\frac{16}{3}}$，

结合等腰梯形 $BCC_1B_1$ 可得 $BB_1^2=\left(\frac{6-2}{2}\right)^2+DD_1^2$，

即 $x^2+\frac{16}{3}=\left(2\sqrt{3}-x\right)^2+\frac{16}{3}+4$，解得 $x=\frac{4\sqrt{3}}{3}$，

所以 $A_1A$ 与平面 $ABC$ 所成角的正切值为 $\tan\angle A_1AD=\frac{A_1M}{AM}=1$；

解法二：将正三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 补成正三棱锥 $P-ABC$，




则 $A_1A$ 与平面 $ABC$ 所成角即为 $PA$ 与平面 $ABC$ 所成角，

因为 $\frac{PA_1}{PA}=\frac{A_1B_1}{AB}=\frac{1}{3}$，则 $\frac{V_{P-A_1B_1C_1}}{V_{P-ABC}}=\frac{1}{27}$，

可知 $V_{ABC-A_1B_1C_1}=\frac{26}{27}V_{P-ABC}=\frac{52}{3}$，则 $V_{P-ABC}=18$，

设正三棱锥 $P-ABC$ 的高为 $d$，则 $V_{P-ABC}=\frac{1}{3}d\times\frac{1}{2}\times6\times6\times\frac{\sqrt{3}}{2}=18$，解得 $d=2\sqrt{3}$，

取底面 $ABC$ 的中心为 $O$，则 $PO\perp$ 底面 $ABC$，且 $AO=2\sqrt{3}$，

所以 $PA$ 与平面 $ABC$ 所成角的正切值 $\tan\angle PAO=\frac{PO}{AO}=1$.

故选：B.

8．C

【分析】解法一：由题意可知：$f(x)$ 的定义域为 $(-b,+\infty)$，分类讨论 $-a$ 与 $-b,1-b$

的大小关系，结合符号分析判断，即可得$b=a+1$，代入可得最值；解法二：根据对数函数的性质分析$\ln(x+b)$的符号，进而可得$x+a$的符号，即可得$b=a+1$，代入可得最值.

【详解】解法一：由题意可知：$f(x)$的定义域为$(-b,+\infty)$，

令$x+a=0$解得$x=-a$；令$\ln(x+b)=0$解得$x=1-b$；

若$-a\le -b$，当$x\in(-b,1-b)$时，可知$x+a>0,\ln(x+b)<0$，

此时$f(x)<0$，不合题意；

若$-b<-a<1-b$，当$x\in(-a,1-b)$时，可知$x+a>0,\ln(x+b)<0$，

此时$f(x)<0$，不合题意；

若$-a=1-b$，当$x\in(-b,1-b)$时，可知$x+a<0,\ln(x+b)<0$，此时$f(x)>0$；

当$x\in[1-b,+\infty)$时，可知$x+a\ge 0,\ln(x+b)\ge 0$，此时$f(x)\ge 0$；

可知若$-a=1-b$，符合题意；

若$-a>1-b$，当$x\in(1-b,-a)$时，可知$x+a<0,\ln(x+b)>0$，

此时$f(x)<0$，不合题意；

综上所述：$-a=1-b$，即$b=a+1$，

则$a^2+b^2=a^2+(a+1)^2=2\left(a+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\ge\frac{1}{2}$，当且仅当$a=-\frac{1}{2},b=\frac{1}{2}$时，等号成立，

所以$a^2+b^2$的最小值为$\frac{1}{2}$；

解法二：由题意可知：$f(x)$的定义域为$(-b,+\infty)$，

令$x+a=0$解得$x=-a$；令$\ln(x+b)=0$解得$x=1-b$；

则当$x\in(-b,1-b)$时，$\ln(x+b)<0$，故$x+a\le 0$，所以$1-b+a\le 0$；

$x\in(1-b,+\infty)$时，$\ln(x+b)>0$，故$x+a\ge 0$，所以$1-b+a\ge 0$；

故$1-b+a=0$，则$a^2+b^2=a^2+(a+1)^2=2\left(a+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\ge\frac{1}{2}$，

当且仅当$a=-\frac{1}{2},b=\frac{1}{2}$时，等号成立，

所以$a^2+b^2$的最小值为$\frac{1}{2}$.

故选：C.

【点睛】关键点点睛：分别求$x+a=0$、$\ln(x+b)=0$的根，以根和函数定义域为临界，比较大小分类讨论，结合符号性分析判断.

9．BC

【分析】根据正弦函数的零点，最值，周期公式，对称轴方程逐一分析每个选项即可.

【详解】A选项，令$f(x)=\sin 2x=0$，解得$x=\frac{k\pi}{2},k\in\mathbf{Z}$，即为$f(x)$零点，

令$g(x)=\sin(2x-\frac{\pi}{4})=0$，解得$x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{8},k\in\mathbf{Z}$，即为$g(x)$零点，

显然$f(x),g(x)$零点不同，A选项错误；

B选项，显然$f(x)_{\max}=g(x)_{\max}=1$，B选项正确；

C选项，根据周期公式，$f(x),g(x)$的周期均为$\frac{2\pi}{2}=\pi$，C选项正确；

D选项，根据正弦函数的性质$f(x)$的对称轴满足$2x=k\pi+\frac{\pi}{2}\Leftrightarrow x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{4},k\in\mathbf{Z}$，

$g(x)$的对称轴满足$2x-\frac{\pi}{4}=k\pi+\frac{\pi}{2}\Leftrightarrow x=\frac{k\pi}{2}+\frac{3\pi}{8},k\in\mathbf{Z}$，

显然$f(x),g(x)$图像的对称轴不同，D选项错误.

故选：BC

10．ABD

【分析】A选项，抛物线准线为$x=-1$，根据圆心到准线的距离来判断；B选项，$P,A,B$三点共线时，先求出$P$的坐标，进而得出切线长；C选项，根据$|PB|=2$先算出$P$的坐标，然后验证$k_{PA}k_{AB}=-1$是否成立；D选项，根据抛物线的定义，$|PB|=|PF|$，于是问题转化成$|PA|=|PF|$的$P$点的存在性问题，此时考察$AF$的中垂线和抛物线的交点个数即可，亦可直接设$P$点坐标进行求解.

【详解】A选项，抛物线$y^2=4x$的准线为$x=-1$，

$\odot A$的圆心$(0,4)$到直线$x=-1$的距离显然是$1$，等于圆的半径，

故准线$l$和$\odot A$相切，A选项正确；

B选项，$P,A,B$三点共线时，即$PA\perp l$，则$P$的纵坐标$y_P=4$，

由$y_P^2=4x_P$，得到$x_P=4$，故$P(4,4)$，

此时切线长$|PQ|=\sqrt{|PA|^2-r^2}=\sqrt{4^2-1^2}=\sqrt{15}$，B选项正确；

C 选项，当$|PB|=2$时，$x_P=1$，此时$y_P^2=4x_P=4$，故$P(1,2)$或$P(1,-2)$，

当$P(1,2)$时，$A(0,4),B(-1,2)$，$k_{PA}=\dfrac{4-2}{0-1}=-2$，$k_{AB}=\dfrac{4-2}{0-(-1)}=2$，

不满足$k_{PA}k_{AB}=-1$；

当$P(1,-2)$时，$A(0,4),B(-1,2)$，$k_{PA}=\dfrac{4-(-2)}{0-1}=-6$，$k_{AB}=\dfrac{4-(-2)}{0-(-1)}=6$，

不满足$k_{PA}k_{AB}=-1$；

于是$PA\perp AB$不成立，C 选项错误；

D 选项，方法一：利用抛物线定义转化

根据抛物线的定义，$|PB|=|PF|$，这里$F(1,0)$，

于是$|PA|=|PB|$时$P$点的存在性问题转化成$|PA|=|PF|$时$P$点的存在性问题，

$A(0,4),F(1,0)$，$AF$中点$\left(\dfrac{1}{2},2\right)$，$AF$中垂线的斜率为$-\dfrac{1}{k_{AF}}=\dfrac{1}{4}$，

于是$AF$的中垂线方程为：$y=\dfrac{2x+15}{8}$，与抛物线$y^2=4x$联立可得$y^2-16y+30=0$，

$\Delta=16^2-4\times30=136>0$，即$AF$的中垂线和抛物线有两个交点，

即存在两个$P$点，使得$|PA|=|PF|$，D 选项正确.

方法二：（设点直接求解）

设$P\left(\dfrac{t^2}{4},t\right)$，由$PB\perp l$可得$B(-1,t)$，又$A(0,4)$，又$|PA|=|PB|$，

根据两点间的距离公式，$\sqrt{\dfrac{t^4}{16}+(t-4)^2}=\dfrac{t^2}{4}+1$，整理得$t^2-16t+30=0$，

$\Delta=16^2-4\times30=136>0$，则关于$t$的方程有两个解，

即存在两个这样的$P$点，D 选项正确.

故选：ABD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/206205223132010143