

2024 年河北省故城县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题王牌题库附答案 (突破训练)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. (2016 年真题) 鼻减充血药所致的典型不良反应是

- A: 心率减慢
- B: 血压升高
- C: 共济失调
- D: 血管舒张

答案: B

2. 铁剂用于治疗

- A: 巨幼红细胞性贫血
- B: 溶血性贫血
- C: 再生障碍性贫血
- D: 小细胞低血红蛋白性贫血

答案: D

3. (2020 年真题) 消化道溃疡和胃肠道出血高风险患者可以选用，但禁用于有心肌梗死病史患者的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 塞来昔布
- D: 吲哚美辛

答案: C

4. 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

- A: 万古霉素
- B: 克拉霉素
- C: 克林霉素
- D: 红霉素

答案：A

5. 影响微管的装配，阻碍纺锤体的形成

- A: 紫杉醇
- B: 长春碱
- C: 他莫昔芬
- D: 羟喜树碱

答案：B

6. 抗血栓形成、保护动脉内皮的调血脂药是

- A: 普伐他汀
- B: 藻酸双酯钠
- C: 氟伐他汀
- D: 阿伐他汀

答案：B

7. (2019 年真题) 患者，女，55 岁，诊断为“甲癣”，宜使用的药物是 ()

- A: 卡泊芬净
- B: 特比萘芬
- C: 氟胞嘧啶
- D: 氟康唑

答案：B

8. 骨髓抑制较严重的是

- A: 卡铂
- B: 亚叶酸钙
- C: 奥沙利铂
- D: 顺铂

答案：A

9. 红霉素不是下列哪些疾病的首选药物

- A: 白喉带菌者
- B: 骨髓炎
- C: 婴幼儿支原体肺炎
- D: 空肠弯曲杆菌肠炎

答案：B

10. 利奈唑胺的主要抗菌作用机制是

- A: 干扰细菌细胞壁的合成
- B: 增加细菌胞浆膜的通透性
- C: 抑制细菌蛋白质合成
- D: 抗叶酸代谢

答案：C

11. 下列药物中,属于抗乙型肝炎病毒的药物是()

- A: 喷昔洛韦
- B: 奥司他韦
- C: 齐多夫定
- D: 阿德福韦酯

答案：D

12. 属于 α 受体激动剂，缓解鼻黏膜充血肿胀的药物是

- A: 麻黄碱
- B: 酮替芬
- C: 过氧化氢
- D: 克罗米通

答案：A

13. 治疗维生素 D 中毒导致的变应性骨炎可选用

- A: 阿法骨化醇
- B: 奥利司他
- C: 鲑降钙素
- D: 阿仑膦酸钠

答案：C

14. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

- A: 骨髓功能抑制
- B: 腰椎间盘突出
- C: 妊娠及哺乳期妇女
- D: 严重心脏病

答案：B

15. 最常见不良反应为干咳，严重不良反应为血管神经性水肿的是

- A: 卡托普利

- B: 地高辛
- C: 哌唑嗪
- D: 氨氯地平

答案：A

16. 噻嗪类利尿药中，属于水溶性的药物是()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 氢氟噻嗪
- C: 苄噻嗪
- D: 氯噻嗪

答案：D

17. 糖皮质激素的适应证，不包括

- A: 系统性红斑狼疮
- B: 风湿性关节炎
- C: 活动性肺结核
- D: 再生障碍性贫血

答案：C

18. 适用于各种类型疟疾的症状控制，尤其是对抗氯喹恶性及凶险型疟疾有较好疗效的药物是

- A: 蒿甲醚
- B: 双氢青蒿素
- C: 奎宁
- D: 乙胺嘧啶

答案：B

19. 用于治疗疥疮的药物有()

- A: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比泰芬软膏
- B: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏
- C: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏
- D: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏

答案：B

20. 患者。男，42 岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

- A: 预期性恶心呕吐
- B: 延迟性恶心呕吐
- C: 爆发性恶心呕吐
- D: 急性恶心呕吐

答案：D

21. 下列对孕激素作用的描述，哪一项是不正确的()

- A: 促进乳腺腺泡发育，为哺乳做准备
- B: 促进女性性器官的发育成熟
- C: 抑制子宫平滑肌的收缩
- D: 大剂量抑制卵巢排卵

答案：B

22. 用于黑热病病因治疗的药物是

- A: 氯硝柳胺
- B: 三苯双脒
- C: 伯氨喹
- D: 葡萄糖酸锑钠

答案：D

23. (2017 年真题) 药师在急诊药房值班时, 接听病房咨询电话, 得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者, 出现高热、肺纹加重, 患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 阿米卡星
- B: 替考拉宁
- C: 头孢哌酮
- D: 头孢曲松

答案: B

24. (2018 年真题) 肝素过量所致出血的解救药物是 ()

- A: 维生素 K
- B: 鱼精蛋白
- C: 酚磺乙胺
- D: 蛇毒血凝酶

答案: B

25. 主要抑制排卵的短效口服避孕药

- A: 雌三醇
- B: 雌二醇
- C: 炔诺酮
- D: 复方炔诺酮片

答案: D

26. 单独应用时止吐作用相对较弱, 主要作为辅助药物, 用于减轻地塞米松所致焦虑和甲氧氯普胺所致静坐不能, 也可用于减少预期性的化疗所致恶心呕吐的是

- A: 氯丙嗪
- B: 甲氧氯普胺

C: 劳拉西泮

D: 帕洛诺司琼

答案: C

27. 关于 HMG-CoA 还原酶抑制剂的描述，错误的是

A: 促进血小板聚集和减低纤溶活性

B: 具有良好的调血脂作用

C: 降低 LDL-C 的作用最强

D: 主要用于高脂蛋白血症

答案: A

28. 通过与敏感真菌细胞膜上的甾醇（主要为麦角固醇）相结合，引起细胞膜的通透性改变，导致细胞内重要物质如钾离子、核苷酸和氨基酸等外漏，从而破坏细胞的正常代谢抑制其生长的是

A: 伊曲康唑

B: 氟胞嘧啶

C: 万古霉素

D: 两性霉素

答案: D

29. 属于短效口服避孕药的是

A: 左炔诺孕酮

B: 米非司酮

C: 壬苯醇醚

D: 氯地孕酮

答案: A

30. 透到异常细胞的药量比正常细胞多的药物

- A: 异维 A 酸
- B: 维 A 酸
- C: 壬二酸
- D: 阿达帕林

答案：C

31. 对抗香豆素过量引起的出血可选用()

- A: 垂体后叶素
- B: 维生素 K
- C: 鱼精蛋白
- D: 维生素

答案：B

32. 下列哪种维生素可用于慢性铁中毒的治疗

- A: 维生素 E
- B: 维生素 B
- C: 维生素 B
- D: 维生素 C

答案：D

33. 治疗可能引起结晶尿的药物是()

- A: 左氧氟沙星
- B: 呋喃妥因
- C: 磺胺嘧啶
- D: 氯霉素

答案：C

34. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A: 泼尼松
- B: 吉西他滨
- C: 顺铂
- D: 奥沙利铂

答案：C

35. 对环氧化酶 2 (COX-2) 具有高选择性的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 塞来昔布
- C: 吲哚美辛
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

36. 不宜口服给药的是

- A: 硝酸甘油
- B: 硝苯地平
- C: 胍乙啶
- D: 普萘洛尔

答案：A

37. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是()

- A: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇
- B: 定期检测电解质、肾功能，同时观察 24 小时尿量及尿颜色
- C: 肾功能不全者可以使用
- D: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂

答案：C

38. 利尿作用极弱，具有降低眼压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 乙酰唑胺
- C: 呋塞米
- D: 螺内酯

答案：B

39. 格列本脲的降糖作用机制是

- A: 静脉用胰岛素
- B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- C: 二甲双胍
- D: 胰岛素皮下注射

答案：B

40. 对 G

- A: 第四代头孢菌素
- B: 第三代头孢菌素
- C: 第二代头孢菌素
- D: 第一代头孢菌素

答案：D

41. 属于芳香氨酶抑制剂的抗肿瘤药是

- A: 丙酸睾酮
- B: 他莫昔芬
- C: 炔雌醇
- D: 阿那曲唑

答案：D

42. 可用于 1 岁以下婴幼儿急、慢性腹泻，具有固定和清除多种病原体和毒素药物是()

- A: 蒙脱石
- B: 地芬诺酯
- C: 洛哌丁胺
- D: 番泻叶

答案：A

43. 影响血脂和血糖的药物是

- A: 螺内酯
- B: 呋塞米
- C: 乙酰唑胺
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

44. (2018 年真题) 不易发生“双硫仑样”反应的药物是()

- A: 头孢他啶
- B: 头孢哌酮
- C: 头孢曲松
- D: 头孢替安

答案：A

45. 在体外无抗凝作用，在体内有抗凝作用的是

- A: 肝素
- B: 尿激酶
- C: 华法林
- D: 噻氯匹定

答案：C

46. 与鲑降钙素合用，有可能急速降血钙，出现严重低钙血症的是

- A: 维生素 D
- B: 铁剂
- C: 双膦酸盐类骨吸收抑制剂
- D: 钙剂

答案：C

47. 局麻药吸收过量所引起的症状，错误的是

- A: 心缩力增强
- B: 先兴奋，后抑制
- C: 心律失常
- D: 血压下降

答案：A

48. （2020 年真题）患者，男，65 岁。高血压病史 8 年，血压峰值 180/110mmHg，冠心病史 5 年，双侧肾动脉狭窄，不宜选用的抗高血压药是

- A: 普萘洛尔
- B: 氨氯地平
- C: 赖诺普利
- D: 呋达帕胺

答案：C

49. 索他洛尔最严重的不良反应是

- A: 心动过缓
- B: 头晕
- C: 尖端扭转型室速

D: 呼吸困难

答案：C

50. 属于破坏 DNA 的铂类化合物的抗肿瘤药物是

A: 来曲唑

B: 顺铂

C: 依托泊苷

D: 紫杉醇

答案：B

51. 寻常痤疮、鱼鳞病及银屑病可选用()

A: 阿达帕林

B: 林旦霜

C: 酮康唑

D: 维 A 酸

答案：D

52. 可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

A: 氯丙嗪

B: 他莫昔芬

C: 维生素 C

D: 红霉素

答案：B

53. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的调节血脂药是()

A: 辛伐他汀

B: 非诺贝特

C: 烟酸

D: 依折麦布

答案: A

54. 下列哪种疼痛不用吗啡治疗

A: 神经压迫性疼痛

B: 癌性剧痛

C: 胆绞痛及肾绞痛

D: 急性锐痛

答案: A

55. 对伴有同型半胱氨酸升高的高血压患者在降压的同时应注意补充

A: 维生素 C+维生素

B: 叶酸+维生素 B12

C: 维生素 B2+维生素 C

D: 维生素 K+维生素 B

答案: B

56. 米索前列醇可以

A: 竞争性的拮抗组胺与胃壁细胞上的 H 受体结合，抑制基础胃酸分泌及由组胺和食物刺激后引起的胃酸分泌

B: 与前列腺素 E 受体结合，降低胃壁细胞的胃酸分泌

C: 抑制 H⁺，K⁺-ATP 酶活性，使壁细胞内的 H⁺不能转运到胃腔中，阻断了胃酸分泌的最后步骤

D: 在胃内直接中和胃酸

答案: B

57. 大剂量使用维生素 K

A: 维生素

B: 双香豆素

C: 肝素

D: 氨甲苯酸

答案：C

58. 具有抗炎作用,可用于各型肝炎治疗的药物是()

A: 双环醇

B: 门冬氨酸钾镁

C: 异甘草酸镁

D: 多烯磷脂酰胆

答案：C

59. 下述利尿药中,可导致血钾升高的是

A: 呋塞米

B: 氢氯噻嗪

C: 乙酰唑胺

D: 氨苯蝶啶

答案：D

60. 糖皮质激素对血液系统的影响不包括

A: 减少淋巴细胞

B: 使血小板数量下降

C: 提高纤维蛋白原浓度

D: 使红细胞含量增加

答案：B

61. 多柔比星的异构体,适应证同多柔比星,疗效相等或略高,但对心脏毒性及脱发都明显低于多柔比星的药物是

- A: 吡柔比星
- B: 多柔比星
- C: 柔红霉素
- D: 表柔比星

答案：D

62. 用于充血性心力衰竭，肝硬化，抗利尿激素分泌过多证，为急、慢性肾衰竭（肌酐清除率 $<30\text{ml/min}$ ）时首选的药物是

- A: 螺内酯
- B: 阿米洛利
- C: 呋塞米
- D: 乙酰唑胺

答案：C

63. 患者女，55 岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

- A: 4 天
- B: 1 周
- C: 3 天
- D: 3 周

答案：C

64. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

- A: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成
- B: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，升高尿酸量

C: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状

D: 碱化尿液，促进尿酸排泄

答案：C

65. 在体外无抗凝作用，在体内有抗凝血作用的是

A: 肝素

B: 噻氯匹定

C: 华法林

D: 尿激酶

答案：C

66. (2015 年真题) 长期使用可使血钾水平升高的药品是 ()。

A: 乙酰唑胺

B: 呋达帕胺

C: 呋塞米

D: 氨苯蝶啶

答案：D

67. 可用于缓解绝经后更年期症状的药品是 ()。

A: 戊酸雌二醇

B: 他莫昔芬

C: 地屈孕酮

D: 依普黄酮

答案：A

68. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是

A: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂

B: 定期检测电解质、肾功能，同时观察 24h 尿量及尿颜色

C: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇

D: 肾功能不全者可以使用

答案: D

69. 抗菌谱极窄，仅对细胞外的结核分枝杆菌有抑制作用的是

A: 红霉素

B: 氨基曲南

C: 对氨基水杨酸

D: 克拉霉素

答案: C

70. 可降低外周血管阻力, 还可减轻前列腺增生症状的药物是()

A: 格列吡嗪

B: 哌唑嗪

C: 利血平

D: 坎地沙坦

答案: B

71. 对抗杆菌属等厌氧菌具有抗菌活性，属于头霉素类的抗菌药物是()

。

A: 头孢吡肟

B: 氨基曲南

C: 头孢美唑

D: 亚胺培南

答案: C

72. 以下哪种心律失常禁用强心苷

A: 心房颤动

- B: 室性心动过速
- C: 心房扑动
- D: 室上性心动过速

答案：B

73. (2015 年真题) 不易导致便秘或腹泻不良反应的抗酸药是 ()。

- A: 三硅酸镁
- B: 碳酸钙
- C: 铝碳酸镁
- D: 氢氧化铝

答案：C

74. 弥散性血管内凝血症的晚期可选用

- A: 尿激酶
- B: 氨甲环酸
- C: 低分子肝素
- D: 维生素 K

答案：B

75. 长期大量应用双嘧达莫治疗缺血性心脏病时, 可能导致患者缺血加重, 甚至病情恶化可能的原因是 ()

- A: 冠状动脉窃血
- B: 治疗反应变异
- C: 抗血小板药物继发失效
- D: 双嘧达莫抵抗

答案：A

76. 眼底检查时的快速短效扩瞳药

- A: 去甲肾上腺素
- B: 多巴胺
- C: 去氧肾上腺素
- D: 异丙肾上腺素

答案：C

77. 患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素

- A: 慢性胃炎
- B: 心肝肾功能严重障碍者
- C: 妊娠期妇女
- D: 骨髓功能抑制者

答案：A

78. 慢性充血性心力衰竭宜

- A: 快速洋地黄化
- B: 不宜使用洋地黄
- C: 停用洋地黄
- D: 常规剂量的洋地黄

答案：D

79. 作用于细菌二氢叶酸还原酶而发挥作用的抗菌药物是

- A: 利奈唑胺
- B: 磺胺甲唑
- C: 呋喃妥因
- D: 甲氧苄啶

答案：D

80. 青霉素治疗何种疾病时可引起吉海反应

- A: 回归热
- B: 破伤风
- C: 梅毒和钩端螺旋体病
- D: 大叶性肺炎

答案：C

81. 常在用药 1 周后出现刺激性干咳的是

- A: 氨氯地平
- B: 地高辛
- C: 哌唑嗪
- D: 卡托普利

答案：D

82. 与核糖体 30S 亚基结合，阻止氨基酰 tR-NA 进入 A 位的抗菌药是

- A: 万古霉素
- B: 四环素
- C: 氯霉素
- D: 青霉素

答案：B

83. 目前治疗开角型青光眼的一线用药是

- A: 前列腺素类药物
- B: 拟胆碱能药
- C: 拟肾上腺素能药
- D: 碳酸酐酶抑制剂

答案：A

84. (2021 年真题) 属于 5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂的抗抑郁药物是 ()

- A: 吗氯贝胺
- B: 文拉法辛
- C: 艾司西酞普兰
- D: 马普替林

答案: B

85. 属于嘌呤类抗代谢类药物的是 ()

- A: 巯嘌呤
- B: 吉西他滨
- C: 长春瑞滨
- D: 甲氨蝶呤

答案: A

86. 卵巢功能不全可选用 ()

- A: 西地那非
- B: 米非司酮
- C: 雌二醇
- D: 炔诺酮

答案: C

87. 西咪替丁治疗消化性溃疡病的机制是 ()

- A: 抗幽门螺杆菌
- B: 阻断 CTZ 的 D
- C: 阻断 H
- D: 抑制胃壁细胞的 H

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/207005042052010024>