

2024 年河北省复兴区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题大全含答案（达标题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可与甲巯咪唑发生药物相互作用的是

- A: 头孢类抗生素
- B: 阿司匹林
- C: 抗凝药
- D: 噻嗪类利尿剂

答案：C

2. 属于广谱抗病毒药物的是

- A: 奥司他韦
- B: 干扰素
- C: 阿糖腺苷
- D: 阿昔洛韦

答案：B

3. 与长春新碱合用可产生严重的周围神经病

- A: 异烟肼
- B: 非格司亭
- C: 替尼泊苷
- D: 铂类

答案：B

4. 可用于鼻部血管收缩的肾上腺素 α 受体激动药是

- A: 复方薄荷油
- B: 桃金娘油
- C: 西地碘
- D: 羟甲唑啉

答案: D

5. 洋地黄的主要适应症不包括

- A: 阵发性室上性心动过速
- B: 房室传导阻滞
- C: 心房扑动
- D: 急、慢性充血性心力衰竭

答案: B

6. 可用于烧伤及伤后感染的是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 磺胺米隆
- C: 柳氮磺吡啶
- D: 磺胺甲噁唑

答案: B

7. 有减轻体重作用的口服降糖药是

- A: 那格列奈
- B: 吡格列酮
- C: 格列苯脲
- D: 达格列净

答案: D

8. 用于抗结核杆菌的药物是

- A: 新霉素
- B: 庆大霉素
- C: 妥布霉素
- D: 异烟肼

答案：D

9. 与 HIV-1 的逆转录酶直接结合并通过破坏该酶的催化位点来阻断 RNA 依赖和 DNA 依赖的 DNA 聚合酶的活性的是

- A: 非核苷类反转录酶抑制药
- B: 整合酶抑制剂
- C: 核苷类反转录酶抑制药
- D: 蛋白酶抑制药

答案：A

10. 用于颅脑损伤的氨基酸制剂的是

- A: 复方氨基酸注射液（18AA）
- B: 复方氨基酸注射液（9AA）
- C: 赖氨酸注射液
- D: 复方氨基酸注射液（6AA）

答案：C

11. 患者，男，15 岁，因咳嗽、咳痰，发热 3 天入院，确诊为社区获得性肺炎，给予静滴青霉素钠 10 分钟后出现头昏，面色苍白，呼吸困难，血压下降等症状，对该患者首选的抢救药物是（）

- A: 去甲肾上腺素
- B: 地塞米松
- C: 多巴胺

D: 肾上腺素

答案: D

12. (2016 年真题) 散瞳药阿托品滴眼液的禁用人群是

A: 眼底检查者

B: 睫状肌麻痹患者

C: 青光眼患者

D: 虹膜睫状体炎患者

答案: C

13. (2018 年真题) 用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病时能出现寒战、咽痛、心率加快等症状,其原因可能是大量病原体被杀灭后出现的全身性反应,这种反应称为 ()

A: 瑞夷综合征

B: 金鸡纳反应

C: 赫氏反应

D: 青霉素脑病

答案: C

14. (2018 年真题) 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的调节血脂药是 ()

A: 依折麦布

B: 非诺贝特

C: 烟酸

D: 辛伐他汀

答案: D

15. 铁剂的适应证为 ()

- A: 巨幼红细胞性贫血
- B: 恶性贫血
- C: 再生障碍性贫血
- D: 缺铁性贫血

答案：D

16. 属于白三烯受体阻断剂的平喘药是

- A: 布地奈德
- B: 沙美特罗
- C: 孟鲁司特
- D: 多索茶碱

答案：C

17. 有关维生素 K 的描述，错误的是

- A: 维生素 K
- B: 对于应用链激酶所致出血有特效
- C: 天然维生素 K 为脂溶性
- D: 参与凝血因子的合成

答案：B

18. (2019 年真题) 患者，男，52 岁，BMI28kg/m²，既往有动脉粥样硬化性心血管病、高尿酸血症、痛风病，患者诉昨晚 8 点起右大脚趾关节处疼痛难忍，宜使用的药物是 ()

- A: 别嘌醇
- B: 碳酸氢钠
- C: 非布司他
- D: 秋水仙碱

答案：D

19. 下列药物中不属于治疗疥疮的是

- A: 克罗米通
- B: 林旦霜
- C: 硫黄软膏
- D: 过氧苯甲酰

答案：D

20. 对脑 CT 无明显的低密度改变、意识清楚的急性缺血性脑卒中患者，在发病 6 小时内采用其静脉溶栓较安全、有效的是()

- A: 链激酶
- B: 叶酸
- C: 重组人促红素
- D: 尿激酶

答案：D

21. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

- A: 左氧氟沙星与茶碱相互作用较小
- B: 依诺沙星可抑制茶碱代谢
- C: 可使用头孢类口服剂型，与氨茶碱无明显药物相互作用
- D: 可使用大环内酯类药物如红霉素

答案：D

22. (2020 年真题) 餐后 1~2 小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

- A: 兰索拉唑
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 铝碳酸镁

D: 米索前列醇

答案: C

23. 禁用于妊娠期高血压疾病者的是

A: 氯化钾

B: 氯化钙

C: 氯化钠

D: 硫酸镁

答案: C

24. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。

A: 埃索美拉唑

B: 胶体果胶铋胶囊

C: 阿莫西林

D: 克拉霉素

答案: B

25. 仅作为吸入给药的平喘药是（）

A: 特布他林

B: 布地奈德

C: 沙丁胺醇

D: 沙美特罗

答案: D

26. （2018 年真题）蒽醌类抗肿瘤药柔红霉素可引起心脏毒性，临床应用的解毒方案是（）

A: 在用柔红霉素同时，使用柔红霉素等量的右雷佐生

- B: 在用柔红霉素后 30min,使用柔红霉素 2 倍量的右雷佐生
C: 在用柔红霉素前 30min,使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生
D: 在用柔红霉素前 30min,使用柔红霉素 2 倍量的氟马西尼

答案：C

27. 治疗醛固酮升高引起的顽固性水肿的药物是

- A: 螺内酯
B: 氨苯蝶啶
C: 阿米洛利
D: 甘露醇

答案：A

28. 留钾利尿药若每日服用 1 次，最宜的服用时间是

- A: 午餐前 1 小时
B: 午餐时
C: 早餐前 1 小时
D: 早餐时

答案：D

29. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

- A: 白三烯受体阻断剂
B: 磷酸二酯酶抑制剂
C: M 受体拮抗剂
D: β_2 受体激动剂

答案：A

30. 患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

- A: 肺纤维化
- B: 出血性膀胱炎
- C: 骨髓抑制
- D: 药物性肝炎

答案：A

31. 患者，女，55 岁，晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院。查体：138/90mmHg，心率 120 次/分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

- A: 老年高血压患者一般首选 β 受体阻断剂
- B: 糖脂代谢异常时首选 β 受体阻断剂
- C: 作为一级预防，降低心肌梗死死亡率
- D: 长期应用者突然停药可发生反跳现象

答案：D

32. 流行性脑脊髓膜炎首选药是

- A: 磺胺米隆
- B: 磺胺嘧啶
- C: 磺胺甲
- D: 柳氮磺吡啶

答案：B

33. 服用叶酸治疗巨幼红细胞贫血，需同时联合使用的药品是()。

- A: 维生素 B
- B: 维生素 B
- C: 依诺肝素
- D: 维生素 B

答案：D

34. 麻黄碱滴鼻剂的适应证是

- A: 药物性鼻炎
- B: 萎缩性鼻炎
- C: 鼻黏膜充血
- D: 过敏性鼻炎

答案：C

35. 维拉帕米的药理作用是

- A: 促进 Ca
- B: 直接抑制 Na
- C: 降低窦房结和房室结的自律性
- D: 增加心肌收缩力

答案：C

36. 患者。男，42 岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

- A: 多巴胺受体阻断剂
- B: 5-HT₃ 受体阻断剂
- C: 神经激肽（NK-1）受体阻断剂
- D: H₂ 受体阻断剂

答案：B

37. 属于III类抗心律失常药

- A: 普萘洛尔
- B: 胺碘酮
- C: 利多卡因
- D: 奎尼丁

答案：B

38. 下列关于氯化钾注射液的描述，正确的是()

- A: 禁止肌肉注射，可以直接静脉注射
- B: 严禁肌肉注射和直接静脉注射，仅可静脉滴注
- C: 可以肌肉注射，也可以直接静脉注射
- D: 可以肌肉注射，禁止直接静脉注射

答案：B

39. 链霉素首选用于()

- A: 钩端螺旋体病
- B: 伤寒、副伤寒
- C: 布鲁菌病
- D: 鼠疫、土拉菌病

答案：D

40. 患者男性，56 岁。有糖尿病史 15 年，近日并发肺炎，呼吸 35 次/分，心率 105 次/分，血压 160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖 500mg/dl，诊断为糖尿病酮症酸中毒。

- A: 舌下含服
- B: 皮下
- C: 口服
- D: 静脉

答案：D

41. 可引起出血性膀胱炎的抗肿瘤药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 氟尿嘧啶

C: 环磷酰胺

D: 多柔比星

答案: C

42. 肝功能减退患者可按原治疗量应用而肾功能减退患者需减量使用的是

A: 青霉素

B: 异烟肼

C: 红霉素

D: 氟胞嘧啶

答案: A

43. 被称为餐时血糖调节剂，无需餐前 0.5h 服用的是

A: 利拉鲁肽

B: 艾塞那肽

C: 瑞格列奈

D: 格列齐特

答案: C

44. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

A: 氢氯噻嗪

B: 乙酰唑胺

C: 氨苯蝶啶

D: 托拉塞米

答案: D

45. 临床用于军团菌病、支原体肺炎、空肠弯曲菌肠炎等首选的治疗药物是

- A: 四环素
- B: 头孢米诺
- C: 阿奇霉素
- D: 红霉素

答案：D

46. 可能引起心悸、心绞痛发作的药物是

- A: 左甲状腺素
- B: 鲨肝醇
- C: 碘及碘化物
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：A

47. 下述药物中用于拮抗肝素过量的是()

- A: 维生素 K
- B: 维生素
- C: 氨甲苯酸
- D: 硫酸鱼精蛋白

答案：D

48. 服用后可能导致口中有氨味、舌、大便变黑，牙齿变色的药物是

- A: 兰索拉唑
- B: 胶体果胶铋
- C: 硫糖铝
- D: 雷尼替丁

答案：B

49. 物质代谢过程中催化"一碳单位"转移反应的辅酶组成成分是

- A: 维生素 A
- B: 维生素 B
- C: 维生素
- D: 叶酸

答案：D

50. 复方左炔诺孕酮片、去氧孕烯炔雌醇片、复方孕二烯酮片均含有的成分是

- A: 去氧孕烯
- B: 炔雌醇
- C: 维生素 B6
- D: 甲羟孕酮和炔雌醇

答案：B

51. 血浆半衰期较长的治疗阴茎勃起功能障碍的 5 型磷酸二酯酶抑制剂的是

- A: 丙酸睾酮
- B: 他达拉非
- C: 甲睾酮
- D: 西地那非

答案：B

52. 呋塞米与抗组胺药合用时

- A: 引起电解质紊乱的概率增加
- B: 耳毒性增加
- C: 低氯性碱中毒机会增加
- D: 利尿作用减弱

答案：B

53. 防止耐药现象的发生，持续用药须有 12h 以上间歇期

- A: 硝酸甘油
- B: 氨氯地平
- C: 依那普利
- D: 哌唑嗪

答案：A

54. 用于成人非瓣性房颤患者的卒中和全身栓塞，治疗深静脉血栓形成，解救药可用艾达司珠单抗的是

- A: 肝素
- B: 达比加群酯
- C: 华法林
- D: 依达肝素

答案：B

55. 克罗米通乳膏用于治疗

- A: 寻常痤疮
- B: 体、股癣
- C: 蛲虫感染
- D: 疥疮

答案：D

56. （2020 年真题）克罗米通乳膏用于治疗

- A: 体、股癣
- B: 寻常痤疮
- C: 蛲虫感染
- D: 疥疮

答案：D

57. 可使呋达帕胺利尿作用增强的是

- A: 胺碘酮
- B: 多巴胺
- C: 拟交感药
- D: 考来烯胺

答案：B

58. 抑制排卵避孕药的较常见不良反应是

- A: 多毛、痤疮
- B: 肾功能损坏
- C: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌
- D: 子宫不规则出血

答案：D

59. 防止急性血栓的首选药物是

- A: 肝素
- B: 维生素 K
- C: 香豆素类
- D: 维生素 B

答案：A

60. 可引起胃内压力增加和便秘的抗酸药是

- A: 莫沙必利
- B: 奥关拉唑
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 碳酸钙

答案：D

61. 硫脲类药物的不良反应不包括()

- A: 粒细胞减少
- B: 发热
- C: 过敏反应
- D: 诱发甲亢

答案：D

62. 可作为全营养支持或部分营养补充的是

- A: 视黄酸
- B: 视黄醇
- C: TPF-D
- D: TP

答案：D

63. (2019 年真题) 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

- A: 沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用
- B: 轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦
- C: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦
- D: 从 ACEI 转换为沙库巴曲缬沙坦时，应停用 ACEI 36 小时后方可转换

答案：A

64. 通过增强 AT-III 的活性发挥抗凝作用的是

- A: 肝素
- B: 香豆素类
- C: 维生素 B12

D: 维生素 K1

答案：A

65. 解热镇痛药的作用机制是

A: 激动中枢阿片受体

B: 抑制尿酸生成

C: 抑制前列腺素合成

D: 激动 M 受体

答案：C

66. 属于外周多巴胺受体阻断剂，直接阻断胃肠道多巴胺 D

A: 莫沙必利

B: 甲氧氯普胺

C: 多潘立酮

D: 昂丹司琼

答案：C

67. 毒性较大，尤其对第Ⅷ对脑神经和肾损害严重的药物是

A: 对氨基水杨酸

B: 卡那霉素

C: 异烟肼

D: 利福平

答案：B

68. 哮喘急性发作首选的治疗药物是

A: 磷酸二酯酶抑制剂

B: 白三烯受体阻断剂

C: 吸入性糖皮质激素

D: 短效 B₂ 受体激动剂

答案: D

69. (2017 年真题) 可能引起持续性干咳的抗高血压药是 ()

A: 卡托普利

B: 阿利克仑(阿利吉仑)

C: 硝普钠

D: 氨氯地平

答案: A

70. 可使后者疗效显著下降的是

A: 红霉素

B: 维生素 C

C: 他莫昔芬

D: 氯丙嗪

答案: B

71. ACTH 的血浆浓度波动大，变化也很快，这是因为它是以脉冲方式从垂体中释放出来，在血液循环中的半衰期是

A: 10~25 分钟

B: 8 小时

C: 4 小时

D: 7~12 分钟

答案: D

72. 不属于升白细胞药物的是

A: 非格司亭

B: 粒细胞集落刺激因子

C: 重组人促红素

D: 肌苷

答案: C

73. 地高辛最适合用于

A: 急、慢性心衰并房颤

B: 急性心力衰竭

C: 肺源性心脏病

D: 心律失常

答案: A

74. 红霉素不是下列哪些疾病的首选药物

A: 白喉带菌者

B: 婴幼儿支原体肺炎

C: 骨髓炎

D: 空肠弯曲杆菌肠炎

答案: C

75. 普通感冒患者,有单纯性咳嗽症状,宜选用的药物是()

A: 对乙酰氨基酚滴剂

B: 茶碱缓释片

C: 氯苯那敏片

D: 右美沙芬片

答案: D

76. 既能抗室性心律失常,又能抗癫痫的药物是()

A: 地高辛

B: 苯妥英钠

C: 胺碘酮

D: 利多卡因

答案: B

77. 可用于骨和关节感染的药物是()

A: 林可霉素

B: 四环素

C: 万古霉素

D: 青霉素

答案: A

78. 碳酸钙的适应证不包括()

A: 骨质疏松

B: 佝偻病

C: 骨发育不全

D: 缓解肿瘤患者的骨转移疼痛

答案: D

79. 患者，男，35 岁。大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是()

A: 庆大霉素

B: 林可霉素

C: 哌拉西林

D: 氯霉素

答案: C

80. 长期使用可能导致血钾升高的降压药物是

A: 贝那普利

B: 美托洛尔

C: 硝普钠

D: 氨氯地平

答案: A

81. 丙磺舒可影响赛洛多辛的代谢，延长赛洛多辛在体内存在时间，这是因为丙磺舒抑制

A: UGT287

B: CYP3A4

C: 血浆蛋白

D: p-糖蛋白

答案: A

82. 用于治疗急、慢性支气管炎及各种刺激引起的刺激性干咳。片剂一次 20~40mg，一日 3 次的药物是

A: 可待因

B: 地塞米松

C: 苯丙哌林

D: 右美沙芬

答案: C

83. 用于甲型和乙型流感治疗的药物是

A: 吡喹酮

B: 拉米夫定

C: 奥司他韦

D: 乙胺嘧啶

答案: C

84. 12 岁以下儿童、有活动性消化性溃疡及中度或严重肝损伤禁用的非甾体抗炎药是

- A: 布洛芬
- B: 双氯芬酸
- C: 塞来昔布
- D: 尼美舒利

答案：D

85. (2017 年真题) 影响疟原虫叶酸代谢过程的抗疟药是 ()

- A: 青蒿素
- B: 乙胺嘧啶
- C: 伯氨喹
- D: 奎宁

答案：B

86. 加重洋地黄中毒的易感因素为

- A: 低镁血症
- B: 伴有房颤的心功能不全
- C: 低钾血症
- D: 甲状腺功能减退症

答案：D

87. 属于 PDE5 抑制剂的禁忌人群的是

- A: 轻度、稳定型心绞痛
- B: 中度的充血性心力衰竭
- C: 2 周前发生过心肌梗死或脑卒中
- D: 高血压未得到控制者

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/207064042052010024>