

2022 年 11 月广西区桂林冶金疗养院公开招聘 9 名工作人员(一)历年参考题库答案解析

题目	单选题	多选题	判断题	问答题	总分
得分					

[\(图片大小可自由调整\)](#)

第 I 卷

一. 单选题(共 100 题)

1. 肺通气的动力来自：

- A. 肺的弹性回缩力
- B. 呼吸肌的舒缩运动
- C. 肺内压的周期性变化
- D. 胸膜腔负压的周期性变化
- E. 胸廓和肺的主动舒缩运动

答案：B

本题解析：
暂无解析

2. 静息电位产生的离子基础是

- A. K+□□□
- B. Na+□□□
- C. Ca2+□□□
- D. Cl-□□□
- E. H+□□

答案：A

本题解析：
暂无解析

3. 右小腿后面浅感觉丧失可能损伤在（ ）

- A. 右腰丛神经的分支
- B. 右半腰髓后索
- C. 右半腰髓后角固有核
- D. 左侧丘脑腹后核
- E. 右侧内囊前脚

答案：D

本题解析：
暂无解析

4. 化生不可能发生于（ ）。

- A. 肾盂黏膜上皮
- B. 结缔组织
- C. 支气管假复层纤毛柱状上皮

D. 神经纤维

答案：D

本题解析：
暂无解析

5. 对心肌细胞，哪一因素不具有抑制效应（ ）

- A. 促 K+外流
- B. 阻滞其 M 受体
- C. 阻滞其肾上腺素 β 受体
- D. 阻滞 Na+通道
- E. 阻滞 Ca2+通道

答案：B

本题解析：
暂无解析

6. 支配咀嚼肌的神经来自

- A. 眼神
- B. 下颌神经
- C. 上颌神经
- D. 面神经
- E. 舌咽神经

答案：B

本题解析：
暂无解析

7. 新入院及术后患者（ ）天内至少每天记录一次病程录。

A. 2 天

B. 3 天

C. 5 天

D. 7 天

E. 8 天

答案：B

本题解析：
暂无解析

8. 《血站执业许可证》有效期为()年。

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4

答案：A

本题解析：
暂无解析

9. 甲状旁腺激素属于()

A. 骨代谢调节剂

B. 骨形成促进药

C. 骨矿化促进药

D. 骨吸收抑制药

E. 雌激素受体激动药

答案：B

本题解析：

暂无解析

10. 早产儿室()

A. ≤ 200 ≤ 5 ≤ 5

B. ≤ 500 ≤ 10 ≤ 10

C. - ≤ 15 ≤ 15

D. ≤ 1000 ≤ 8 ≤ 8

E. ≤ 10 ≤ 5 ≤ 5

答案：A

本题解析：
暂无解析

11. 在肋角前方，肋间血管神经排列顺序自下而上为 ()

A. 肋间动脉-静脉-神经

B. 肋间静脉-神经-动脉

C. 肋间静脉-动脉-神经

D. 肋间动脉-神经-静脉

E. 肋间神经-动脉-静脉

答案：C

本题解析：
暂无解析

12. 股动脉()

A. 为髂总动脉的延续

B. 位于股静脉的外侧

C. 股动脉位置较深, 体表不易摸到搏动

D. 旋股内侧动脉是其最大的分支

E. 以上均对

答案：B

本题解析：
暂无解析

13. 《艾滋病防治条例》正式实施时间：()

A. 2006 年 1 月 18 日

B. 2006 年 1 月 29 日

C. 2006 年 2 月 18 日

D. 2006 年 3 月 1 日

答案：D

本题解析：
暂无解析

14. 1 型糖尿病

A. 产生降钙素

B. 胰岛素绝对分泌不足

C. 胰岛素相对分泌不足

D. 缺碘

E. 基础代谢率亢进

答案：B

本题解析：
暂无解析

15. 《计划生育技术服务管理条例实施细则》的制定依据是()。

- A. 《人口与计划生育法》
- B. 《行政法》
- C. 《宪法》
- D. 《计划生育技术服务管理条例》
- E. 《行政法》和《宪法》

答案：D

本题解析：
暂无解析

16. 女性，30 岁，用链霉素治疗泌尿系感染 3 天，疗效不好，可改用的药物是

- A. 新霉素
- B. 氧氟沙星
- C. 红霉素
- D. 氯霉素
- E. 林可霉素

答案：B

本题解析：
暂无解析

17. 类风湿因子的本质是

- A. 抗自身、IgMFc 段自身抗体
- B. 抗自身关节软骨细胞自身抗体
- C. 抗自身 IgGFc 段自身抗体
- D. 抗自身 IgAFc 段自身抗体
- E. 抗自身滑膜细胞自身抗体

答案：C

本题解析：
暂无解析

18. 进入疟区工作时，可选用病因预防药（ ）。

- A. 奎宁
- B. 氯奎
- C. 青蒿素
- D. 乙胺嘧啶

答案：D

本题解析：
乙胺嘧啶抑制各种疟原虫红外期速发型子孢子的裂体增值，是预防疟疾的首选药。

19. 神经肌肉接头兴奋传递的特点错误的是：

- A. 接头前膜释放的递质是 ACh
- B. 递质释放为量子式释放
- C. 接头后膜的受体是 N1 受体
- D. 单向传递
- E. 兴奋传递是一对一的关系

答案：C

本题解析：
暂无解析

20. 下列哪项不是酚妥拉明的临床用途？（ ）

- A. 外周血管痉挛性疾病

B. 肾上腺嗜铬细胞瘤的诊断

C. 抗休克

D. 急性心肌梗塞

E. 重症肌无力

答案：E

本题解析：
暂无解析

21. 下述药物—适应症—不良反应中哪一组是不正确的

- A. 苯巴比妥—癫痫大发作—嗜睡
- B. 乙琥胺—精神运动性发作—胃肠反应
- C. 对乙酰氨基酚—发烧—肝损害
- D. 左旋多巴—震颤麻痹—精神障碍
- E. 米帕明—抑制症—口干、便秘

答案：B

本题解析：
暂无解析

22. 下列哪支静脉最常置管用作长期输液

- A. 锁骨下静脉
- B. 大隐静脉
- C. 颈外静脉
- D. 头静脉
- E. 股静脉

答案：A

本题解析：
 暂无解析

23. 灭菌法中灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的是()

- A. 环氧乙烷灭菌法
- B. 过氧乙酸浸泡灭菌法
- C. 戊二醛浸泡灭菌法
- D. 辐射灭菌法
- E. 压力蒸汽灭菌法

答案：E

本题解析：
 暂无解析

24. 关于单纯性甲状腺肿，下列的记述哪一项是正确的？

- A. 男性显著多于女性
- B. 年龄越大发病者越多
- C. 甲状腺多呈结节性肿大
- D. 一般不伴有功能亢进或功能低下
- E. 从病变性质来说，可以看成是良性肿瘤

答案：D

本题解析：
 暂无解析

25. 常作为计数胸椎的体表标志是()

- A. 第 6 颈椎棘突
- B. 第 7 颈椎棘突

C. 第 1 颈椎棘突

D. 第 2 颈椎棘突

答案：B

本题解析：
 暂无解析

26. 胃的叙述中那一项是对的()

- A. 分为底，体，颈，管四部
- B. 入口为幽门, 出口为贲门
- C. 大部分在右季肋区
- D. 胃幽门括约肌为平滑肌

答案：D

本题解析：
 暂无解析

27. 下列哪一个酶与丙酮酸生成糖无关？()

- A. 果糖二磷酸酶
- B. 丙酮酸激酶
- C. 丙酮酸羧化酶
- D. 醛缩酶

答案：B

本题解析：
 丙酮酸激酶，催化磷酸烯醇式丙酮酸转变为丙酮酸，磷酸烯醇式丙酮酸的高能磷酸键在催化下转移给 ADP 生成 ATP，自身生成烯醇式丙酮酸后自发转变为丙酮酸。反应不可逆。是糖酵解途径中第二个以底物水平磷酸化方式生成 ATP 的反应。

28. 第三代喹诺酮类药物的抗菌机制是其抑制了细胞的

- A. 蛋白质合成
- B. 细胞壁合成
- C. DNA 螺旋环
- D. 二氢叶酸还原酶
- E. 二氢叶酸合成酶

答案：C

本题解析：
 暂无解析

29. 慢性炎症中常见的是()。

- A. 嗜酸性粒细胞
- B. 淋巴细胞
- C. 嗜中性粒细胞
- D. 肥大细胞

答案：B

本题解析：
 慢性炎症的主要炎症细胞有单核巨噬细胞、淋巴细胞、肥大细胞、嗜酸性粒细胞等。其中单核巨噬细胞系统的激活是慢性炎症的一个重要特征，除此之外是淋巴细胞。

30. 奠定中国医学人道传统的文献是()

- A. 《黄帝内经》
- B. 宋国宾《医业伦理学》
- C. 孙思邈《备急千金要方》
- D. 希波克拉底《希波克拉底誓言》

E. 帕茨瓦尔《医学伦理学》

答案：A

本题解析：
暂无解析

31. 心包摩擦音通常在什么部位听诊最清楚

A. 左锁骨中线第三、四肋间

B. 左侧腋前线第三、四肋间

C. 左腋中线第三、四肋间

D. 胸骨右缘第三、四肋间

E. 胸骨左缘第三、四肋间

答案：E

本题解析：
暂无解析

32. 属于选择性诱导型环加氧酶(COX-2)抑制药是()

A. 阿司匹林

B. 吲哚美辛

C. 布洛芬

D. 对乙酰氨基酚

E. 塞来昔布

答案：E

本题解析：
暂无解析

33. 上涎涎核发出的纤维加入()

A. 面神经

B. 展神经

C. 三叉神经

D. 舌咽神经

答案：A

本题解析：
暂无解析

34. 不是金黄色葡萄球菌引起的疾病是

A. 烫伤样皮肤综合征

B. 假膜性肠炎

C. 食物中毒

D. 毒性休克综合征

E. 大叶性肺炎

答案：E

本题解析：
暂无解析

35. 不含副交感纤维的是()

A. 动眼神经

B. 三叉神经

C. 舌咽神经

D. 迷走神经

答案：B

本题解析：
暂无解析

36. 关于遗传密码的简并性，正确的是()

A. 每一种氨基酸均有两种以上的遗传密码

B. 可导致移码突变

C. 有利于遗传的稳定性

D. 两个密码子可合并成一个密码子

E. 密码子的专一性取决于第 3 位碱基

答案：A

本题解析：
暂无解析

37. 急性肾小球肾炎引起少尿的主要原因是()。

A. 血浆胶体渗透压升高

B. 囊内压升高

C. 滤过膜的通透性降低

D. 肾小球滤过总面积减小

答案：D

本题解析：
急性肾小球肾炎患者的免疫反应造成的肾小球基底膜非特异性炎症性损害，使基底膜增厚，肿胀或断裂，导致肾小球滤过面积减少，滤过率降低，原尿生成减少，出现尿少。

38. 关于肉芽肿的描述，下列正确的是

A. 为局限性单核巨噬细胞增生形成的结节状病灶

B. 肉芽肿内类上皮细胞的吞噬能力最强

C. 由淋巴细胞增生构成的结节状病灶

- D. 发生与机体的体液免疫反应有关
- E. 只在慢性炎症中形成

答案：A

本题解析：
暂无解析

39. 降低血糖的激素是()。

- A. 胰岛素
- B. 糖皮质激素
- C. 胰高血糖素
- D. 盐皮质激素
- E. 甲状腺激素

答案：A

本题解析：
暂无解析

40. 下列哪项不属于传染源？

- A. 患者
- B. 病原携带者
- C. 易感者
- D. 隐性感染者
- E. 受感染的动物

答案：C

本题解析：
传染源是指病原体已在体内生长繁殖并能将其排出体外的人和动物，包括患者、隐性感染者、病原携带者、受感染的动物。易感者体内尚无病原体。

41. 治疗室的管理中，下列哪项是错误的（ ）

- A. 注射治疗时要铺无菌盘，抽出的药液存放不能超过 2 小时
- B. 治疗室中开启的各种溶酶超过 24 个小时不能使用，最好采用小包装
- C. 治疗室中开启的无菌溶液需在 2 小时内使用
- D. 碘酊、乙醇瓶应保持密闭，每周更换并对容器灭菌 1～2 次
- E. 经灭菌后的棉球、纱布包一经打开，使用时间不能超过 48 小时

答案：E

本题解析：
暂无解析

42. 内脏感觉核是()

- A. 迷走神经背核
- B. 上泌涎核
- C. 疑核
- D. 孤束核

答案：D

本题解析：
暂无解析

43. 手掌内侧感觉丧失为下列哪条神经分支损伤（ ）

- A. 桡神经浅支
- B. 全部手掌感觉丧失
- C. 桡神经深支

D. 尺神经手背支

E. 尺神经手掌支

答案：E

本题解析：
暂无解析

44. 糖皮质激素

- A. 促进葡萄糖的利用
- B. 减少红细胞和淋巴细胞的数目
- C. 减少脂肪的分解
- D. 促进肌肉组织蛋白质分解
- E. 降低机体抗伤害刺激的能力

答案：D

本题解析：
暂无解析

45. 下列除哪种情况外，均可由县级以上卫生主管部门给予警告或责令暂停 6 个月以上 1 年以下执业活动，情节严重的，吊销执业证书

- A. 使用未经批准使用的药品、消毒药剂和医疗器械的
- B. 泄露患者隐私、造成严重后果的
- C. 发现患者涉嫌伤害事件或者非正常死亡，不按规定报告的
- D. 隐匿、伪造或者擅自销毁医学文书及有关资料的
- E. 造成二级医疗技术事故的

答案：E

本题解析：
暂无解析

46. 耐药质粒的组成部分是

A. RTF (耐药传递因子) 与 F 因子

B. RTF 与耐药(γ)决定因子

C. γ 决定因子与 gAI 基因

D. γ 决定因子与 Bio 基因

E. γ 决定因子与 F 因子

答案：B

本题解析：
暂无解析

47. 目前引起输血后肝炎的主要肝炎病毒为（ ）

A. 甲型肝炎病毒

B. 乙型肝炎病毒

C. 丙型肝炎病毒

D. 戊型肝炎病毒

E. 庚型肝炎病毒

答案：C

本题解析：
暂无解析

48. 结节性甲状腺肿增生期

A. 砂粒体

B. 淀粉样物质

C. 滤泡高度扩张，内含大量的胶质

D. 滤泡增生，无胶质成分

E. 瘤细胞侵入被膜和血管

答案：D

本题解析：
暂无解析

49. 《医疗事故处理条例》第十四条规定：发生哪种重大医疗过失行为的，医疗机构应当在 12 小时内向所在地卫生行政部门报告（ ）。

A. 导致患者死亡或者可能为二级以上的医疗事故

B. 导致 1 人人身损害后果

C. 导致 2 人人身损害后果

D. 导致 3 人人身损害后果

E. 以上都不是

答案：A

本题解析：
暂无解析

50. 使全部实验动物不发生死亡的最大剂量（ ）

A. 绝对致死剂量(LD_{100})

B. 最低致死剂量(MLD)

C. 半数致死剂量(LD_{50})

D. 最大耐受剂量(LD_0)

E. 致死剂量(LD)

答案：D

本题解析：
暂无解析

51. 胸膜顶高出锁骨（ ）

A. 中点上方 12cm

B. 内侧 1/3 上方 0-10cm

C. 内侧 1/3 上方 2-3cm

D. 外侧 1/3 上方 2-30cm

答案：C

本题解析：
暂无解析

52. 胃大部分切除患者出现贫血，其主要原因是

A. HCl 减少

B. 粘液减少

C. 内因子减少

D. HCO_3^- 减少

E. 胃蛋白酶活性减弱

答案：C

本题解析：
暂无解析

53. 13 岁女性，两年前起病，于生气后突然大叫一声，随之倒地呼之不应，牙关紧闭，双眼上视，头颈后仰，四肢抽搐，无二便失禁，无舌咬伤。发作停止后对整个过程不能回忆，未给予特殊处置，照常上学。2 个月后于夜间入睡后又出现抽搐，有小便失禁。抽搐停止后，突然起床冲出门外，无目的漫游，呼之不应，冲动毁物，持续 2 小时后恢复清醒，对经过全无记忆，此后反复有类似发作，平均每月三次。该患者最可能的诊断是（ ）。

A. 神经症

B. 癔症

C. 急性应激障碍

- D. 癫痫
- E. 脑肿瘤所致精神障碍

答案：D

本题解析：
暂无解析

54. 对放射性碘的叙述，错误的是（ ）

- A. 易致甲状腺功能低下
- B. 20 岁以下患者不宜使用
- C. 适于手术后复发及硫脲类无效者
- D. 用于甲状腺摄碘功能检查
- E. 常用于单纯性甲状腺肿

答案：E

本题解析：
暂无解析

55. 成人甲状腺功能低下，会导致 www.mededu.cn

- A. 呆小症
- B. 巨人症
- C. 侏儒症
- D. 粘液性水肿
- E. 肢端肥大症

答案：D

本题解析：
暂无解析

56. 下列不属于中枢神经系统的是（ ）。

- A. 小脑
- B. 脑神经
- C. 间脑
- D. 脊髓

答案：B

本题解析：
暂无解析

57. 突然出现的吸气困难，常见的病因是

- A. 支气管哮喘
- B. 肺癌
- C. 气道异物或梗阻
- D. 气胸
- E. 肺不张

答案：C

本题解析：
暂无解析

58. 患者，男，56 岁，因肝癌在某三甲医院进行手术治疗，术前医生告知家属患者为癌症晚期，术后效果可能不佳，家属同意手术，手术顺利。术后 3 个月患者死亡，家属认为手术未成功，要求赔偿。上述情况属于：

- A. 医疗纠纷
- B. 医疗过失
- C. 医疗过错
- D. 医疗事故

答案：A

本题解析：
第一步，本题考查生物医学知识。
第二步，医疗纠纷是指基于医疗行为，在医方（医疗机构）与患方（患者或者患者近亲属）之间产生的因对治疗方案与治疗结果有不同的认知而导致的纠纷等。题干中，手术顺利，但家属认为未成功，要求赔偿，属于医疗纠纷。A 项正确。
因此，选择 A 选项。

59. 人耳最敏感的声音频率

- A. 300～1000Hz
- B. 1000～3000Hz
- C. 1000～1300Hz
- D. 100～300Hz
- E. 1300–1500Hz

答案：B

本题解析：
暂无解析

60. 对视紫红质的不正确叙述是

- A. 是视杆细胞的感光色素
- B. 弱光下，分解速度大于合成速度
- C. 维生素 A 参与视紫红质的合成
- D. 强光下大多处于分解状态
- E. 光照时视黄醛分子构型改变

答案：B

本题解析：
暂无解析

61. 直肠（ ）

- A. 骶曲在尾骨尖前方突向前
- B. 直肠横襞于右前壁者最大
- C. 肛梳下缘有齿状线
- D. 肛梳又称肛皮线
- E. 肛门内括约肌主要括约肛门

答案：B

本题解析：
暂无解析

62. 下列不属于医学伦理学原则的是（ ）

- A. 自主
- B. 公正
- C. 不伤害
- D. 克己
- E. 尊重

答案：D

本题解析：
医学伦理学的具体原则包括：①尊重原则；②自主原则；③不伤害原则；④公正原则。

63. 病员患胆管癌，术中术者用手指钝性剥离胆总管而撕破静脉急性大出血，慌乱中用钳夹止血，造成静脉完全离断，虽经吻合，病员终因急性肝功能衰竭而死亡。产生的后果属于

- A. 医疗意外
- B. 医疗差错

C. 病情重笃而发生的难以避免的死亡

D. 医疗事故

E. 手术难以避免的并发症

答案：D

本题解析：
暂无解析

64. 心传导系（ ）

- A. 房室束只分布于左室壁的心肌
- B. 窦房结位于房间隔下部
- C. 房室结位于室间隔上部
- D. 窦房结是心脏自动节律性兴奋的起搏点
- E. 以上都不对

答案：D

本题解析：
暂无解析

65. 心肌不会发生强直收缩的原因是：

- A. 心肌传导速度快
- B. 心肌具有自动节律性
- C. 心肌收缩形式是"全式无"式
- D. 肌浆网不发达 Ca²⁺贮存量少
- E. 心肌细胞在兴奋一次后有效不应期很长

答案：E

本题解析：
暂无解析

66. 下列消毒剂中哪一种为高效消毒剂（ ）

- A. 酚类消毒剂
- B. 碘酒
- C. 酒精
- D. 碘伏
- E. 含氯消毒剂

答案：E

本题解析：
暂无解析

67. 关于蜗管的描述错误的是（ ）

- A. 位于耳蜗内
- B. 内含内淋巴
- C. 借连合管与球囊相连
- D. 螺旋器位于蜗管的前庭壁（前庭膜上）

答案：D

本题解析：
暂无解析

68. 鼓室外侧壁是（ ）

- A. 乳突壁
- B. 颈动脉壁
- C. 迷路壁
- D. 鼓膜壁

答案：D

本题解析：
暂无解析

69. 碳酸锂的下述不良反应中哪项是错的

- A. 恶心、呕吐
- B. 口干、多尿
- C. 肌无力肢体震颤
- D. 胰岛素分泌减少加重糖尿病症状
- E. 过量引起意识障碍，共济失调

答案：D

本题解析：
暂无解析

70. 颞区骨折而发生硬膜外血肿的血管是（ ）

- A. 脑膜前动脉
- B. 脑膜中动脉
- C. 脑膜后动脉
- D. 大脑前动脉
- E. 大脑中动脉

答案：B

本题解析：
暂无解析

71. 库斯莫尔(Kussmaul)呼吸常见的病因是

- A. 自发性气胸

B. 气道异物

C. 一氧化碳中毒

D. 胸腔积液

E. 尿毒症

答案：E

本题解析：
暂无解析

72. 心脏在人体位于 （ ）

- A. 前纵隔
- B. 中纵隔
- C. 后纵隔
- D. 上纵隔

答案：B

本题解析：
暂无解析

73. 在通过坐骨小孔的结构中，由外侧向内侧依次为（ ）

- A. 阴部神经、阴部内动脉、阴部内静脉
- B. 阴部内动脉、阴部神经、阴部内静脉
- C. 闭孔动脉、闭孔静脉、闭孔神经
- D. 阴部内动脉、阴部内静脉、阴部神经
- E. 阴部内静脉、阴部神经、阴部内动脉

答案：D

本题解析：
暂无解析

74. 患者因病不能自行调节体位，属于

- A. 自动体位
- B. 被动体位
- C. 强迫侧卧位
- D. 辗转体位
- E. 角弓反张位

答案：B

本题解析：
暂无解析

75. 有关椎动脉的正确说法是（ ）

- A. 为液动脉的分支
- B. 穿经七个颈椎的横突孔入颅
- C. 在脑桥的基底部, 左右推动脉合成一条基底动脉
- D. 分支营养脑和视器

答案：C

本题解析：
暂无解析

76. 突感胸骨后疼痛伴有胸闷、憋气患者，心电图见 S-T 段各导联均呈水平型下移达 0. 08mV，伴有 T 波倒置，以往心电图正常。最可能的诊断是

- A. 变异型心绞痛
- B. 急性心肌梗死
- C. 典型心绞痛发作
- D. 陈旧性心肌梗死

E. 左心室劳损

答案：C

本题解析：
暂无解析

77. 下列属非竞争性 α 受体阻断药是（ ）

A. 酚妥拉明

B. 妥拉苏林

C. 酚苄明

D. 新斯的明

E. 甲氧明

答案：C

本题解析：
暂无解析

78. 阿司匹林预防血栓生成是由于（ ）

A. 小剂量抑制 PGI 生成

B. 小剂量抑制 TXA 生成

C. 小剂量抑制环氧酶

D. 大剂量抑制 TXA 生成

E. 以上均不是

答案：B

本题解析：
小剂量阿司匹林抑制血小板内血栓烷素 A (TXA) 合成，抑制血栓生成；
大剂量时则抑制血管内前列环素 (PGI) 合成，促进血栓生成。

79. 脑压过高，为预防脑疝最好选用（ ）。

A. 呋塞米

B. 阿米洛利

C. 螺内酯

D. 甘露醇

答案：D

本题解析：
甘露醇利用其高渗脱水作用，促进脑组织内水分回流入血管，使脑组织脱水，因此可降低脑内压，预防脑疝。

80. 合理用药需了解（ ）

A. 以上都需要

B. 药物作用与副作用

C. 药物的 $t_{1/2}$ 与消除途径

D. 药物的效价与效能

E. 药物的毒性与安全范围

答案：A

本题解析：
暂无解析

81. 1 次静脉给药后，约经过几个血浆 $t_{1/2}$ 可自机体排出 95%（ ）

A. 1 个 $t_{1/2}$

B. 消除速度

C. 5 个 $t_{1/2}$

D. 9 个 $t_{1/2}$

E. 吸收与消除达到平衡的时间

答案：C

本题解析：
暂无解析

82. 发生 HIV 职业暴露后，被暴露的粘膜应当如何处理？（ ）

A. 应当尽量减少冲洗次数

B. 应当反复用生理盐水冲洗

C. 应当反复用肥皂水冲洗

D. 应当反复用流动水冲洗

答案：B

本题解析：
暂无解析

83. 下面不属于腹膜外位的器官是（ ）

A. 肾

B. 升结肠

C. 肾上腺

D. 输尿管

E. 十二指肠降部

答案：B

本题解析：
暂无解析

84. 面神经的内脏运动核(付交感神经核)是（ ）

A. 上涎核

- B. 下涎核
- C. 疑核
- D. 面神经运动核

答案：A

本题解析：
暂无解析

85. 按相关规定医院每年应组织几次以上的应急演练（ ）

- A. 1 次
- B. 2 次
- C. 3 次
- D. 4 次
- E. 不限

答案：A

本题解析：
暂无解析

86. 支配咀嚼肌的神经是（ ）

- A. 动眼神经
- B. 三叉神经
- C. 面神经
- D. 舌下神经

答案：B

本题解析：
暂无解析

87. 我国人民膳食中蛋白质的主要来源是()

- A. 粮谷类
- B. 豆类及其制品
- C. 水果、蔬菜类
- D. 排骨
- E. 蛋类

答案：A

本题解析：
暂无解析

88. 中性粒细胞明显增多见于

- A. 百日咳
- B. 糖尿病酮症酸中毒
- C. 自身免疫性疾病
- D. 脾功能亢进
- E. 伤寒

答案：B

本题解析：
暂无解析

89. 既曲髋又屈膝的肌肉是（ ）

- A. 股四头肌
- B. 缝匠肌
- C. 股薄肌
- D. 肱二头肌
- E. 股二头肌

答案：B

本题解析：
暂无解析

90. 第 6 颈椎前结节的前弓有（ ）

- A. 颈总动脉
- B. 椎动脉
- C. 颈外动脉
- D. 颈内静脉
- E. 副神经

答案：A

本题解析：
暂无解析

91. 用木瓜蛋白酶将 IgG 分子水解为（ ）

- A. 2 个 Fab 片段和 Fc 段
- B. $(Fab')_2$ 和数个小片段 Fc'
- C. 2 个 Fab 片段和数个小片段 Fc'
- D. $(Fab')_2$ 和 Fc 段
- E. 以上均不对

答案：A

本题解析：
暂无解析

92. 女性患者王某，55 岁，因患乙状结肠癌进行肿瘤切除术、结肠造瘘术。术中顺利，在关腹前，输 A 型血约 50ml，患者突然出现寒颤，伤口渗血，导尿为全程血尿，当即认定系输血引起的溶血反应，立即停止输血、进行抢救；同时复查，患者系 O 型血，即改输 O 型血 400ml。由于发现及时，抢救得当，病员转危为安。经调查发现血库工作人员甲将血样试管搞错，导致定错血型，发生溶血反应。甲的行为违反了《临床输血技术规范》的

- A. 输血申请规定
- B. 受血者血样采集和送检规定
- C. 交叉配血规定
- D. 发血规定
- E. 输血规定

答案：C

本题解析：
暂无解析

93. 能使冠状动脉血流量增多的因素是

- A. 主动脉舒张压降低
- B. 外周阻力减小
- C. 心室舒张期延长
- D. 心室收缩期延长
- E. 心率增加

答案：C

本题解析：
暂无解析

94. 左心室入口的瓣膜是()。

- A. 二尖瓣
- B. 三尖瓣

- C. 主动脉瓣
- D. 肺动脉瓣

答案：A

本题解析：
左二右三

95. A 群链球菌产生()。

- A. 内毒素
- B. 红疹毒素
- C. 神经毒素
- D. 细胞毒素

答案：B

本题解析：
A 族链球菌产生的红疹毒素能致猩红热，临床特征为发热、咽峡炎、全身弥漫性皮疹和疹退后的明显脱屑。

96. 发挥自己的潜能，实现自己的理想与抱负的需要是()

- A. 自我实现的需要
- B. 尊重的需要
- C. 爱与被爱的需要
- D. 生理需要
- E. 安全需要

答案：A

本题解析：
暂无解析

97. 血浆的粘滞性主要决定于：

- A. 红细胞数量
- B. 白细胞数量
- C. 血小板的数量
- D. 血浆蛋白含量
- E. 血浆 NaCl 含量

答案：D

本题解析：
暂无解析

98. 注册的有效期为？

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年

答案：B

本题解析：
暂无解析

99. 溃疡性结肠炎治疗首选药物是()。

- A. 甲硝唑
- B. 阿莫西林
- C. 强的松
- D. 柳氮磺胺吡啶

答案：D

本题解析：
 柳氮磺胺吡啶属于氨基水杨酸制剂,是治疗溃疡性结肠炎的常用药物,该药口服后大部分到达结肠,经肠菌分解为5-氨基水杨酸和磺胺吡啶,前者为主要有效成分,与肠上皮接触而发挥抗炎作用。

100. 强心苷中毒时,下列哪种症状在给钾盐后并不缓解,反而加重()

- A. 二联律
- B. 房性传导阻滞
- C. 室性心动过速
- D. 室性早搏
- E. 房性心动过速

答案：B

本题解析：
 暂无解析

二. 多选题 (共 10 题)

1. 以下说法正确的是()。

- A. 国家对医疗器械实行分类管理
- B. 国家对医疗器械实施再评价及淘汰制度
- C. 国家对医疗器械实行产品生产注册制度
- D. 生产医疗器械，应当符合医疗器械国家标准。
- E. 国家对医疗器械实行分级管理

答案：A、B、C、D

本题解析：
 暂无解析

2. 下列关于突发公共卫生事件的描述正确的是？()

- A. 突然发生
- B. 造成或者可能造成严重损害
- C. 事件包括重大传染病疫情,群体性不明原因疾病,重大食物中毒,重大职业中毒和其他严重影响公众健康的事件
- D. 冠心病经常突然发作，因此它也是突发公共卫生事件

答案：A、B、C

本题解析：
 暂无解析

3. 电子传递链中氧化与磷酸化偶联的部位是()。

- A. , NADH→CoQ
- B. FADH2→CoQ
- C. CoQ→CytC
- D. Cytaa3→O

答案：A、C、D

本题解析：
 暂无解析

4. 当事人对行政处罚决定不服的，可以依法申请()。

- A. 行政强制
- B. 行政复议
- C. 行政诉讼
- D. 行政裁决
- E. 行政讨论

答案：B、C

本题解析：
 暂无解析

5. 喹诺酮对下列哪种病原体有效？()

- A. 伤寒杆菌
- B. 分枝杆菌
- C. 真菌
- D. 厌氧菌

答案：A、B、D

本题解析：
 喹诺酮类为广谱抗菌药，对多种细菌有杀灭作用，但对真菌无效。

6. 下列哪些疾病常易发生晕厥并可能碎死

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 肺动脉瓣狭窄
- C. 肥厚型心肌病
- D. 主动脉瓣狭窄

答案：B、D

本题解析：
 暂无解析

7. 关于动作电位传导特点的说法，下列正确的是()

- A. "全或无"
- B. 呈不衰减性传导
- C. 有不应期

D. 刺激越强，传导越远

E. 双向传导

答案：A、B、C、E

本题解析：
兴奋在同一细胞上传导的特点：(1)不衰减性传导：动作电位大小不随传导距离增大而发生改变。(2)"全或无"现象：动作电位要么就不产生，只要产生就达到最大。(3)双向传导。(4)动作电位的传导具有瞬时性和极化反转。(5)脉冲式传导：原因是有不应期的存在。

8. 属于硝酸甘油作用机制的有()。

A. 使全身血管扩张

B. 降低心肌氧消耗

C. 缩小心外膜血管

D. 减轻心脏前后负荷

答案：A、B、D

本题解析：
属于硝酸甘油作用机制使全身血管扩张，降低心肌氧消耗，减轻心脏前后负荷。敌临床上缓解各类心绞痛的首选药。

9. 消化管壁的一般构造包括()

A. 黏膜

B. 黏膜皱襞

C. 肌织膜

D. 外膜

E. 黏膜下组织

答案：A、C、D、E

本题解析：

消化管各段的形态和功能不同，其构造也各有特点，但从整体来看，却有类似之处。如自咽至肛门之间的消化管壁，都可分为四层，即由内向外分为黏膜、黏膜下组织、肌织膜和外膜。

10. 淤血的病理变化及后果

A. 淤血性水肿

B. 淤血性出血

C. 实质细胞变性

D. 血压降低

答案：A、B、C

本题解析：
暂无解析

三. 判断题(共 10 题)

1. 在 ABO 系统血型相同的人之间进行输血，输血前不需要进行交叉配血试验。()

答案：错误

本题解析：
ABO 系统血型相同的人之间进行输血，输血前仍然需要进行交叉配血试验，防止 Rh 血型阴性和阳性溶血。

2. 医师发现患者涉嫌伤害事件或者非正常死亡时，应当按照有关规定向有关部门报告。

答案：正确

本题解析：
暂无解析

3. LD50 值与急性毒性大小成正比。()

答案：错误

本题解析：
LD50 是半数致死剂量，也就是引起动物群体中一半动物死亡的剂量。LD50 数值越小，表明需要较少的该物质就可引起一半动物死亡，则表示这种物质的急性毒性较大。即 LD50 与急性毒性大小成反比。物浓度下降一半所需要的时间。其长短可反映体内药物消除速度。

4. 神经细胞通过乙酰胆碱作用，使 Na 在终板膜内流，在终板膜局部电位加和后引起动作电位的传导。()

答案：错误

本题解析：
通过乙酰胆碱作用打开的 Na 通道是化学门控通道，在终板上只会产生局部电位，不能加和成动作电位，只有当局部电位传导到肌膜上时，才有引起动作电位的电门控通道，引起动作电位。

5. 患者有权复印或者复制自己的门诊病历、住院志、体温单、医嘱单、化验单、医学影像检查资料、特殊检查同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理资料、护理记录等病历资料。(?)

答案：正确

本题解析：
暂无解析

6. 医疗机构歇业，可以不办理注销登记。()

答案：错误

本题解析：
暂无解析

7. 防止微生物进入机体或物体的方法称为无菌技术或无菌操作。

答案：正确

本题解析：
暂无解析

8. 呋塞米不用于治疗充血性心力衰竭。（ ）

答案：错误

本题解析：
呋塞米，又名呋喃苯胺酸、速尿，是一种广泛应用于治疗充血性心力衰竭和水肿的袢利尿药。主要治疗充血性心力衰竭、肝硬化、和肾疾病引起的水肿，急性肺水肿或脑水肿和高血压，也可用于配合补液，加速某些经肾消除的毒物排泄。

9. 发生重大灾害、事故、疾病流行或者其他意外情况时，医疗机构及其卫生技术人员必须服从县级以上人民政府卫生行政部门的调遣。（ ）

答案：正确

本题解析：
暂无解析

10. 正常心尖搏动位于左锁骨中线第四肋间内侧 0.5~1.0 厘米。（ ）

答案：错误

本题解析：
心脏收缩时，心尖撞击心前区胸壁，使相应部位肋间组织向外搏动，称为心尖搏动。正常心尖搏动，坐位时一般位于第 5 肋间左锁骨中线内 0.5~1.0cm 处，距正中线约 7.0~9.0cm，搏动范围直径约 2.0~2.5cm。

四. 问答题(共 5 题)

1. 胃蛋白酶用于缺乏胃蛋白酶或病后消化机能减退而引起的消化不良症，现欲配制 100ml 的胃蛋白酶合剂，处方如下：
胃蛋白酶 2.0g，单糖浆 100ml，5%羟苯乙酯乙醇 1.0ml，稀盐酸 2.0ml，橙皮酊 2.0ml，纯化水加至 100ml。
根据上述材料提供的信息，回答下列问题：
写出处方中各成分的作用。

答案：

本题解析：
主药：胃蛋白酶
矫味剂：单糖浆、橙皮酊
pH 调节剂：稀盐酸
防腐剂：5%羟苯乙酯乙醇
溶剂：纯化水

2. 2018 年 5 月 31 日上午，H 市某区卫生服务中心在接诊过程中发现，有 3 名某校学生前来该院就诊，症状均为头晕和腹痛，随即通过区疾控中心向上级应急部门报告。经调查了解，截至 5 月 31 日 17 点整，该校医务室及医院共接待就诊学生 82 人。
为明确诊断，应做哪些医学影像学检查？请说明理由

答案：

本题解析：
(1)腹部超声、X 线、钡餐造影、钡剂灌肠：可用于观察胃，十二指肠先天性畸形，慢性炎症等。
(2) 腹部 CT/MRI；仿真小肠 CT/MRI：是小肠影像学的主要检查方法
(3) 胃镜、小肠镜、结肠镜（黏膜活组织检查）：可进一步诊断病变的性质，分布范围及程度。
(4) 胶囊内镜：可以窥探人体肠胃的健康状况，用于进一步诊断。

3. 患者，女，50 岁。误服乐果 100ml，神志不清 4 小时送至医院急诊，途中患者有呕吐，呕吐物为胃内容物。查体：T36.5℃，P120 次/分，R30 次/分，BP94/62mmHg，SaO288%；浅昏迷，瞳孔等大等圆，直径 1mm，对光反射迟钝，两肺满布湿啰音。头发和衣服上见呕吐物。诊

断为有机磷农药中毒。
根据上述材料提供的信息，回答下列问题：
请指出清除毒物外，还应采取哪些急救护理措施？

答案：

本题解析：
(1) 维持有效呼吸:及时有效地清理呼吸道分泌物，正确应用机械通气。
(2) 洗胃护理：
①尽早、彻底和反复进行洗胃，直到洗出的胃液无农药味澄清为止。
②若不能确定有机磷杀虫药种类，则用清水或 0.45%盐水彻底洗胃。
③敌百虫中毒时应选用清水洗胃，忌用碳酸氢钠溶液和肥皂水洗胃。
④洗胃过程中应密切观察患者生命体征的变化，若发生呼吸、心搏骤停，应立即停止洗胃。
(3) 用药护理：使用阿托品时，注意观察病情变化，防止中毒以及阿托品化的发生。
(4) 病情观察：
①观察患者生命体征
②神志及瞳孔变化：瞳孔缩小则为有机磷农药中毒的体征之一，瞳孔扩大则为达到“阿托品化”的判断指标之一。
③中毒后“反跳”：若患者出现胸闷、流涎、出汗、言语不清、吞咽困难等临床表现，应迅速通知医生，进行处理，立即静脉补充阿托品。
④迟发性多发性神经病：少数患者出现。
(5) 加强心理护理。

4. 患者，女，21 岁，未婚，因“突感腹部疼痛 1 小时”于夜间由其父母陪同来医院急诊。查体：精神差，贫血貌，痛苦面容，心肺听诊未见异常，腹软，腹部有压痛、反跳痛，无明显腹肌紧张。急诊医生问及患者是否有性行为，患者及其父母均否认。医生高度怀疑异位妊娠，建议腹部彩超检查，并请妇产科医生会诊。家长以患者未婚为由，坚决拒绝检查及会诊，医生只好留院观察。夜间患者腹痛加剧，出现休克症状，剖腹探查支持异位妊娠诊断，术中切除一侧输卵管，虽经抢救患者脱险，但其家长认为延误病情对诊治不满意，去医务科投诉。
根据上述材料提供的信息，回答下列问题：
如果你是该院负责医患纠纷的工作人员，如何处理？

答案：

本题解析：
作为负责医患纠纷的工作人员应做如下处理：
(1) 记录患者及家属的投诉，注重关键信息和焦点。
(2) 向有关科室了解情况，向患者及家属解释，必要时请科主任参加。
(3) 患者及家属若接受解释，表示理解则进行沟通。

（4）若患者及家属仍有意见，根据情况建议患者请医疗事故鉴定，或进一步解释。

（5）若患者及家属保留意见并起诉，积极应诉，立即妥善保管原始资料，封存有关医疗物品。

5. 患者，女，40 岁。因“发热、尿频、尿急、尿痛 3 天”就诊。3 天前劳累后出现尿频、尿急、尿痛，伴寒战，高热，恶心，无呕吐，自觉左侧腰部疼痛。既往体健。查体：T 39.0℃，BP 130/80mmHg，双肺呼吸音清晰，心率 92 次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音，腹平软，左侧肾区叩击痛（+），双下肢无水肿。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题：

请列出诊疗方案。

答案：

本题解析：

实验室及相关检查：（1）尿液检查：①尿常规②细菌学检查，以膀胱穿刺尿培养结果最可靠。

（2）血液检查①血常规，急性肾盂肾炎时中性粒细胞增多，血沉加快。②肾功能

（3）影像学检查如 B 超、X 线平片、IVP、逆行性肾盂造影等，了解尿路情况，及时发现有无尿路结石、梗阻、反流、畸形等导致尿路感染反复发作的因素。

治疗：（1）一般治疗：注意休息，多饮水，勤排尿，可口服碳酸氢钠片碱化尿液、缓解症状、抑制细菌生长等。

（2）抗感染治疗用药原则：①选用致病菌敏感的抗生素。常用的有喹诺酮类、头孢类②抗生素在尿和肾内浓度要高③选用肾毒性小，副作用少的抗生素。④可联合用药等

（3）预防措施，多饮水、勤排尿是最有效的预防方法。

五. 综合(共 50 题)

1. 当红细胞的表面积 / 容积之比增大时，红细胞的渗透脆性将_____、其可塑性将_____。

正确答案：
"增加", "下降"

2. 哪几种绦虫的虫卵相似，如何鉴别？

正确答案:猪带绦虫卵，牛带绦虫卵和细粒棘珠绦虫卵相似。由于棘

球绦虫成虫不寄生于消化道。故只对前两者进行鉴别。其根据是：一是孕节片的子宫分支数目，一侧少于 13 支者为猪带绦虫孕节，多于 14 支为牛带绦虫孕节；二是通过驱虫后观察头节形成与结构鉴别，猪带绦虫头节上具有顶突和小钩，而牛带绦虫呈方形，无顶突及小钩。

3. 使肩关节外展的肌肉是（ ）

A、三角肌

B、胸大肌

C、肩胛下肌

D、背阔肌

E、斜方肌

正确答案:A

4. 在慢性炎症中，嗜中性粒细胞最常见。（ ）

正确答案:错误

5. 肾脏的球—管平衡

正确答案:肾脏的球-管平衡：正常情况下，近端小管的重吸收率始终保持在肾小球滤过率的 65～

70%，这种现象称肾脏的球—管平衡。其生理意义在于使尿中排出的溶质和水不致因肾

小球滤过率的增减而出现大幅度的变动。

6. 心壁的血液由什么动脉供给（ ）

A、降主动脉分支右冠状动脉

B、主动脉弓分支左、右冠状动脉

C、升主动脉分支右冠状动脉

D、升主动脉分支左、右冠状动脉

E、主动脉弓分支左冠状动脉

正确答案:D

7. 门静脉没有静脉瓣。』JY』（ ）

正确答案:正确

8. 阿托品对眼的作用是：（ ）

A、扩瞳，调节麻痹

B、扩瞳，降低眼内压

C、缩瞳，调节麻痹

D、扩瞳，视近物清楚

E、扩瞳，调节痉挛

正确答案:A

9. 瞳孔括约肌和瞳孔开大肌均为肌上皮细胞。（ ）

正确答案:正确

10. 某 5 岁病儿，腹泻 3 天，10 余次 / 天，可能会发生哪种水、电解质代谢紊乱?为什么？

正确答案:可发生脱水，低钾血症。因为大量丢失的消化液使体液容量不足产生脱水，消化液基本

为等渗液，在病程中如果病儿能得到适当的水和钠补充，再加上肾脏的调节，可维持渗透

压正常发生等渗性脱水。如果病程中因口渴过量引用纯水而未补充钠盐，则可出现低渗性

脱水。如果病程中得不到适当的水分补充，因呼吸、皮肤蒸发继续丢失相当数量的水而无

相应的电解质丢失，则可产生高渗性脱水。因消化液中含有丰富的钾，丢失消化液过多

可产生低钾血症。

11. 必须静脉滴注才能维持降压效果的药物为：（ ）

A、硝苯地平

B、硝酸甘油

C、二氢噻

D、哌唑嗪

E、硝普钠

正确答案:E

12. 交叉配血试验，主侧是指_____，次侧是指_____。

正确答案：
"供血者的红细胞与受血者的血清相混合", "受血者的红细胞与供

血者的血清相混合。"

13. 成人每日通过皮肤不感蒸发量约为()

- A、200～400ml
- B、600～800ml
- C、100ml
- D、400～600ml
- E、800～1000ml

正确答案:B

14. 利多卡因虽然口服吸收良好，但肝脏首过消除明显，因此在治疗心律失常时宜采用_____给药法。

正确答案：
静脉

15. 医学节肢动物对人的主要危害是传播疾病。()

正确答案:正确

16. 肉芽肿形成对宿主的利与弊？

正确答案:肉芽肿形成是宿主机体对异源性有害因子的防御反应，有利于破坏和消除虫卵。包裹和隔离虫卵释放的SEA进入血液损害全身。不利的一面：肉芽肿形成后，可形成瘢痕纤维化，堵塞血管等一系列病变。

17. 双链DNA分子中，碱基组成为A=T，G=C。()

正确答案:正确

18. HIV是属于()

- A、线性双链DNA分子
- B、双链环状DNA分子
- C、单链负股RNA病毒
- D、单链正股RNA病毒
- E、获得性免疫缺陷征的病原体

正确答案:E

19. IgM为五聚体，与抗原的结合是五价。()

正确答案:正确

20. Arthus反应是一种II型超敏反应。()

正确答案:错误

21. 出血性梗死的条件_____、_____。

正确答案：
"严重淤血组织", "结构疏松"

22. 当骨组织内的有机质尚无钙盐沉积时称作_____，钙盐沉积后便成为_____。

正确答案：
"类骨质", "骨质"

23. 细胞内含量较多的核苷酸是()

- A、3'-ATP
- B、3'-UTP
- C、3'-dATP
- D、3'-dUTP
- E、5'-AT、

正确答案:E

24. 强心苷治疗慢性心功能不全主要药理根据有二：加强心肌收缩力和加快心率。()

正确答案:错误

25. 肿瘤分化越高：()

- A、预后越差
- B、转移越早
- C、恶性程度越低
- D、对放射治疗敏感
- E、恶性程度越高

正确答案:C

26. 淋巴组织的主要成分是：()

- A、网状组织、淋巴细胞和巨噬细胞
- B、网状组织、T细胞和巨噬细胞
- C、网状组织、B细胞和浆细胞
- D、结缔组织、B细胞和浆细胞
- E、结缔组织、T细胞和巨噬细胞

正确答案:A

27. 基因芯片可用于DNA的测序。()

正确答案:正确

28. 按精子发生过程生精细胞依次包括_____、_____、_____和_____。

正确答案：
"精原细胞", "初级精母细胞", "次级精母细胞", "精子细胞和精子"

29. 支气管粘膜鳞状上皮化是指假复层纤毛柱状上皮直接转变为鳞状上皮。()

正确答案:错误

30. 肺小叶

正确答案:肺小叶：每个细支气管连同它的分支至肺泡，即为一个肺小叶，是肺的结构单位。

31. DIC的临床表现复杂多样，但主要表现是出血、休克、器官功能障碍和贫血。()

正确答案:正确

32. 研究最早的病毒是()

- A、乙型肝炎病毒
- B、SV40
- C、DNA病毒
- D、腺病毒
- E、RNA病毒

正确答案:B

33. 热原质在高压蒸气灭菌下可以被破坏。()
正确答案: 错误

34. 闰盘是心肌细胞之间的_____。

正确答案:
连接结构

35. 人体生理功能活动的主要调节方式是_____调节、_____调节和_____调节。

正确答案:
"神经", "体液", "自身"

36. 大剂量的碘对抗甲状腺的作用临床主要应用于甲状腺危象的处理和甲亢的术前准备。()
正确答案: 正确

37. 与Ⅰ型糖尿病相关的基因是()
A、信号传导系统
B、胰岛素受体基因
C、胰岛素受体后基因
D、胰岛素基因
E、HLA 基因
正确答案:E

38. B 淋巴细胞识别的抗原包括_____, _____。

正确答案:
"胸腺依赖型抗原", "胸腺非依赖型抗原"

39. 衣原体是一类能通过细菌滤器、有独特发育周期、在细胞内寄生的原核细胞型微生物。()

正确答案: 正确

40. 胎儿和胎盘都由受精卵发育而来。()
正确答案: 错误

41. 脂肪变性有时也可以见于细胞外。()
正确答案: 错误

42. 从受精卵到胎儿发育成熟、娩出约需_____天。

正确答案:
266

43. 在 PCR 反应中, T_m 等于()
A、4 (A+T) +2 (C+G)
B、2 (A+G) +4 (C+T)
C、2 (A+C) +4 (T+G)
D、(A+T) + (C+G)
E、2 (A+T) +4 (C+G)
正确答案:A

44. 以下哪项不包括胸肌()
A、胸锁乳突肌
B、胸小肌
C、肋间肌
D、胸大肌
E、前锯肌
正确答案:A

45. 等渗性脱水处理不及时, 可通过_____及_____失水转变成_____, 而只补充水, 又可转变成_____。

正确答案:
"皮肤", "呼吸道", "高渗性脱水", "低渗性脱水"

46. 一个运动单位是指:()
A、一个运动神经元的树突及其相联系的神经元
B、一个运动神经元的轴突分支所支配的一条骨骼肌纤维
C、一个运动神经元的轴突及其分支所支配的全部骨骼肌纤维
D、一个运动神经元轴突终末的膨突及其所支配的平滑肌细胞
E、一个神经节内所有运动神经元的轴突应支配的所有效应细胞
正确答案:C

47. 关于糖皮质激素的作用错误的为:()
A、可以使血糖增高
B、可促进脂肪组织中的脂肪分解
C、增加胃酸分泌及胃蛋白酶生成诱发溃疡
D、可使外周血中性粒细胞增加
E、可使肝脏及肌肉蛋白质分解
正确答案:E

48. 肝硬化后期可出现_____, _____症状。

正确答案:
"门脉高压", "肝功能受损"

49. 急性呼吸性酸中毒时, 机体的主要代偿措施是_____, 慢性呼吸性酸中毒时, 机体的主要代偿措施是_____。

正确答案:
"肺", "肾"

50. 细菌在代谢过程中能合成色素, 其分为_____和_____两种。

正确答案:
"脂溶性色素", "水溶性色素"

第 II 卷

一. 单选题 (共 100 题)

1. 可能引起前庭反应的药物是（ ）

- A. 美他环素
- B. 土霉素
- C. 四环素
- D. 多西环素
- E. 米诺环素

答案：E

本题解析：
暂无解析

2. 硫糖铝治疗消化性溃疡病的机制是

- A. 中和胃酸
- B. 抑制胃酸分泌
- C. 抑制胃壁细胞内 H⁺-K⁺-ATP 酶
- D. 保护胃肠粘膜
- E. 抗幽门螺杆菌

答案：D

本题解析：
暂无解析

3. 以下选项中，不属于脂多糖组分的是（ ）。

- A. 脂质 A
- B. 核心多糖
- C. 特异多糖

D. N-乙酰葡萄糖胺

答案：D

本题解析：
D 选项为肽聚糖的组成部分。

4. 鼻泪管开口于（ ）

- A. 鼻前庭
- B. 上鼻道
- C. 中鼻道
- D. 下鼻道
- E. 蝶筛隐窝

答案：D

本题解析：
暂无解析

5. 在下列关于肌的起止、运动的描述中，以下哪项是错误的（ ）

- A. 运动时，多以起点为动点
- B. 肌的起止点是相对的，可以互换
- C. 四肢肌的起点多相对靠近肢体的近端
- D. 躯干肌的止点多相对远离身体的正中线
- E. 一块肌的起止点间可跨过多个关节

答案：A

本题解析：
暂无解析

6. 关于反射的论述，哪一项是错误的

- A. 完成反射的前提，反射弧的结构功能要完整
- B. 反射是实现神经调节的基本方式
- C. 体内如果刺激方式一样，其反射表现应该完全相同
- D. 在反射进行过程中可以有体液因素参与
- E. 完成反射必须要有中枢神经系统参与

答案：C

本题解析：
暂无解析

7. 标志着当代护理思想和观念重大变革的是（ ）

- A. 整体护理
- B. 心理护理
- C. 基础护理
- D. 社区护理
- E. 家庭病床护理

答案：A

本题解析：
暂无解析

8. 通过肌腔隙的结构有（ ）

- A. 股外侧皮神经
- B. 股神经
- C. 髂肌
- D. 腰大肌或肌腱
- E. 以上都正确

答案：E

本题解析：
暂无解析

9. 毛果芸香碱是

A. 作用于受体的药物

B. 受体激动剂

C. 作用于 M 受体的药物

D. M 受体激动剂

E. M 受体拮抗剂

答案：D

本题解析：
暂无解析

10. 血吸虫的中间宿主是：

A. 人

B. 虾

C. 蟹

D. 水蛙

E. 钉螺

答案：E

本题解析：
暂无解析

11. 糖尿出现时，全血血糖浓度至少为

A. 83. 33mmol / L（1500mg / d1）

B. 66. 67mmol / L（1200mg / d1）

C. 27. 78mmol / L（500mg / d1）

D. 11. 11mmol / L（200mg / d1）

E. 8. 89mmol / L（160mg / d1）

答案：E

本题解析：
暂无解析

12. 臀大肌与其周围结构的关系最危险的是（ ）

A. 浅面的臀内侧皮神经

B. 深面穿经梨状肌上孔的血管神经

C. 深面穿经梨状肌下孔的血管神经

D. 下缘的坐骨神经

E. 上缘的臀上神经

答案：D

本题解析：
暂无解析

13. 多尿是指 24 小时尿量大于

A. 1000ml

B. 1500ml

C. 2000ml

D. 2500ml

E. 3000ml

答案：D

本题解析：

暂无解析

14. PaCO₂ 原发性增加可见于()

A. 代谢性酸中毒

B. 呼吸性碱中毒

C. 代谢性碱中毒

D. 呼吸性酸中毒

E. 酸碱平衡正常

答案：D

本题解析：
暂无解析

15. 铅中毒可引起（ ）

A. ALA 增加

B. 胆色素原增加

C. 血红素增加

D. 尿卟啉增加

E. 琥珀酰 CoA 减少

答案：A

本题解析：
暂无解析

16. 关于甲状腺描述错误的是()。

A. 甲状腺为红褐色腺体

B. 形状呈 A 型

C. 成年男女平均重量不同

D. 甲状腺被气管前筋膜包裹，该筋膜形成甲状腺假被膜

答案：B

本题解析：
暂无解析

17. 决定输血治疗前，经治医师应向患者或其家属说明什么？

A. 疾病与血型的关系

B. 输同种异体血的不良反应和经血传播疾病的可能性

C. 血液传播性疾病的症状

D. 血液的采集与保存

答案：B

本题解析：
暂无解析

18. 较大剂量阿司匹林引起的不良反应中，最为常见的是（ ）。

A. 胃肠道反应

B. 凝血障碍

C. 诱发哮喘

D. 水杨酸反应

答案：A

本题解析：
较大剂量阿司匹林最常见的不良反应是胃肠道反应。

19. 主动脉弓（ ）

A. 弯向右后方

B. 凸侧发出左、右无名动脉(头臂干)

C. 在第六胸椎水平移行为降主动脉

D. 弓下缘借动脉韧带连于肺动脉分叉处左侧

答案：D

本题解析：
暂无解析

20. 长期咳嗽，咯白色泡沫痰，可能的病因是

A. 支气管哮喘

B. 肺炎

C. 支气管扩张

D. 慢性支气管炎

E. 肺结核

答案：D

本题解析：
暂无解析

21. 心前区疼痛呈压榨样伴窒息感

A. 输尿管结石

B. 十二指肠溃疡

C. 急性胆囊炎

D. 心绞痛

E. 颅内压增高

答案：D

本题解析：
暂无解析

22. 在肾内髓部组织间液高渗梯度形成中起主要作用的是

A. 近端小管 NaCl 重吸收

B. 髓袢升支细段 NaCl 重吸收

C. 髓袢升支粗段 NaCl 重吸收

D. 远曲小管 NaCl 重吸收

E. 集合管 NaCl 重吸收

答案：B

本题解析：
暂无解析

23. 无偿献血的血液用途，必须符合以下规定

A. 在保证临床用血的前提下，可以出售给单采血浆站

B. 在保证临床用血的前提下，可以出售给血液制品生产单位

C. 由血站自主决定

D. 必须用于临床

E. 由卫生行政部门根据情况确定

答案：D

本题解析：
暂无解析

24. 感觉的非特异性投射系统

A. 经三级神经元接替后弥散地投向大脑皮层

B. 引起各种模糊的皮肤、内脏及视、听感觉

C. 受到破坏时，动物进入持久的昏睡状态

D. 受到刺激时，动物脑电图呈同步化慢波

E. 不易受药物作用的影响而改变其功能状态

答案：C

本题解析：
暂无解析

25. 医院的医院感染管理委员会的主要职责不包括（ ）

A. 对医院感染管理科拟定的全院医院感染管理工作计划进行审定，对其工作进行考评

B. 根据《综合医院建筑标准》有关卫生学标准及预防医院感染的要求，对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见

C. 定期总结、分析细菌学检测监测资料，向有关部门反馈，并向全院公布

D. 建立会议制度，定期研究、协调和解决有关医院感染管理方面的重大事項；遇有紧急问题随时召开

E. 依据有关政策法规，制定全院控制医院感染规划、管理制度，并组织实施

答案：C

本题解析：
暂无解析

26. 糖皮质激素和抗生素合用治疗严重感染的目的是（ ）。

A. 增加机体的抗感染能力

B. 增强抗生素的抗菌活性

C. 降低抗生素的不良反应

D. 抗毒、缓解毒血症状、抗休克

答案：D

本题解析：
糖皮质激素抗炎、抗休克、抗毒、降低机体对内毒素的反应，但不中

和内毒素、不抗菌、不增强抗生素的抗菌活性，也不干扰抗生素的不良反应。与抗生素合用治疗严重感染的目的是发挥其抗炎、抗毒、抗休克作用。

27. 只对肠外阿米巴有效的药物是（ ）。

A. 氯喹

B. 双碘喹啉

C. 喹碘方

D. 甲硝唑

答案：A

本题解析：
抗阿米巴病药氯喹主要用于肠外阿米巴病，而甲硝唑对急性阿米巴痢疾、肠外阿米巴病效果最好，与抗肠腔内阿米巴药物交替使用，可缩短疗程和降低复发率；卤代喹啉类主要用于肃清肠腔内原虫；二氯尼特单独用于急性阿米巴痢疾、肠外阿米巴病无治疗作用，可用于肠内阿米巴病的治疗。

28. 可兴奋细胞兴奋时，共有的特征是产生

A. 收缩反应

B. 分泌

C. 神经冲动

D. 电位变化

E. 离子运动

答案：D

本题解析：
暂无解析

29. 慢性铅中毒主要损害

A. 神经系统、消化系统、血液系统

B. 骨骼、泌尿系统

C. 中枢神经系统

D. 骨骼、牙齿

E. 消化系统、呼吸系统

答案：A

本题解析：
暂无解析

30. 不规则热常见于

A. 肺炎球菌肺炎

B. 疟疾

C. 风湿热

D. 流行性感冒

E. 斑疹伤寒

答案：D

本题解析：
暂无解析

31. 具有生物催化剂特征的核酶，其化学本质是（ ）。

A. 蛋白质

B. RNA

C. DNA

D. 糖蛋白

E. 碱基对

答案：B

本题解析：
核酶是具有催化功能的 RNA 分子，是生物催化剂，可降解特异的 mRNA 序列。核酶又称核酸类酶、酶 RNA、核酶类酶 RNA。它的发现打破了酶是蛋白质的传统观念。

32. 下列疾病，不出现偏瘫的是

- A. 脑血栓形成
- B. 脑出血
- C. 脑肿瘤
- D. 脑外伤
- E. 脊髓灰质炎

答案：E

本题解析：
暂无解析

33. 直、结肠家族性多发性腺瘤性息肉属于

- A. 肉瘤
- B. 早期胃癌
- C. 良性肿瘤
- D. 恶性肿瘤
- E. 癌前病变

答案：E

本题解析：

结肠、直肠的多发性腺瘤性息肉属于癌前病变，往往有家族史，40%～50%可发生癌变。早期胃癌为局限于黏膜及黏膜下层的胃癌。卵巢是发生畸胎瘤最常见的部位。①良性畸胎瘤又称成熟畸胎瘤。多为囊性，称囊性畸胎瘤。肿瘤内可见皮肤及其附件. 软骨、呼吸道、消化道上

皮及神经组织等。以上各种成分分化成熟，预后好。极少数鳞状上皮可恶变为鳞癌。②恶性畸胎瘤又称不成熟型畸胎瘤。多为实性，肿瘤由分化不成熟的胚胎样组织组成，常有分化不良的神经外胚层成分。

34. 门静脉由（ ）

- A. 肠系膜上、下静脉汇合形成
- B. 肠系膜上静脉和脾静脉汇合形成
- C. 脾静脉与肠系膜下静脉汇合而成
- D. 肝静脉与脾静脉汇合而成
- E. 胃冠状静脉与肝静脉汇合而成

答案：B

本题解析：
暂无解析

35. 组织实施国家有关政策法规（）

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 医院的医院感染管理委员会
- C. 医院感染管理科
- D. 临床科室
- E. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会

答案：A

本题解析：
暂无解析

36. 二尖瓣杂音在下列哪种体位听诊最清楚

- A. 坐位

B. 立位

C. 平卧位

D. 右侧卧位

E. 左侧卧位

答案：E

本题解析：
暂无解析

37. 我国发生的严重急呼吸分析征 (SARS) 很快波及到很多省市，这种发病情况称为？

- A. 爆出
- B. 大流行
- C. 季节升高
- D. 周期流行

答案：C

本题解析：
暂无解析

38. 头部与颈部的分界线是（ ）

- A. 下颌骨下缘、下颌角、乳突尖端、下项线与枕外隆凸的连线
- B. 下颌骨下缘、下颌支、乳突尖端、上项线与枕外隆凸的连线
- C. 下颌骨下缘、下颌角、乳突尖端、上项线与枕外隆凸的连线
- D. 下颌骨下缘、下颌角、乳突根部、上项线与枕外隆凸的连线
- E. 下颌骨下缘、下颌角、乳突尖端、上项线与枕旁隆凸的连线

答案：C

本题解析：
暂无解析

39. 关于 ATP 在能量代谢中的作用，哪项是错误的？（ ）

- A. 体内合成反应所需的能量均由 ATP 直接供给
- B. 能量的生成、贮存、释放和利用都以 ATP 为中心
- C. ATP 的化学能可转变为机械能、渗透能、电能以及热能等
- D. ATP 通过氧化磷酸化作用调节其生成

答案：A

本题解析：
ATP 作为体内主要的能源物质，是许多生命活动的直接供能者，但 ATP 并不是唯一的直接能源，还存在着 GTP 等其他高能磷酸物质，这一点需要引起考生注意。

40. 控制哮喘急性发作最好选用（ ）

- A. 吸入倍氯米松
- B. 吸入色甘酸钠
- C. 吸入沙丁胺醇
- D. 口服特布他林
- E. 口服氨茶碱

答案：C

本题解析：
暂无解析

41. 剧烈运动时（交感神经兴奋），少尿的主要原因是

- A. 肾小球毛细血管血压增高
- B. 抗利尿激素分泌增多
- C. 肾小动脉收缩，肾血流量减少

- D. 醛固酮分泌增多
- E. 肾小球滤过膜面积减少

答案：C

本题解析：
暂无解析

42. 血浆的粘滞性主要决定于：

- A. 红细胞数量
- B. 白细胞数量
- C. 血小板的数量
- D. 血浆蛋白含量
- E. 血浆 NaCl 含量

答案：D

本题解析：
暂无解析

43. 革兰阴性杆菌败血症的临床特点主要为

- A. 双峰热，相对缓脉较多
- B. 迁徙性病灶少见
- C. 感染性休克常见
- D. 低蛋白血症
- E. 可出现多脏器功能衰竭

答案：C

本题解析：
暂无解析

44. 开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，每张处方不得超过（ ）种。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6
- E. 7

答案：C

本题解析：
暂无解析

45. 兼有广谱抗菌作用的抗疟药（ ）

- A. 氯喹
- B. 周效磺胺
- C. 乙胺嘧啶
- D. 伯氨喹
- E. 奎宁

答案：B

本题解析：
暂无解析

46. 药物的 t1/2 取决于（ ）

- A. 吸收速度
- B. 消除速度
- C. 血浆蛋白结合
- D. 剂量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/207136064136006121>