2024河北省邯郸县《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题王牌题库及参考答案（A卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.服用叶酸治疗巨幼红细胞贫血，需同时联合使用的药品是()。

A：维生素B

B：维生素B

C：依诺肝素

D：维生素B

答案：D

2.关于糖皮激素抗炎作用特点的描述，不正确的是

A：稳定溶酶体膜，抑制致炎物的释放

B：直接收缩血管，减少渗出和水肿

C：抑制白细胞和吞噬细胞移行血管外，减轻炎症浸润

D：促进肉芽组织生成，加速组织修复

答案：D

3.患者，男性，55岁。每年冬春季常有哮喘发作，近日来上呼吸道感染，咳嗽加哮喘，门诊测血压亦升高，治疗方案：给予抗感染及平喘治疗外，尚考虑给予降压药，其中欲选择一种β肾上腺素受体阻断药，应选用

A：纳多洛尔

B：美托洛尔

C：普萘洛尔

D：吲哚洛尔

答案：B

4.（2016年真题）属于延长动作电位时程的抗心律失常药是

A：利多卡因

B：索他洛尔

C：美托洛尔

D：硝酸甘油

答案：B

5.适用于干咳、咳嗽伴黏稠痰的患者,但不宜长期使用,用药7日症状未缓解应停药的恶心性祛痰药物是

A：氨溴索

B：氯化铵

C：乙酰半胱氨酸

D：溴己新

答案：B

6.口腔黏膜溃疡、牙龈炎及冠周炎可选用

A：曲伏前列素

B：四环素

C：9%硼酸冰片滴耳液

D：1%碘甘油

答案：D

7.容易发生双硫仑样反应的药物包括()

A：阿莫西林

B：头孢唑林

C: 链霉素

D: 青霉素

答案：B

8.以下平喘药可辅助治疗急性心功能不全和心源性哮喘的是

A: 孟鲁司特

B: 沙美特罗

C: 氨茶碱

D: 布地奈德

答案：C

9.袢利尿药中，耳毒性最小，对听力有缺陷及急性肾衰竭者宜选用的药物是()

A: 依他尼酸

B: 布美他尼

C: 呋塞米

D: 托拉塞米

答案：B

10.主要阻滞电压依赖性的钠通道，属于二苯并氮

A: 加巴喷丁

B: 苯巴比妥

C: 卡马西平

D: 苯妥英钠

答案：C

11.用于预防单纯性甲状腺肿的是

A: 甲状腺素

B: 小剂量碘制剂

C: 大剂量碘制剂

D: None

答案：B

12.阿奇霉素

A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

B: 用于非典型病原体感染

C: 肾毒性较大

D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案：B

13.体内缺乏维生素E会导致

A: 脚气病

B: 不孕症

C: 佝偻病

D: 夜盲症

答案：B

14.抑制排卵避孕药的较常见不良反应是

A: 子宫不规则出血

B: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌

C: 多毛、痤疮

D: 肾功能损坏

答案：A

15.属于工类抗心律失常药且能引起金鸡纳反应的是()

A: 胺碘酮

B：奎尼丁

C：利多卡因

D：普萘洛尔

答案：B

16.不可用于治疗白细胞减少的药物是

A：腺嘌呤

B：糖皮质激素

C：利伐沙班

D：利可君

答案：C

17.治疗难辨梭状芽孢杆菌引起的假膜性肠炎，宜选择的药物是

A：利奈唑胺

B：万古霉素

C：米诺环素

D：阿奇霉素

答案：B

18.他昔莫芬为前药，主要在肝脏经肝药酶代谢，该肝药酶是

A：CYP286

B：CYP3A4

C：CYP2D6

D：CYP2C19

答案：C

19.兼有镇静、催眠、抗惊厥和抗癫痫作用的药物是

A：佐匹克隆

B: 苯巴比妥

C: 卡马西平

D: 苯妥英钠

答案：B

20.功能性子宫出血可选用的药物是()

A: 雌二醇

B: 他莫昔芬

C: 司坦唑醇

D: 米非司酮

答案：A

21.患者，男，56岁，有高血压病史4年。体检：血压156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利控制血压。

A: 吲达帕胺

B: 缬沙坦

C: 美托洛尔

D: 氨氯地平

答案：B

22.（2019年真题）服用异烟肼进行抗结核治疗的患者，为预防周围神经炎，应补充的维生素是（）

A: 维生素B6

B: 维生素

C: 维生素A

D: 维生素B2

答案：A

23.整合素受体阻断剂的机制

A：使血小板内cAMP浓度增高而产生抗血小板作用

B：抑制葡萄糖脱氢酶

C：抑制纤维蛋白原与血小板膜表面糖蛋白受体的结合

D：抑制血小板表面的ADP受体

答案：C

24.小剂量用于妊娠期妇女预防胎儿神经管畸形的是

A：维生素B12

B：维生素B6

C：烟酸

D：叶酸

答案：D

25.属于NK-1受体阻断剂的止吐药物是

A：甲氧氯普胺

B：甲地孕酮

C：格雷司琼

D：阿瑞吡坦

答案：D

26.关于α葡萄糖苷酶抑制剂的作用特点描述，不正确的是

A：可单用于老年患者或餐后高血糖患者

B：临床用于各型糖尿病

C：易导致低血糖

D：口服吸收很少

答案：C

27.紧急降低眼压首选的药物是()

A: β 受体阻滞药

B: 拟M胆碱药

C: 20%甘露醇

D: 碳酸酐酶抑制剂

答案：C

28.典型不良反应除消化道反应，还有耳毒性和肾毒性的药物是

A: 长春碱类

B: 环磷酰胺

C: 顺铂

D: 多柔比星

答案：C

29.（2019年真题）患者，女，32岁，孕2周，既往有癫痫病史，长期服用卡马西平治疗，为防止引起新生儿出血，该患者妊娠晚期应当补充的维生素是（）

A: 维生素D

B: 维生素B12

C: 维生素K

D: 叶酸

答案：C

30.药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的7岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。患者可能发生与静脉滴注速度有关的不良反应是（）

A: 红人综合征

B: 急性肝衰竭

C: 高血压危象

D: 血糖异常

答案：A

31.利奈唑胺最常见的不良反应是

A: 黄疸

B: 腹部不适

C: 血小板减少

D: 静脉炎

答案：C

32.（2018年真题）配制静脉输液时;应先用灭菌注射用水溶解,然后用5%葡萄糖注射液稀释,不可用氯化钠注射液稀释的抗真菌药是（）

A: 两性霉素B

B: 卡泊芬净

C: 伏立康唑

D: 氟康唑

答案：A

33.（2016年真题）可使血小板内环磷腺苷（cAMP）浓度增高而产生抗血小板作用的药品是

A: 阿司匹林

B: 双嘧达莫

C: 氯吡格雷

D: 替罗非班

答案：B

34.属于白三烯受体阻断剂的平喘药是

A：多索茶碱

B：沙美特罗

C：布地奈德

D：孟鲁司特

答案：D

35.作用于DNA拓扑异构酶Ⅰ的生物碱是

A：甲氨蝶呤

B：来曲唑

C：卡莫氟

D：喜树碱

答案：D

36.硝酸酯类药发挥抗心绞痛作用时，体内参与的物质不包括

A：β 受体

B：cGMA依赖性蛋白激酶

C：钙离子

D：谷胱甘肽转移酶

答案：A

37.属于 α1受体阻断药，用于治疗良性前列腺增生症的是()

A：他达拉非

B：坦洛新

C：度他雄胺

D：西地那非

答案：B

38.属于肝药酶诱导剂，与华法林合用会减弱后者抗凝作用的药物是

A：氯苯那敏

B：苯妥英钠

C：丙戊酸钠

D：唑吡坦

答案：B

39.白女士，74岁，以“间断性腹胀1月余”主诉入院。患者1个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史14年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：

A：高血钾

B：肝功能不全

C：磺酰脲类过敏

D：无尿

答案：B

40.降低夜间眼压的首选药物是()

A：拉坦前列素滴眼剂

B：地匹福林滴眼剂

C：毛果芸香碱滴眼剂

D：噻吗洛尔滴眼剂

答案：A

41.有癫痫或精神病史的患者应慎用哪种药

A：乙胺丁醇

B：异烟肼

C：利福平

D：吡嗪酰胺

答案：B

42.可使维生素B6在体内的活性降低的是

A：糖皮质激素

B：雌激素

C：丙磺舒

D：异烟肼

答案：B

43.抗阿米巴原虫药的药物是()。

A：伯氨喹

B：奎宁

C：氯喹

D：甲硝唑

答案：D

44.特比萘芬属于()

A：多烯类抗真菌药

B：丙烯胺类抗真菌药

C：棘白菌素类抗真菌药

D：唑类抗真菌药

答案：B

45.治疗心绞痛急性发作的首选药物是()

A：硝酸甘油

B：普萘洛尔

C：地尔硫

D：维拉帕米

答案：A

46.高血压伴变异型心绞痛宜选用

A：普萘洛尔

B：硝苯地平

C：利血平

D：尼莫地平

答案：B

47.患者女，7岁，体重23kg，查血清钠浓度为152mmol／L，诊断为高渗性失水。相关资料：氯化钠注射液用于高渗性失水：所需补液总量（L）=[血钠浓度（mmol／L）一142]／血钠浓度（mmol／L）×0．6×体重（kg），第1日补给半量，余量在以后2～3日内补给，并根据心、肺、。肾功能酌情调节。

A：450ml

B：250ml

C：350ml

D：150ml

答案：A

48.糖皮质激素的药理作用不包括

A：抗病毒

B：抗炎

C：免疫抑制

D：抗休克

答案：A

49.作用机制是抗代谢的是

A: 紫杉醇

B: 枸橼酸他莫昔芬

C: 巯嘌呤

D: 吉非替尼

答案：C

50.长期大量服用维生素A会出现()

A: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

B: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

C: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

D: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、体重减轻、贫血、眼球突出等中毒现象

答案：D

51.抑制甲状腺内过氧化酶，使碘不能活化的是

A: 放射性碘

B: 糖皮质激素

C: 丙硫氧嘧啶

D: 甲状腺素

答案：C

52.叶酸与维生素B12联用治疗

A: 再生障碍性贫血

B: 巨幼细胞贫血

C: 溶血性贫血

D: 小细胞低血红蛋白性贫血

答案：B

53.可沉积在牙齿和骨的钙质区内，引起胎儿牙齿变色的药物是()

A：四环素

B：多西环素

C：青霉素

D：氯霉素

答案：A

54.容易引起球后神经炎的抗结核药物是

A：链霉素

B：异烟肼

C：乙胺丁醇

D：利福平

答案：C

55.不作为高血压治疗的首选药，临床适用于伴前列腺增生症的高血压患者或与其他药物联合用于顽固性高血压治疗的药物是()

A：特拉唑嗪

B：甲基多巴

C：可乐定

D：肾素抑制剂

答案：A

56.下列药物中，不属于雌激素的是

A：雌二醇

B：雌三醇

C：尼尔雌醇

D：黄体酮

答案：D

57.阻断H2受体的药物是

A：奥美拉唑

B：雷尼替丁

C：阿托品

D：氢氧化铝

答案：B

58.（2016年真题）军团菌和支原体混合感染宜首选的抗菌药物是

A：罗红霉素

B：利奈唑胺

C：头孢曲松

D：头孢他啶

答案：A

59.糖尿病合并轻中度肾功能不全者可选用()

A：格列齐特

B：格列喹酮

C：格列吡嗪

D：胰岛素

答案：B

60.可与强心苷类药物发生相互作用的是

A：坎利酮

B：丙酸睾酮

C：伐地那非

D：呋塞米

答案：D

61.（2018年真题）通过分解产生新生态氧而发挥杀菌除臭作用，用于治疗痤疮的药物是（）

A：壬二酸

B：过氧苯甲酰

C：阿达帕林

D：维A酸

答案：B

62.属于长效和强效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂的是

A：鲑降钙素

B：阿仑膦酸钠

C：阿法骨化醇

D：奥利司他

答案：D

63.（2021年真题）由于氧吡格置部分经CYP2C19转化为活性代谢物，合用控制此酶活性的药物会降低氯吡格雷的疗效，故不推荐与氯吡格雷合用的质子泵抑制剂是（）

A：兰索拉唑

B：奥美拉唑

C：泮托拉唑

D：雷贝拉唑

答案：B

64.（2017年真题）奎宁或氯喹日剂量超过1g或持续长时间应用，可见耳鸣、头疼、视力与听力减退等，停药后即可恢复，临床成为（）

A：金鸡纳反应

B：神经毒性反应

C：郝氏反应

D：双硫仑样反应

答案：A

65.长期用药易发生低镁血症的药物是（）

A：奥美拉唑

B：替普瑞酮

C：复方碳酸钙

D：胶体果胶铋

答案：A

66.用于合胞病毒引起的肺炎和支气管肺炎的抗病毒药是

A：更昔洛韦

B：利巴韦林

C：拉米夫定

D：碘苷

答案：B

67.下述关于甘油的描述，错误的是

A：用于便秘的治疗

B：属于渗透性泻药

C：属于润滑性泻药

D：妊娠期妇女慎用

答案：B

68.属于芳香化酶抑制剂，用于治疗乳腺癌

A：喜树碱

B: 卡莫氟

C: 来曲唑

D: 甲氨蝶呤

答案：C

69.易引起吉海反应的药物是()

A: 庆大霉素

B: 四环素

C: 青霉素

D: 诺氟沙星

答案：C

70.（2019年真题）关于NSAIDS类药物所致不良反应的说法，正确的是（）

A: 非选择性NSAIDS类药物导致的心血管风险高于选择性COX-2抑制剂

B: NSAIDS类药物所致的胃肠道不良反应中，以萎缩性胃炎最为常见

C: 非选择性NSAIDS类药物可导致胃及十二指肠溃疡和出血等风险

D: 选择性COX-2抑制剂导致胃及十二指肠溃疡和出血的风险高于非选择性NSAIDS类药物

答案：C

71.长期使用可使血钾水平升高的药品是

A: 氨苯蝶啶

B: 吲达帕胺

C: 呋塞米

D: 乙酰唑胺

答案：A

72.替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗()

A: 纤维瘤

B: 脑瘤

C: 慢性淋巴细胞性白血病

D: 恶性淋巴瘤

答案：B

73.男性，70岁，进食后饱胀不适伴反酸5年余，黑便1天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1期）伴出血。

A: 埃索美拉唑

B: 胶体果胶铋胶囊

C: 克拉霉素

D: 阿莫西林

答案：B

74.可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

A: 硫酸亚铁

B: 人血白蛋白

C: 重组人促红素

D: 维生素B12

答案：C

75.治疗醛固酮升高引起的顽固性水肿的是

A: 螺内酯

B: 阿米洛利

C: 氢氯噻嗪

D: 氨苯蝶啶

答案：A

76.患者男性，26岁。主诉发热、全身酸痛，头痛、乏力等，伴有阵发性刺激性干咳，红细胞冷凝集素试验阳性，血清肺炎支原体抗体阳性。

A: 氯霉素

B: 链霉素

C: 青霉素

D: 四环素

答案：D

77.氟西汀的作用机制是

A: 抑制突触前膜对去甲肾上腺素的再摄取

B: 抑制5-HT及去甲肾上腺素的再摄取

C: 选择性抑制5-HT的再摄取，增加突触间隙5-HT浓度

D: 抑制A型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT及多巴胺的降解

答案：C

78.与卡比马唑合用应谨慎的是

A: 甲状腺素

B: 放射性碘

C: 糖皮质激素

D: 丙硫氧嘧啶

答案：B

79.患者，男，15岁，因咳嗽、咳痰，发热3天入院，确诊为社区获得性肺炎，给予静滴青霉素钠10分钟后出现头昏，面色苍白，呼吸困难，血压下降等症状，对该患者首选的抢救药物是（）

A: 去甲肾上腺素

B: 多巴胺

C: 地塞米松

D: 肾上腺素

答案：D

80.患者男性，29岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压85/60mmHg，脉率110次/分。

A: 药物剂量过大

B: 使用药物缺乏针对性

C: 给药方式错误

D: 未做皮肤过敏试验

答案：D

81.茶碱类主要用于

A: 肺不张

B: 气管炎

C: 支气管扩张

D: 支气管哮喘

答案：D

82.下述不属于抗血小板类药物的是

A: 磷酸二酯酶抑制剂

B: 二磷酸腺苷P2Y12受体激动剂

C: 环氧酶抑制剂

D: 整合素受体阻断剂

答案：B

83.患者，女，56岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食、增加运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片20mg/d治疗。若采用强化治疗，辛伐他汀片的最大日剂量是()。

A: 80mg

B: 100mg

C: 40mg

D: 20mg

答案：A

84.作用较慢，首日剂量可增加至常规剂量2～3倍的利尿药物是

A: 乙酰唑胺

B: 呋塞米

C: 螺内酯

D: 氢氯噻嗪

答案：C

85.下列常用于防止癌症化疗引起呕吐的糖皮质激素是

A: 泼尼松龙

B: 泼尼松

C: 地塞米松

D: 甲泼尼龙

答案：C

86.（2015年真题）辅助治疗不孕症的维生素是（）。

A: 维生素B5

B：烟酸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/207136123046010024