

主治医师（康复医学）-基础知识(B1 型题 1)

1、支气管、血管、神经、淋巴管等进入的门户

- A. 肺门
- B. 肺叶
- C. 肺段
- D. 肺泡
- E. 肺根

2、支气管的终末分支

- A. 肺门
- B. 肺叶
- C. 肺段
- D. 肺泡
- E. 肺根

3、第二级支气管及其分支所辖的范围

- A. 肺门
- B. 肺叶
- C. 肺段
- D. 肺泡
- E. 肺根

4、咽与鼻腔的通道

- A. 梨状孔
- B. 咽峡
- C. 咽鼓管
- D. 喉口
- E. 后鼻孔

5、咽与喉腔的通道

- A. 梨状孔
- B. 咽峡
- C. 咽鼓管
- D. 喉口
- E. 后鼻孔

6、收集下半身及左上半身的淋巴

- A. 胸导管
- B. 左、右腰干
- C. 淋巴导管
- D. 淋巴干
- E. 淋巴结

7、收集下肢、盆部及腹腔的淋巴

- A. 胸导管
- B. 左、右腰干
- C. 淋巴导管
- D. 淋巴干
- E. 淋巴结

8、我国健康青年人在安静状态时的收缩压为

- A. 13. 3~16. 0kPa (100~120mmHg)
- B. 8. 0~10. 6kPa (60~80mmHg)
- C. 4. 0~5. 3kPa (30~40mmHg)
- D. 13. 3kPa (100mmHg)
- E. 8. 0~16. 0kPa (60~120mmHg)

9、我国健康青年人在安静状态时的平均动脉压约为

- A. 13. 3~16. 0kPa (100~120mmHg)
- B. 8. 0~10. 6kPa (60~80mmHg)
- C. 4. 0~5. 3kPa (30~40mmHg)
- D. 13. 3kPa (100mmHg)
- E. 8. 0~16. 0kPa (60~120mmHg)

10、慢性疼痛引起一系列器官、组织的反应，包括心率加快、血压升

高、恶心、呕吐等，是属于

- A. 生化反应
- B. 免疫系统反应
- C. 躯体反应
- D. 心理 / 行为反应
- E. 内脏反应

11、慢性疼痛和剧烈疼痛可出现酶和代谢系统的紊乱，是属于

- A. 生化反应
- B. 免疫系统反应
- C. 躯体反应
- D. 心理 / 行为反应
- E. 内脏反应

12、力点位于阻力点和支点之间的杠杆模式

- A. 平衡杠杆
- B. 省力杠杆
- C. 无力杠杆
- D. 速度杠杆
- E. 减速杠杆

13、支点在力点与阻力点中间的杠杆模式

- A. 平衡杠杆
- B. 省力杠杆
- C. 无力杠杆
- D. 速度杠杆
- E. 减速杠杆

14、阻力点位于力点和支点之间的杠杆模式

- A. 平衡杠杆
- B. 省力杠杆
- C. 无力杠杆
- D. 速度杠杆
- E. 减速杠杆

15、残疾一级预防是

- A. 指疾病或损伤发生之后，采取积极主动的措施防止发生并发症及功能障碍或继发性残疾的过程
- B. 预防可能导致残疾的各种损伤或疾病，避免发生原发性残疾的过程
- C. 脑血管意外之后，早期进行肢体的被动活动以预防关节挛缩，采取合适的体位避免痉挛畸形
- D. 残疾已经发生，采取各种积极的措施防止残疾恶化的过程
- E. 骨折患者，早期进行未固定关节的主动活动以预防关节活动障碍的发生

16、残疾二级预防是

- A. 指疾病或损伤发生之后，采取积极主动的措施防止发生并发症及功能障碍或继发性残疾的过程
- B. 预防可能导致残疾的各种损伤或疾病，避免发生原发性残疾的过程
- C. 脑血管意外之后，早期进行肢体的被动活动以预防关节挛缩，采取合适的体位避免痉挛畸形
- D. 残疾已经发生，采取各种积极的措施防止残疾恶化的过程
- E. 骨折患者，早期进行未固定关节的主动活动以预防关节活动障碍的发生

17、残疾三级预防是

- A. 指疾病或损伤发生之后，采取积极主动的措施防止发生并发症及功能障碍或继发性残疾的过程
- B. 预防可能导致残疾的各种损伤或疾病，避免发生原发性残疾的过程
- C. 脑血管意外之后，早期进行肢体的被动活动以预防关节挛缩，采取合适的体位避免痉挛畸形
- D. 残疾已经发生，采取各种积极的措施防止残疾恶化的过程
- E. 骨折患者，早期进行未固定关节的主动活动以预防关节活动障碍的发生

18、贴在肺表面

- A. 胸膜
- B. 壁胸膜
- C. 脏胸膜
- D. 胸腔
- E. 胸膜腔

19、呈负压

- A. 胸膜
- B. 壁胸膜
- C. 脏胸膜
- D. 胸腔
- E. 胸膜腔

20、最大的涎腺是

- A. 涎腺
- B. 腮腺
- C. 颌下腺
- D. 舌下腺
- E. 颌下腺

21、导管开口于舌系带两侧

- A. 涎腺

- B. 腮腺
- C. 颌下腺
- D. 舌下腺
- E. 颌下腺

22、支配腓肠肌的神经是

- A. 股神经
- B. 腓浅神经
- C. 胫神经
- D. 腓深神经
- E. 闭孔神经

23、支配缝匠肌的神经是

- A. 股神经
- B. 腓浅神经
- C. 胫神经
- D. 腓深神经
- E. 闭孔神经

24、支配大腿内收肌群的神经是

- A. 股神经
- B. 腓浅神经

- C. 胫神经
- D. 腓深神经
- E. 闭孔神经

25、为外

- A. 靠近头部
- B. 远离正中线
- C. 靠身体腹面者称前(腹)侧
- D. 相对远离体表
- E. 靠近体腔

26、为深

- A. 靠近头部
- B. 远离正中线
- C. 靠身体腹面者称前(腹)侧
- D. 相对远离体表
- E. 靠近体腔

27、为上

- A. 靠近头部
- B. 远离正中线
- C. 靠身体腹面者称前(腹)侧

- D. 相对远离体表
- E. 靠近体腔

28、此模式有利于激活皮肤触觉感受器和皮下肌群的一种活动形式

- A. 原始反射模式
- B. 本体反射模式
- C. 前庭模式
- D. 皮肤介导模式
- E. 运动模式

29、此模式多见于存在运动功能障碍的儿童，大部分有利于正常运动的形成，但如果存在过久则可干扰正常运动的形成，这种模式也可用于临床治疗

- A. 原始反射模式
- B. 本体反射模式
- C. 前庭模式
- D. 皮肤介导模式
- E. 运动模式

30、此模式可导向静止姿势和动态姿势反应，是有利于发展运动技能的重要活动模式

- A. 原始反射模式

- B. 本体反射模式
- C. 前庭模式
- D. 皮肤介导模式
- E. 运动模式

31、此模式依赖于躯干、头颈和肢体的位置，其最基本的模式即上、下肢的屈曲和伸展的协同肌收缩

- A. 原始反射模式
- B. 本体反射模式
- C. 前庭模式
- D. 皮肤介导模式
- E. 运动模式

32、相当于潮气量与解剖死腔的差值，乘以呼吸频率的乘积是

- A. 每分钟通气量
- B. 解剖死腔
- C. 生理死腔
- D. 肺泡通气量
- E. 肺泡死腔

33、呼吸道内不能参与肺泡与血液之间的气体交换的空间为

- A. 每分钟通气量

- B. 解剖死腔
- C. 生理死腔
- D. 肺泡通气量
- E. 肺泡死腔

34、干扰电流治疗作用中兴奋交感神经的差频

- A. 100Hz
- B. 50~100Hz
- C. 25~50Hz
- D. 20~40Hz
- E. 1~10Hz

35、干扰电流治疗作用中抑制交感神经的差频

- A. 100Hz
- B. 50~100Hz
- C. 25~50Hz
- D. 20~40Hz
- E. 1~10Hz

36、以上哪项属于蛋白质激素

- A. 肾上腺皮质激素、性激素
- B. 肾上腺素、去甲肾上腺素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/207146153042006055>