

2023-2024 年安徽省霍山县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库大全（综合题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，38 岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力 2 日；查体：神清、气稍促，心律 95bpm，律齐，体温 39.1℃，血压 110 / 70mmHg；心肺听诊：两肺呼吸音粗，未及明显啰音；发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

- A: 右美沙芬
- B: 苯丙哌林
- C: 氨溴索
- D: 可待因

答案：A

2. 糖尿病合并肾病者首选

- A: 二甲双胍
- B: 比格列酮
- C: 格列喹酮
- D: 阿卡波糖

答案：C

3. 患者，男 50 岁，血压 170/95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是：

- A: 利尿剂+CCB
- B: β 受体阻滞剂+ARB

C: 利尿剂+AR

D: A 受体阻滞剂+ACEI

答案：A

4. 易引起心动过缓的药物是

A: 紫杉醇

B: 阿霉素

C: 氟尿嘧啶

D: 环磷酰胺

答案：A

5. 下列用于治疗咳嗽的药物中，属于祛痰剂的是

A: 右美沙芬

B: 氨溴索

C: 羧甲司坦

D: 可待因

答案：B

6. 在配制静脉输液时，不宜用葡萄糖注射液溶解的药品是

A: 盐酸万古霉素

B: 青霉素

C: 两性霉素 B

D: 维生素 K

答案：B

7. ADR 与用药时间相关性不密切，反应表现与已知该药 ADR 不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现；可评价为

A: 待评价

B: 很可能

C: 可能无关

D: 可能

答案: C

8. (2016 年真题) 患者，男，58 岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀 40mgqd，患者用药期间应定期监测的生化指标是 ()。

A: Hb

B: RBC

C: ALT

D: BUN

答案: C

9. 特异体质者应当慎用解热镇痛药，其机制是用药后可能发生

A: 过敏反应

B: 虚脱

C: 惊厥

D: 出血

答案: A

10. 起效快，可迅速缓解急性哮喘发作和支气管平滑肌痉挛的药品是

A: 布地奈德

B: 沙丁胺醇

C: 羧甲司坦

D: 扎鲁司特

答案: B

11. (治疗骨质疏松药的应用注意事项)，妊娠期使用过量可导致胎儿畸形、甲状旁腺功能抑制而使新生儿长期低血钙抽搐，应慎用的是

- A: 氟制剂
- B: 钙制剂
- C: 甲状旁腺激素
- D: 维生素

答案：D

12. 延缓或降低抗药性的联合用药是

- A: 普萘洛尔联用硝苯地平降血压
- B: 硫酸阿托品联用吗啡
- C: 磷霉素联用其他抗菌药物
- D: 头孢哌酮 / 舒巴坦复方制剂

答案：C

13. 痛风急性发作期不宜服用，以防发生转移性痛风发作的是

- A: 苯溴马隆
- B: 秋水仙碱
- C: 泼尼松
- D: 别嘌醇

答案：A

14. (2018 年真题) 患者,女,34 岁,因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊,化验结果显示 TSH 增高 FT3、FT4 减低,临床诊断为甲状腺功能减退使用左甲状腺素钠 100 μ gqd 治疗。药师对该患者的用药指导,正确的是 ()

- A: 早餐后半小时,顿服
- B: 早餐前半小时,顿服

C: 晚餐后顿服

D: 睡前顿服

答案: B

15. 咳嗽变异性哮喘可选用的药物是

A: 沙丁胺醇

B: 沙美特罗+氟替卡松

C: 倍氯米松

D: 异丙托溴铵

答案: B

16. 以下药物中，不属于 WHO 划定的一线抗结核药物的是()

A: 吡嗪酰胺(Z)

B: 链霉素(S)

C: 利福平(R)

D: 异烟肼(H)

答案: B

17. 多柔比星的通用名是

A: 无环鸟苷片

B: 克毒星

C: 病毒唑

D: 阿霉素

答案: D

18. 患者，女性，62岁，自述近日常有一过性黑矇，雾视、视野中有黑点，一侧面部无力、麻木。医师诊断为短暂性脑缺血。

A: 巴曲酶

B: 氯吡格雷

C: 肝素

D: 华法林

答案: B

19. 能早期发现患者伤害、尽快地采取干预措施的是

A: 岗位工作问责

B: 直接观察

C: 计算机检测方法

D: 病历审查

答案: C

20. 不宜采用放射性 ^{131}I 治疗的甲亢患者是

A: 老年甲亢患者

B: 妊娠期、哺乳期女性甲亢患者

C: 成人 Graves 甲亢伴甲状腺 II 度以上肿大患者

D: 甲亢合并白细胞和（或）血小板减少或全血细胞减少患者

答案: B

21. 解救毒物引起严重腹泻者（）

A: 禁止洗胃

B: 不能催吐

C: 不能用强利尿剂

D: 不能导泻

答案: D

22. 下列药品中，不需要避潮湿贮存的是

A: 奥美拉唑肠溶片

- B: 布洛芬颗粒剂
- C: 维生素 C 片剂
- D: 维生素 C 注射液

答案: D

23. 杨某，男性，25 岁，间断上腹痛 2 年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

- A: 奥美拉唑?
- B: 碳酸氢钠?
- C: 氯化氢?
- D: 克拉霉素?

答案: C

24. 柔道运动员使用后，可在短时间内急速降低体重，因此按兴奋剂管理的药物是

- A: 依那普利
- B: 阿替洛尔
- C: 利血平
- D: 氢氯噻嗪

答案: D

25. 主要用于抗病毒的药物是

- A: 阿糖胞苷
- B: 阿糖腺苷
- C: 氟尿嘧啶
- D: 氟胞嘧啶

答案: B

26. 须在凉暗处保存的常用药品是

- A: 硫酸阿托品
- B: 复方甘草合剂
- C: 双歧三联活菌制剂
- D: 多巴胺

答案：B

27. 关于 II 期临床试验的正确说法是

- A: 试验样本数多发病不少于 300 例，其中主要病种不少于 50 例
- B: 试验样本数多发病不少于 300 例，其中主要病种不少于 100 例
- C: 试验样本数多发病不少于 300 例，其中主要病种不少于 200 例
- D: 试验样本数多发病不少于 500 例，其中主要病种不少于 100 例

答案：B

28. 患者，男，72 岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热 1 天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88 次 / 分，R22 次 / 分，BP112 / 77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。

- A: 苯海拉明
- B: 美司钠
- C: 维生素 B6
- D: 右雷佐生

答案：A

29. 可用于香豆素类杀鼠药中毒药物是

- A: 碘解磷定
- B: 亚硝酸钠

C: 乙酰胺

D: 维生素 K1

答案: D

30. 严重的先兆子痫首选

A: 硝苯地平?

B: 呋塞米?

C: 赖诺普利?

D: 硫酸镁?

答案: D

31. 可帮助人短时间内急速降低体重

A: 利尿剂

B: 蛋白同化制剂

C: 肽激素类

D: 麻醉药品

答案: A

32. 细菌性痢疾可出现()。

A: 脓血便

B: 脓状便

C: 稀糊便

D: 鲜血便

答案: A

33. 下列药物中，有效治疗浓度范围与中毒浓度范围相接近的是

A: 四环素

B: 阿托品

C: 地高辛

D: 氯噻嗪

答案: C

34. 用药咨询是药师应用所掌握的药学知识和药品信息，承接公众对药物治疗和合理用药的咨询服务，对临床合理用药有关键性作用。根据药物咨询对象的不同，可以将其分为患者、医师、护士和公众的用药咨询。

A: 阿昔洛韦可致急性肾衰竭

B: 地高辛用于肾功不全患者

C: 替加色罗存在心绞痛风险

D: 利巴韦林可致畸与肿瘤

答案: B

35. (消化性溃疡病的治疗)，除中和胃酸外，尚具有黏膜保护作用

A: 硫酸镁

B: 溴丙胺太林

C: 奥美拉唑

D: 硫糖铝

答案: D

36. (2019 年真题) 患者，男，68 岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天入院。查体: 体温 39.1℃，血压 138/80mmHg，心率 102 次/分，呼吸 32 次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果: 白细胞计数 $11.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断: 社区获得性肺炎。

A: 当体温正常 48~72h，且达到肺炎临床稳定标准后，可停用抗菌药物

- B: 在病原学送检后，可立即实施经验性抗菌治疗
- C: 病情稳定后可从静脉给药转为口服序贯治疗
- D: 抗菌药物应持续用至胸片 X 线病灶完全吸收

答案：D

37. 布噻嗪属于

- A: 血管扩张药
- B: 利尿剂
- C: 抗组胺药
- D: 镇痛药

答案：B

38. 可导致体重增加的抗焦虑药物为（）

- A: 米氮平
- B: 氟西汀
- C: 文拉法辛
- D: 舍曲林

答案：A

39. 非药物治疗慢性阻塞性肺病的主要措施是

- A: 戒烟
- B: 减少体重
- C: 户外锻炼
- D: 咳嗽

答案：A

40. 可能增加严重心血管疾病风险，减肥治疗的风险大于获益，已于 2010 年 10 月在我国停止生产、销售和使用的减重药是

- A: 西布曲明
- B: 安非拉酮
- C: 芬特明
- D: 奥利司他

答案：A

41. 主要降低 TG 兼降低 TC 的药物首选

- A: 阿昔莫司
- B: 氟伐他汀
- C: 考来烯胺
- D: 氯贝丁酯

答案：D

42. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是

- A: 当单药治疗无效时，可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药
- B: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判定疗效
- C: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗
- D: 剂量递增，尽可能采用最小有效剂量，使不良反应减至最小

答案：B

43. 老年增龄导致机体内环境改变，肝肾功能下降，药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄及药效发生一系列变化，一些药物的治疗剂量与中毒剂量更加接近，药物的不良反应发生率增高。

- A: 维生素 B
- B: 阿司匹林
- C: 苯巴比妥
- D: 磺胺异噁唑

答案：A

44. 属于芳香氨酶抑制剂的抗肿瘤药是

- A: 丙酸睾酮
- B: 炔雌醇
- C: 他莫昔芬
- D: 阿那曲唑

答案: D

45. 患者女 27 岁确诊慢性乙型肝炎 3 年，近日化验结果:HBV-DNA 2×10^5 opies/ml,ALT122U/L. 拟予以病毒治疗首选的药物是()

- A: 阿糖腺苷
- B: 恩替卡韦
- C: 泛昔洛韦
- D: 利巴韦林

答案: B

46. 酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之对中枢神经出现抑制，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加发生不良反应的几率。

- A: 庆大霉素
- B: 依替米星
- C: 呋喃唑酮
- D: 克林霉素

答案: C

47. 有较强刺激性服药时不可嚼碎的泻药是()

- A: 硫酸镁

B: 比沙可啶

C: 干酵母

D: 双歧杆菌

答案: B

48. (2018 年真题) 患者，男，80 岁，患有高血压、2 型糖尿病、前列腺增生，近日出现暂时性尿失禁症状，怀疑与其服用的药物有关。复核其使用的药物，可能造成其尿失禁的药物是 ()

A: 珍菊降压片 (含氢氯噻嗪)

B: 二甲双胍

C: 非那雄胺

D: 依那普利

答案: A

49. 需要在服药时多饮水的药物不包括

A: 氨基糖苷类抗生素

B: 抗痛风药

C: 平喘药

D: 降糖药

答案: D

50. 关于该患者的治疗方案错误的是 ()

A: 病情稳定后可从静脉给药转为口服序贯治疗

B: 当体温正常 48~72h, 且达到肺炎临床稳定标准后, 可停用抗菌药物

C: 在病原学送检后, 可立即实施经验性抗菌治疗

D: 抗菌药物应持续用至胸片 X 线病灶完全吸收

答案: D

51. 避免与辛伐他汀合用的药物是（）

- A: 万古霉素
- B: 头孢哌酮
- C: 美罗培南
- D: 克拉霉素

答案：D

52. （2018 年真题）患者，男，60 岁，因上臂出现湿疹到药店购药，药师应推荐的药品是（）

- A: 氢化可的松软膏
- B: 10%樟脑软膏
- C: 特比萘芬乳膏
- D: 利巴韦林软膏

答案：A

53. 患者，女，31 岁，1 个月前顺一健康男婴。近 2 周出现心境低落、乏力纳差、失眠焦虑，有自杀倾向，无法哺乳。诊断为产后抑郁症，给予氟西汀片 20mgqd。关于该患者用药教育的说法，错误的是（）

- A: 为尽快恢复哺乳，患者应在症状改善 1 个月后逐渐减量，直至停药
- B: 应足量和足疗程用药，疗效不佳可考虑换药
- C: 氟西汀应于每日早餐后服用
- D: 向患者解释“剂量滴定原则”，提示其用药剂量可能需要逐渐增加

答案：A

54. 美金刚的作用机制为（）

- A: 抑制 N-甲基天冬氨酸受体
- B: 脑循环改善剂
- C: 抑制胆碱酯酶

D: 钙通道阻滞剂

答案：A

55. 下列药品通用名与别名的组合中，不属于同一种药品的是

A: 氯己定与洗必泰

B: 利可君与利血生

C: 氨甲苯酸与止血敏

D: 桂利嗪与脑益嗪

答案：C

56. 归属于药历“患者基本情况”内容的是

A: 临床诊断

B: 主要实验室检查数据

C: 医保和费用支付情况

D: 联合用药

答案：C

57. 控制被经济利益驱动的过度药物治疗体现

A: 规范性

B: 经济性

C: 有效性

D: 安全性

答案：B

58. 可使驾驶员视物模糊或辨色困难的药物是

A: 阿托品

B: 苯噻啶

C: 西咪替丁

D: 氨苯蝶啶

答案: A

59. 需 2~10℃ 冷处保存，并避免冻结的药品

A: 利福平片

B: 胰酶片

C: 脂肪乳

D: 低精蛋白胰岛素注射剂

答案: D

60. 患者，男，48 岁，患有青光眼 3 年。今日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗，应告知该患者用药后需漱口的药物是
()

A: 孟鲁斯特纳咀嚼片

B: 多索茶碱注射液

C: 沙丁胺醇气雾剂

D: 布地奈德混悬液

答案: D

61. 癌症患者采用伊立替康化疗后出现水样腹泻时，应立即给予

A: 双歧杆菌

B: 小檗碱

C: 洛哌丁胺

D: 昂丹司琼

答案: C

62. 药师沟通技能不包含

A: 介绍自己

- B: 观察评估
- C: 认真倾听
- D: 应用医学术语

答案：D

63. (2015 年真题) 痛风急性发作期应禁用的药物 ()。

- A: 布洛芬
- B: 碳酸氢钠
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

答案：D

64. 变异型心绞痛发作应首选的药物是

- A: 硝酸甘油
- B: 美托洛尔
- C: 氨氯地平
- D: 单硝酸异山梨酯

答案：C

65. 药师发药时提示患者“用药期间禁止饮酒或含酒精饮料”，针对的药物是

- A: 氟西汀
- B: 铋制剂
- C: 卡托普利
- D: 氯苯那敏

答案：A

66. 长期大剂量应用头孢哌酮治疗慢性感染，需要监测的临床指标是

- A: 血压
- B: 血糖
- C: 血脂
- D: 凝血功能

答案：D

67. 急性铅中毒出现

- A: 恶心、呕吐、视力模糊
- B: 肌肉震颤、抽搐
- C: 腐蚀性口腔炎
- D: 恶心、呕吐、口内有金属味

答案：D

68. (用药导致的血常规异常) 甲基多巴

- A: 中性粒细胞减少
- B: 嗜酸性粒细胞减少
- C: 血小板减少
- D: 血红蛋白量增多

答案：B

69. (抗癫痫药物的选择)，癫痫全身强直阵挛发作的一线用药是

- A: 扑米酮
- B: 乙琥胺
- C: 卡马西平
- D: 加巴喷丁

答案：C

70. 不宜与葡萄柚汁合用的药物是

- A: 硫酸亚铁
- B: 左旋多巴
- C: 辛伐他汀
- D: 磺胺类药物

答案：C

71. 阿片类中毒出现呼吸抑制时给予

- A: 地西泮
- B: 阿托品
- C: 有机硫类
- D: 间羟胺

答案：B

72. 融合抑制剂

- A: 利托那韦
- B: 齐多夫定
- C: 利巴韦林
- D: 依非韦伦

答案：C

73. 患者，女，58岁，有2型糖尿病病史，因头疼、头晕就诊。体征和实验室检查：餐前血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 8.8%，血压 166/96mmHg，蛋白尿>1g/24h。推荐在降糖的基础上合并选用

- A: 氢氯塞嗪
- B: 赖诺普利
- C: 特拉唑嗪
- D: 二甲双胍

答案：B

74. 下列关于肾功能不全患者给药方案调整方法，错误的是：

- A: 肾功能不全者首选肝胆代谢和排泄的药物
- B: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以同时服用碳酸氢钠来碱化尿液，以促进药物排泄，防止药源性疾病
- C: 肾功能不全而肝功能正常者，可选用双通道(肝肾)消除的药物
- D: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以延长给药间隔或减少给药剂量

答案：B

75. 患者，男，体检发现血清尿素氮升高，血肌酐升高，其他生化指标，该患者最可能患有：

- A: 肾脏疾病
- B: 心脏疾病
- C: 肝脏疾病
- D: 血液疾病

答案：A

76. 使患者可清晰看到咨询药师的是

- A: 环境舒适
- B: 位置标志明确
- C: 配备必备设备
- D: 适当隐秘

答案：B

77. 流行性出血性结膜炎可选用

- A: 0.1%羟苄唑滴眼剂

B: 四环素眼膏

C: 2%色甘酸钠滴眼剂

D: 0.1%碘苷滴眼剂

答案：A

78. 连续应用抗菌药物 / 糖皮质激素眼用制剂的时间不宜超过

A: 5 天

B: 7 天

C: 3 天

D: 10 天

答案：D

79. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体检面色较苍白。血红蛋白 80g / L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 $300 \mu g / L$ 。

A: 再生障碍性贫血

B: 溶血性贫血

C: 巨幼细胞性贫血

D: 缺铁性贫血

答案：D

80. 需要适当增加苯妥英、苯巴比妥的给药剂量，是由于

A: 血容量增加使血浆白蛋白浓度降低

B: 激素分泌改变，药物代谢也受影响

C: 胃肠活动减弱，使吸收减慢

D: 妊娠晚期血流动力学发生改变

答案：B

81. 患者，男，33 岁。中度哮喘急性发作，宜选用的药物是

- A: 短效 β_2 受体激动剂
- B: 糖皮质激素
- C: 白三烯受体阻断剂
- D: β_2 受体阻断剂

答案：A

82. 以下不同群中，白细胞计数正常值参考范围的数值最高的是

- A: 成人女性
- B: 儿童
- C: 成人男性
- D: 新生儿

答案：D

83. 饮酒可使其吸收明显减少的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 利血平
- C: 维生素 B₁、维生素 B₂
- D: 卡马西平

答案：C

84. 心力衰竭的常用药方案是

- A: 醛固酮受体阻断剂+ α 受体阻断剂+钙通道阻滞剂
- B: 醛固酮受体阻断剂+ α 受体阻断剂+B 受体阻断剂
- C: 醛固酮受体阻断剂+ β 受体阻断剂+强心苷类
- D: 醛固酮受体阻断剂+ β 受体阻断剂+ACEI

答案：D

85. 患者，女，35 岁，部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫病情控制不佳，提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊。患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

- A: 牙龈增生
- B: 视物模糊
- C: 低血糖
- D: 共济失调

答案：C

86. (2017 年真题) 与葡萄柚汁同服可能升高血药浓度的药物是 ()

- A: 左旋多巴片
- B: 维 A 酸片
- C: 非洛地平片
- D: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊

答案：C

87. 下列可增强华法林抗凝作用的药物是

- A: 维生素 K
- B: 阿司匹林
- C: 雌激素
- D: 苯巴比妥

答案：B

88. 常用的抗肿瘤药给药途径有: 动脉、静脉、肌内、腔内、口服五种途径用于某些晚期不宜手术或复发的局限性肿瘤

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/208004034133007022>