

---

(完整) 临床医师定期考核试题中医知识题库及答案(通用版)

一、单选题(在每小题列出的四个选项中, 只有一个最符合题目要求的选项)

1. 治疗癭病气郁痰阻证, 宜用何法

A、疏肝理气, 消痰祛瘀

B、理气舒郁, 化痰消癭

C、理气活血, 化痰消癭

D、化痰散结, 活血化瘀

E、活血化瘀, 祛痰消癭

准答案:b

2. 情志失调而导致的癭病主要与何脏腑关系密切

A、肝 B、肾 C、心 D、肺 E、脾

标准答案:a

3. 下列哪项不是中风的主症

A、卒然昏仆, 不省人事 B、口眼歪斜 C、语言不利 D、半身不遂 E、醒后如常人

标准答案:e

4. 下列哪项不是辨别中风闭证与脱证的依据:

A、口开目合与口噤不开 B、手撒肢冷与两手握固

---

C、二便自遗与大小便闭

D、躁动不安与静而不烦E、肢体软瘫与肢体强痉

标准答案：d

5. 关于眩晕的论述不正确的是

A、眩即眼花，晕即头晕B、重者如坐车船C、轻者闭目即止D、甚则昏倒

E、本病实证为多

标准答案：e

6. 眩晕病机颇为复杂，归纳起来不外下列哪四个方面，

A、痰、火、风、瘀B、风、痰、湿、瘀

C、风、痰、瘀、虚D、痰、湿、虚、瘀E、

风、火、痰、虚

标准答案：e

7. 治疗肺癆气阴耗伤证应首选的方药是

A、保真汤B、月华丸C、秦艽鳖甲散D、百合固金汤E、补天大造丸

标准答案：b

8. 内伤头痛的诊断要点，下列哪个是错误的

A、痛势不急迫B、起病较缓C、痛无休止D、多表现为隐痛、空痛、昏痛

E、劳累痛甚标准答案：c

---

9. 少阳头痛可选用下列哪组引经药,

A、黄芩、蔓荆子、川芎 B、柴胡、川芎、黄芩 C、吴茱萸、藁木、钩藤 D、葛根、白芷、柴胡

E、羌活、川芎、柴胡 标准答案:b

10. 鼓胀的主症是

A、全身水肿 B、单腹胀大 C、四肢水肿 D、头面水肿 E、眼睑浮肿 标准答案:b

11. 下列除哪项外, 均为鼓胀后期的常见并发症

A、吐血 B、黄疸 C、昏迷 D、水肿 E、中风 标准答案:e

12. 积聚的病位主要在

A、脾胃心 B、肺肝脾肾 C、肝脾胃肠 D、肺肝肾 E、心脾肾 标准答案:c

13. 下列哪项对鉴别积和聚无意义

A、积病在血分, 聚病在气分 B、积属脏病, 聚属腑病 C、积的病程长, 聚的病程短

D、积的病位在大腹, 聚的病位在小腹 E、积处固定不移, 聚处聚散无常 标准答案:d

14. 黄疸的辨证, 当以何为纲

A、肝胆 B、气血 C、虚实 D、表里 E、阴阳 标准答案:e

15. “黄家所得, 从湿得之”, 是哪一本书最早提出来的,

A、《诸病源候论》 B、《景岳全书》 C、《金匱要略》 D、《医学心悟》

E、《张氏医通》 标准答案:c

---

16. 治疗痢疾湿热痢宜首选

A、白头翁汤B、不换金正气散C、芍药汤D、黄连阿胶汤E、连理汤标准

答案:c

17. 胁痛病变所涉及的脏腑, 最重要的是

A、脾B、胃C、肝D、肺E、胆标准答案:c

18. 实热便秘的治法宜

A、顺气通便B、清热润肠C、养血润肠D、益气润肠E、增液通便标准答

案:b

19. 以下哪项不是便秘的主要病因病机,

A、阳虚体弱, 阴寒内生B、情志失和, 气机郁滞C、肺气不宣, 气化不  
行D、气血不足, 下元亏损

E、素体阳盛, 肠胃积热标准答案:d

20. 痢疾初起, 用药当忌 A、 疏散表邪之品B、 调气行血之品C、

收敛止泻之品D、 清热凉血之品E、 理气化滞之品标准答案:c

21.

肾病综合征大量蛋白尿, 检测24小时尿蛋白定量, 其定量标准是应?( )

A、50mg/kgB、60mg/kgC、70mg/kg

D、75mg/kgE、90mg/kg标准答案:a

22.

小儿肺炎喘嗽, 症见壮热不退, 咳嗽剧烈, 气喘鼻煽, 口唇紫疳, 喉中  
痰鸣, 烦躁不安, 两肋煽动, 摇身撷肚, 舌红少津, 苔黄燥, 脉洪大。

属于下列哪个证型

---

A、风热郁肺B、痰热闭肺C、毒热闭肺D、心阳虚衰E、阴虚肺热标准答案:b

23. 治疗小儿脾胃气虚型厌食首选的方剂是

A、不换金正气散B、异功散加味C、养胃增液汤D、香砂养胃丸E、保和丸标准答案:b

24. 小儿脾肾阳虚型泄泻的治法是

A、健脾温阳助运止泻B、健脾益气酸甘敛阴C、补肾滋阴平肝降火D、温补脾肾固涩止泻

E、挽阴回阳救逆固脱标准答案:d

25. 6个月-3岁小儿贫血最常见的是

A、生理性贫血B、溶血性贫血C、感染性贫血D、营养性巨幼细胞性贫血

E、营养性缺铁性贫血标准答案:e

26. 小儿口疮虚火上炎型的治则是

A、清心凉血泻火解毒B、活血化瘀利湿清热C、疏风散火清热解毒D、滋阴降火引火归元

E、温中益气养阴泄热标准答案:d

27. 下列各项中,属于过敏性紫癜皮疹特点的是

A、皮疹压之退色B、皮肤瘙痒明显C、皮疹常不对称分布D、多见下肢伸侧及臀部

E、多见于头面及胸腹部标准答案:d

28. 小儿风热咳嗽治疗首选方剂是

A、泻白散B、银翘散C、桑菊饮D、清宁散E、导痰汤标准答案:c

---

29. 痞证的病位主要在

A、五脏 B、肝脾 C、脾肾 D、脾胃 E、心肝 标准答案:d

30. 小儿腹痛气滞血瘀型的临床特点是

A、疼痛腹胀大便秘结 B、脘腹胀满泻后痛减 C、痛处喜暖得温则舒 D、腹痛绵绵时作时止

E、痛有定处痛如锥刺 标准答案:e

31. 下列哪项不属小儿多发性抽动症的临床特征

A、多发性运动肌快速抽搐 B、抽动同时伴有不自主发声 C、抽动不能受意志控制

D、病症可自行缓解或加重 E、智力正常 标准答案:c

32. 下列哪项不属小儿注意力缺陷多动障碍的临床特征

A、情绪不稳 B、冲动任

性 C、智力低下 D、冲动任性 E、注意力不集中 标准答案:c

33. 病毒性心肌炎并发心力衰竭，至少应卧床休息的时间是

A、1个月 B、1, 3个月 C、3, 6个月 D、6, 12个月

E、1年以上 标准答案:c

34. 小儿遗尿多与肾和膀胱功能失调有关，临床尤以下列哪型最为多见

A、肾气不固下元虚寒 B、肺脾气虚水道失约 C、心肾失交水火不济

D、肝经郁热疏泄失司 E、脾肾气虚下元不固 标准答案:a

35. 疔腮热毒壅盛证，宜选用的方剂是

A、柴胡葛根汤 B、普济消毒饮 C、清瘟败毒饮 D、仙方活命散 E、犀角地黄汤 标准答案:b

---

36. 下列哪项不属皮肤黏膜淋巴结综合征临床特征

A、持续发热体温39?以上B、口腔黏膜疱疹、溃疡C、颈淋巴结急性肿大  
D、多形红斑

E、手足硬性水肿标准答案:b

37. 小儿夜啼心经积热型治疗的首选方剂是

A、远志丸加减B、匀气散加减C、导赤散加减D、安神丸加减E、乌药散  
加减标准答案:c

38. 下列哪项不属引起癫痫的主要病因病机

A、顽痰内伏B、暴受惊恐C、感受外邪D、惊风频发E、外伤血瘀标准答  
案:c

39. 慢惊风脾肾阳衰型的治法是 A、温中健脾缓肝理脾

B、温补脾肾回阳救逆C、育阴潜阳滋肾养肝D、补气益血柔肝熄风

E、补益肝肾滋阴熄风标准答案:b

40.

小儿不思饮食，嗳腐酸馊，伴口臭、便秘、腹胀，手足心热，舌红，苔  
厚腻。脉弦滑，指纹紫滞。提示中医病证是 A、乳食内积B、寒湿内停

C、湿热内蕴D、心脾火炽E、脾虚失运标准答案:a

41.

女患者，结婚4年未孕，形体肥胖，月经40,60天一行，面色晄白，头晕  
心悸，胸闷。苔白腻，脉滑。治疗应首选的方剂是 A、苍附导痰丸

B、二陈汤C、开郁种玉汤D、二妙丸E、毓麟珠标准答案:a

---

42.

女患者，产后29天，恶露仍量较多，色深红，质粘稠有臭味，面色潮红，口燥咽干。舌质红，脉虚细而数。治疗应首选的方剂是 A、生化汤

B、五味消毒饮C、保阴煎D、丹桅逍遥散E、大黄牡丹皮汤标准答案:c

43.

女患者24岁，产后7天，持续高热，小腹疼痛剧烈、拒按，恶露秽臭如脓，烦渴引饮，大便燥结，舌紫黯，苔黄而干，脉弦数。治疗应首选的方剂是 A、五味消毒饮 B、

大黄牡丹皮汤C、解毒活血汤D、银翘败酱解毒汤E、两地汤标准答案:b

44.

女患者，产后小腹隐隐作痛，喜按，恶露量少色淡，头晕耳鸣，心悸怔忡，大便干燥，舌淡红，苔薄，脉细弱。治疗应首选的方剂是

A、四物汤

B、肠宁汤C、加参生化汤D、当归芍药散E、生化汤标准答案:b

45.

一新产妇，胎儿娩出后，失血甚多，突然头晕眼花，面色苍白，自觉心胸满闷，恶心欲吐，继之不省人事，冷汗淋漓，舌淡，苔少，脉微欲绝。其治法应是

A、滋阴养血B、养血活血C、补气摄血D、柔肝熄风E、益气固脱标准答案:e

46.

女患者，月经后期量少，渐至闭经，头晕耳鸣，腰痠腿软，小便频数，舌淡黯，苔薄白，脉沉细。治疗应首选的方剂是

A、大补元煎B、固阴煎C、调肝汤



---

D、加减苁蓉菟丝子丸E、当归地黄饮标准答案:d

47.

女患者，19岁，未婚，经期涉水，此后经期1,3天下腹冷痛，拒按，得热痛减，月经量中，色黯，有瘀血块，伴有面色苍白，肢冷畏寒，舌黯苔白，脉沉紧。治疗应首选的方剂是

A、A 益肾调经汤B、 圣愈汤C、 少腹逐瘀汤D、 膈下逐瘀汤E、  
清热调血汤标准答案:c

48.

女患者35岁，月经经期周期严重紊乱，月经色淡，量多，现出血18天未止，伴乏力困倦，气短，大便溏。治疗首选方的药物组成是 A、党参 黄芪 白术 当归 生地 黑姜B、人参 黄芪 白术 当归 熟地 黑姜C、人参 黄芪 升麻 当归 熟地 黑荆芥D、党参 黄芪 白术 当归 炙甘草 木香 砂仁

E、党参 黄芪 升麻 当归 熟地 生姜标准答案:b

49.

患者，女，妊娠早期，恶心，呕吐酸水，恶闻油腻，口干口苦，胸满胁痛，暖气叹息，舌质淡，苔微黄。治疗应首选的方剂是 A、橘皮竹茹汤

B、小半夏加茯苓汤C、旋覆代赭汤D、青竹茹汤E、加味温胆汤标准答案:a

50.

患者，女，33岁，产后乳房柔软，乳汁稀薄、量少，面色少华，倦怠乏力，舌淡，苔薄白，脉细弱。其主要病因病机是

A、脾虚生痰，痰阻乳络

---

B、肝气不舒，乳络受阻C、气血虚弱，乳汁化源不足D、劳倦伤脾，行乳无力E、肾气亏损，不能上荣标准答案：c

51.

患者，女，36岁，务农。因产后即下地耕种，近半年来下腹坠胀，有块状物脱出于阴道口，休息后不能完全回纳，面色无华，四肢乏力，舌淡苔薄，脉缓弱。妇科检查：屏气下宫颈已脱出阴道口，子宫大小正常。

A、补气升提B、补肾固脱C、清热利湿D、滋阴养血E、补气养血标准答案：a

52.

50岁女性，月经稀少，色鲜红，常有头面烘热汗出，五心烦热，腰膝酸疼，足跟疼痛，头晕目眩，口干便结，舌红，少苔，脉细数。应首选的方剂是

A、六味地黄丸B、杞菊地黄丸C、左归丸合二至丸D、百合地黄汤合甘麦大枣汤E、加减一阴煎合四物汤标准答案：c

53.

患者近1月带下量多，质稀薄如涕，绵绵不断，伴四肢浮肿，脘肋不舒。舌淡胖，苔白，脉细。治疗应首选的方剂是

A、参苓白术丸B、内补丸 C、右归丸D、完带汤E、止带方标准答案：d

54.

女患者35岁，月经周期严重紊乱，带经时间延长，月经色淡，量多，现出血16天，量多，乏力困倦，大便溏，舌淡胖，苔薄白，脉沉弱。治疗首选方的药物组成是

A、党参 黄芪 白术 当归 生地 黑姜B、人参 黄芪 白术 当归 熟地 黑姜C、人参 黄芪 升麻 当归 熟地 黑荆芥D、党参 黄芪 白术

---

当归 炙甘草 木香 砂仁E、党参 黄芪 升麻 当归 熟地  
生姜标准答案:b

55.

女患者，孕50天，阴道少量出血，色淡红，质稀，小腹空坠而痛，心悸气短，神疲肢倦，舌淡，苔薄白，脉细弱。孕4产0，自然流产3次。治疗应首选的方剂是

A、泰山磐石散B、胎元饮C、寿胎丸D、八珍汤E、归肾丸标准答案:a

56.

女患者月经周期先后不定，经量少，色淡暗，质清，腰酸耳鸣，舌淡、苔白，脉细弱。治疗应首选的方剂是 A、逍遥散 B、右归丸C、定经汤

D、安冲汤E、固阴煎标准答案:e

57.

女性，32岁，已婚，月经周期正常，但经期延长达9,10天。于月经来潮第5天行诊断性刮宫术，病理报告为“增生期子宫内膜，部分呈分泌反应”。其诊断应属

A、黄体功能不全B、子宫内膜不规则脱落C、  
粘膜下子宫肌瘤D、无排卵性功能失调性子宫出血E、子宫内膜息肉标准  
答案:b

58.

女性，45岁，近2年来月经不规律，出血16天未净，妇科检查未见明显异常。拟诊为围绝经期功能失调性子宫出血。其治疗目的与青春期功能失调性子宫出血不同的是：

---

A、止血B、调整月经周期C、减少月经量D、恢复排卵功能E、  
改善全身情况标准答案:d

59.

女性，30岁，已婚，主诉下腹痛2天，检查：T38.5°，下腹部轻度肌紧张，子宫正常大小，有压痛，双附件明显增厚、压痛，白细胞计数 $12 \times 10^9/L$ ，中性90%。对于该患者，下列措施，错误的是

A、卧床休息B、禁止性生活C、抗生素治疗D、  
阴道冲洗E、中药治疗标准答案:d

60.

女性，35岁，已婚，近3天出现白带增多，外阴奇痒，检查见阴道内见凝乳样分泌物，阴道壁可见白色伪膜样物。其最可能的诊断是

A、滴虫性阴道炎 B、  
念珠菌性阴道炎C、阿米巴性阴道炎D、淋菌感染E、  
细菌性阴道炎标准答案:b

61. 发生严重人工流产综合征后应立即给予的治疗是： A、吸氧B、  
抗过敏药C、静脉注射阿托品D、扩血管药E、输血标准答案:c

62. 避孕方法中，效果最不可靠的是 A、宫内节育器B、  
口服长效避孕药C、体外排精D、避孕套E、口服短效避孕药标准答案:c

63. 下列各项，与阴道自净作用无关的是

A、雌激素B、阴道内乳酸杆菌C、阴道粘膜上皮糖原含量D、宫颈粘膜E、  
阴道PH值标准答案:d

64. 下列各项，对已破损期异位妊娠最具诊断意义的是

A、有停经史B、下腹疼痛剧烈C、尿妊娠试验阳性D、血色素下降

---

E、后穹窿穿刺抽出不凝血标准答案:e

65. 下列各项, 不属癥瘕痰湿瘀结证主要证候的是

A、小腹内可触及包块B、积块不坚C、固定难移D、带下量多E、小腹胀满  
标准答案:e

66. 二仙汤是治疗绝经前后诸证的证型是

A、肾阴虚证B、肾阳虚证C、肾阴阳两虚证D、脾肾两虚证E、肝肾阴虚证  
标准答案:c

67. 下列药物, 不属少腹逐瘀汤药物组成的是

A、小茴香、干姜B、元胡、没药C、当归、川芎D、附子、艾叶E、蒲黄、五灵脂  
标准答案:d

68.

人参养荣汤治疗闭经的证型是A、阴虚血燥证B、气血虚弱证C、痰湿阻滞证D、气滞血瘀证E、肾气亏损证  
标准答案:b

69.

下列不属崩漏急症“塞流”止崩常用方法的是A、局部按摩止血B、温阳止崩C、滋阴固气止崩D、祛瘀止崩

E、补气摄血止崩  
标准答案:a

70. 治疗崩漏脾虚证的首选方剂是

A、八珍汤B、补中益气汤C、圣愈汤D、固阴煎E、固本止崩汤  
标准答案:e

71.

“治崩三法”是指A、止血、固脱、调经B、调经、固本、善后C、补肾、扶脾、调肝D、塞流、澄源、复旧

---

E、止血、养血、调经标准答案:d

72. 崩漏与其他月经失调性疾病鉴别的要点是 A、  
周期、经期、经色B、经质、经期、经量C、周期、经期、经量D、周期  
、经期、经质

E、周期、经色、经量标准答案:c

73. 举元煎的药物组成是

A、人参、黄芪、白术、当归、炙甘草B、人参、黄芪、白术、升麻、炙  
甘草C、人参、山药、白术、茯苓、炙甘草D、人参、黄芪、白术、升麻  
、白芍 E、熟地、黄芪、白术、山药、炙甘草标准答案:b

74.

月经过多血热证的经血特点是A、色深红，质稀B、色深红，质粘稠C、  
色淡红，质粘稠D、色淡黯，质稀

E、色鲜红，质稀标准答案:b

75. 定经汤用于治疗月经先后无定期的证型是

A、肾虚证B、肝郁肾虚证C、血热证D、肝郁证E、脾虚证标准答案:b

76. 当归地黄饮用于治疗月经后期的证型是

A、实寒证B、虚寒证C、血虚证D、肾虚证E、痰湿证标准答案:d

77. 两地汤的药物组成是 A、青蒿 黄柏 白芍 丹皮 茯苓 生地

B、生地 熟地 阿胶 玄参 白芍 麦冬 C、生地 地骨皮 青蒿 黄柏

白芍 茯苓 D、生地 地骨皮 阿胶 玄参 白芍 麦冬 E、黄芩 生地

地骨皮 白芍阿胶 麦冬标准答案:d

---

78. 治疗月经先期阳盛血热证的首选方剂是

A、两地汤 B、丹栀逍遥散 C、清经散 D、固阴煎 E、清热固经汤 标准答案:

c

79.

下列不属于月经病的是 A、身体无病，月经每2个月1行。 B、月经周期紊乱，或先或后 C、经行小腹冷痛拒按，月经量少。

D、经前乳房胀痛，不能触衣。 E、月经周期正常，带经时间10天 标准答案: a

80. 调经诸法中，首要的是 A、疏肝 B、

补肾 C、健脾 D、调治冲任 E、调理气血 标准答案: b

81.

患者，男性，50岁。突发剑突下持续剧痛半小时就诊。患者半小时前突发胸痛，伴呕吐、冷汗及濒死感。查体:体温36.5℃，Bp90/60mmHg，四肢湿冷，心率102次/分，律齐，两肺未及异常，腹软无压痛，肝脾未及。心电图:V3, V5导联T波抬高2.0mV，S, T抬高0.2mV。为明确诊断应首选的检查是 A、血常规 B、血沉 C、超声心动图 D、

肌钙蛋白测定 E、心脏监护 标准答

案: d

82.

患者，女性，20岁。反复出现皮肤瘀点，月经量多1年，查体:四肢散在出血点，心肺(-

)，肝脾不大。Hb90g/L，WBC $5.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $40 \times 10^9/L$ 。骨髓检查:全片巨核细胞50个，颗粒型巨核细胞占85%，血小板形成巨核少见。诊断应首先考虑的是

---

A、慢性白血病B、急性再生障碍性贫血C、慢性再生障碍性贫血D、过敏性紫癜E、特发性血小板减少性紫癜 标准答案:e

83.

患者，女性，16岁。2周前上呼吸道感染，近1周来出现尿少，眼睑、下肢浮肿。检查：血压140/100mmHg。血红蛋白120g/L，血肌酐140mmol/L。尿蛋白++，尿红细胞10~15个/高倍视野，可见红细胞管型。诊断应首先考虑的是

A、急性肾小球肾炎B、慢性肾小球肾炎急性发作C、急性肾盂肾炎D、急进性肾炎E、急性肾小管坏死 标准答案:a

84.

患者，男性30岁。头晕，头痛，恶心，呕吐1周，血压180/105mmHg，血红蛋白70g/L，尿蛋白(+++)，蜡样管型0~1/高倍视野，血肌酐660mmol/L。导致患者目前状况的原发病最可能是

A、高血压脑病B、急性肾小球肾炎C、慢性肾盂肾炎D、慢性肾小球肾炎E、肾动脉狭窄 标准答案:d

85.

患者，男性，40岁。头晕、浮肿、蛋白尿3年，近6月头晕头痛加重，血压升高，口服降压药物治疗效果差。查体：血压180/120mmHg，血红蛋白70g/L，

尿蛋白(++), 尿红细胞5~6/高倍视野，尿蛋白量2.5g/24h，眼底见动脉迂曲及絮状渗出。诊断应首先考虑的是

A、急进性高血压B、慢性肾炎普通型C、慢性肾炎肾病型D、慢性肾炎高血压型E、慢性肾炎急性发作型 标准答案:d



---

86.

患者，女，48岁。间歇上腹隐痛、饱胀不适6年。查体：心肺正常，上腹轻压痛，莫菲氏征(-)，肝脾未及。实验室检查：Hb110g/LWBC $5.0 \times 10^9$ /LPC110 $\times 10^9$ /L。胃镜示：胃窦粘膜苍白、变薄，可见粘膜下血管网。诊断应首先考虑的是

A、胃溃疡B、慢性浅表性胃炎C、慢性萎缩性胃炎D、慢性胆囊炎E、慢性胰腺炎标准答案：c

87.

患者，男性，58岁。冠心病史。6小时前出现难以忍受的胸闷、压榨感，伴心悸、上腹部疼痛，无呕吐及腹泻。含服硝酸甘油缓解后即刻就诊。查体：神清，BP130/80mmHg，心率98次/分，心尖部可闻及2/6级收缩期吹风样杂音，肺部无啰音。心电图：V1-V3导联ST段弓背向上抬高。诊断应首先考虑的是

A、急性下壁心肌梗塞B、急性前壁心肌梗塞C、急性前间壁心肌梗塞D、急性前侧壁心肌梗塞E、急性下侧壁心肌梗塞标准答案：c

88.

患者女性，气后突发心悸，伴胸闷、头晕、气短持续半小时就诊。查体：精神紧张，面色苍白，BP100/70mmHg，心率200次/分，律齐，未见心脏杂音。最可能的诊断是

A、心房扑动B、窦性心动过速C、阵发性室上性心动过速D、房室传导阻滞E、预激综合征标准答案：c

---

89.

患者，女性，38岁，心悸、气短半年入院。查体：呼吸20次/分，脉搏102次/分，Bp110/70mmHg，心界向左扩大，心率132次/分，律不齐，S1强弱不等，心尖区可闻及舒张期隆隆样杂音。诊断应首先考虑的是

A、二尖瓣狭窄，房颤 B、二尖瓣关闭不全，房颤 C、

二尖瓣狭窄，窦性心律不齐 D、二尖瓣关闭不全，窦性心律不齐 E、

二尖瓣脱垂症，房颤 标准答案：a

90.

患者，男性，69岁，咳嗽、咳血伴右侧胸痛一周入院。一周前患者无明显诱因出现咳嗽、咳痰，为痰中带血，伴右侧胸痛。查体：右锁骨上多个淋巴结肿大，质硬。右肺呼吸音较低，心率72次/分，律齐，无杂音，腹平软，肝脾未触及。X线：提示右侧肺门增大。诊断应首先考虑的是

A、肺结核 B、肺炎球菌肺炎 C、肺脓肿 D、肺癌 E、

支气管扩张 标准答案：d

91.

患者，男性，28岁，因高热，咳嗽，胸痛三天入院。三天前淋雨后出现高热，体温达39.2℃，畏寒，咳嗽，咳痰，伴右侧胸痛，咳嗽时加剧，无皮疹、咯血。查体：BP100/60mmHg，急性热病容，口角疱疹，右下肺叩诊呈浊音，可闻及支气管呼吸音。心率96次/分，律齐，无杂音。腹平软，无压痛，肝脾不大。诊断应首先考虑的是

A、真菌性肺炎 B、细菌性肺炎 C、肺脓肿 D、病毒性肺炎 E、

支原体肺炎 标准答案：b

92.

患者，男，33岁，因咳嗽、咯血、发热1月入院。1月前受凉后出现咳嗽

---

，痰中带血，午后发热，最高38<sup>o</sup>，夜间出汗，食欲差。在当地卫生院予静脉抗生素疗效欠佳，遂来就诊。既往体健，否认结核、肝炎病史。查体：T37.8<sup>o</sup>，皮肤巩膜无黄染，双肺未及啰音。心界不大，HR80次/分，律齐。血象：WBC9.0×10<sup>9</sup>/L，N56%。X线：双上肺云雾状渗出灶，边缘模糊。诊断应首先考虑的是 A、肺炎B、 肺结核C、 肺脓肿D、 肺癌E、 支气管扩张标准答案：b

93.

患者，男，20岁，因全身浮肿1周入院。患者一周前感冒后出现眼睑浮肿，随后浮肿逐渐加重，感明显乏力。查体：Bp110/70mmHg，眼睑浮肿，心肺腹部未见异常，双下肢及会阴部水肿。血浆白蛋白

d1，血胆固醇、甘油三酯增高，24小时尿蛋白定量4.2g。诊断应首先考虑的是 A、急性肾炎B、 急性肝炎C、 急性肾盂肾炎D、 肾病综合征E、 肝肾综合征标准答案：d

94.

患者，男，18岁，发热伴鼻出血10天。查体：四肢皮肤可见散在出血点，颈部及腋下淋巴结肿大，胸骨压痛，肝肋下2cm，脾肋下3cm。血象：Hb50g/L，WBC26×9/L，血小板30×10<sup>9</sup>/L。骨髓增生极度活跃，原始细胞占0.65，过氧化酶染色阴性。

A、急性淋巴细胞白血病B、 特发性血小板减少性紫癜C、 急性再生障碍性贫血D、 淋巴瘤E、 骨髓异常增殖综合征标准答案：a

95.

患者，男，70岁。高血压病史10年。与家人争执后出现头晕、头胀，言语

---

含糊不清，伴右侧肢体活动不利4小时就诊。查体：Bp180/110mmHg，T 36.5℃，R18次/分，P80次/分。意识模糊，心界向左扩大，心率80次/分，律齐，两肺及腹部检查未见异常，右侧膝腱反射亢进，右侧巴氏征阳性。诊断应首先考虑的是

A、脑出血B、脑栓塞C、高血压脑病D、蛛网膜下腔出血E、脑血栓形成  
标准答案：a

96.

患者，女，18岁。因持续上腹痛1天就诊。1天前进食较多油腻食物后出现上腹部胀痛不止，伴恶心，呕吐，发热。查体：体温38.4℃，上腹部轻度压痛，肝脾未触及，莫菲征( )。诊断应首先考虑的是

A、急性胰腺炎B、急性胆囊炎C、急性阑尾炎D、急性胃肠炎E、幽门梗阻  
标准答案：a

97.

患者，男，70岁。乙肝病史17年。近3个月出现持续性腹胀，黄疸，查体：肝脏未触及，脾脏中度肿大，腹部移动性浊音阳性。诊断应首先考虑的是

A、慢性肝炎B、胰腺癌C、白血病D、肝硬化E、肝癌  
标准答案：d

98.

患者，男，54岁。咳嗽气喘病史20年，近年来出现右上腹胀痛及下肢水肿。查体：桶状胸，双侧呼吸动度减低，心率118次/分，律齐，肝大，肝-颈静脉回流征( )。目前最主要的诊断是

A、自发性气胸B、病毒性心肌炎C、心包积液D、右心功能不全E、慢性阻塞性肺气肿  
标准答案：e

---

99.

患者，女，44岁。头晕、心悸4年余。查体：血压150/70mmHg，水冲脉，心尖搏动呈抬举性，心浊音界为靴形，胸骨左缘3、4肋间可听到舒张期叹气样杂音。诊断应首先考虑的是

A、主动脉粥样硬化 B、二尖瓣狭窄 C、二尖瓣关闭不全 D、主动脉瓣狭窄  
E、主动脉瓣关闭不全 标准答案：e

100.

患者，女，40岁。右上腹痛伴发热、黄疸3天，诊断应首先考虑的是

A、急性肝炎 B、急性胆囊炎 C、胆道蛔虫症 D、急性阑尾炎

E、急性胰腺炎 标准答案：b

101.

患者，男，45岁。体力活动时突然出现剧烈头痛、呕吐。检查：神志清楚，血压160/95mmHg，颈强直，Kernig征(，)。最可能的诊断是

A、脑膜炎 B、小脑出血 C、内囊出血 D、C. 脑干出血 E、

蛛网膜下腔出血 标准答案：e

102.

患者，男，35岁。餐后剧烈腹痛半小时就诊。查体：表情痛苦，腹式呼吸消失，腹肌广泛紧张，全腹压痛，反跳痛，肠鸣音消失。既往有反复上腹痛病史3年余。诊断应首先考虑的是

A、消化性溃疡并发穿孔 B、急性胰腺炎 C、急性阑尾炎 D、

急性胆囊炎 E、机械性肠梗阻 标准答案：a

---

103.

患者，男，70岁。突发胸骨后压榨性疼痛4小时，伴左肩疼痛，出汗。

为明确诊断，应首选的检查是 A、胸部X线检查B、胸部CTC、

心电图D、超声心动图E、心脏放射性核素检查标准答案：c

104.

患者，女，52岁。左下腹痛三月余，伴腹泻，大便呈粘液糊状，时有脓血，里急后重。结肠镜检查：直肠乙状结肠黏膜多发性浅表溃疡，伴充血、水肿。诊断应首先考虑的是

A、溃疡性结肠炎B、肠结核C、慢性肠炎D、阿米巴痢疾E、结肠癌标准答案：a

105.

患者，女，81岁。“五更泻”二年未愈，近两月久泻不禁，完谷不化，形寒肢冷，腰酸膝软，舌淡苔白，脉沉细，治疗选用：A、痛泻要方

B、胃苓汤C、平胃散D、藿香正气散E、四神丸标准答案：e

106.

患者女性，42岁，有腹痛史3年，腹痛较剧，痛处不移，伴有月经不调，舌紫暗，脉弦，该病例中医辨证为：A、肝气郁滞B、气滞血瘀

C、瘀热互结D、寒凝血瘀E、血瘀夹虚标准答案：b

107.

男性患者，67岁，发病三天，小便量少，点滴而出，今日忽然点滴不出，小腹胀满，口苦口粘，口干不欲饮，大便不爽，舌红苔黄腻，脉弦数，辨证为：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/208004054024006035>