

2024 年河南省鼓楼区《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题可打印

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列药物中，与甲氨蝶呤长期大量合用，可引起膀胱移行细胞癌的是

- A: 糖皮质激素
- B: 抗生素
- C: 抗病毒药物
- D: 维生素类

答案：A

2. 可以降低血尿酸水平，但升高尿尿酸水平而导致肾结石的抗痛风药是

- A: 丙磺舒
- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱
- D: 呋塞米

答案：A

3. 肝功能不全的心衰患者可选用

- A: 美西律
- B: 地高辛
- C: 普萘洛尔
- D: 地尔硫卓

答案：B

4. 能可逆、选择性地抑制儿茶酚-O-甲基转移酶，可延长和稳定左旋多巴对帕金森病治疗作用的药物是

- A: 恩他卡朋
- B: 左旋多巴
- C: 司来吉兰
- D: 苯海索

答案：A

5. （2016 年真题）鼻减充血药所致的典型不良反应是

- A: 心率减慢
- B: 共济失调
- C: 血压升高
- D: 血管舒张

答案：C

6. 黏液性水肿选用

- A: 甲状腺素
- B: 血管神经性水肿
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 粒细胞下降

答案：A

7. （2020 年真题）患者，女，45 岁。诊断为高血压合并甲状腺功能亢进，心率过快，宜选用的抗高血压药是

- A: 吲达帕胺
- B: 普萘洛尔
- C: 氨氯地平

D: 赖诺普利

答案：B

8. 通过选择性抑制 5α -还原酶而抑制前列腺增生的药物是

A: 哌唑嗪

B: 特拉唑嗪

C: 依立雄胺

D: 甲睾酮

答案：C

9. 治疗绝经后妇女的骨质疏松选用

A: 鲑降钙素

B: 奥利司他

C: 阿仑膦酸钠

D: 阿法骨化醇

答案：C

10. 可以与雌激素受体结合，但不具有雌激素对生殖系统的影响，能增加雌激素的活性对骨代谢产生激动效应，产生抗骨质疏松作用的药物是

A: 降钙素

B: 阿仑膦酸钠

C: 骨化三醇

D: 雷洛昔芬

答案：D

11. 克林霉素与红霉素合用()

A: 不良反应叠加

B: 药理作用拮抗

C: 后者血药浓度升高，不良反应增加

D: 后者血药浓度下降，药效降低

答案：B

12. 可用于金黄色葡萄球菌等革兰阳性菌所致严重感染的是

A: 利奈唑胺+哌替啶

B: 利奈唑胺+苯丙醇胺

C: 磷霉素钠+万古霉素

D: 磷霉素氨丁三醇

答案：C

13. 脓疱型痤疮可选用()

A: 林旦霜

B: 阿达帕林

C: 酮康唑

D: 维 A 酸

答案：B

14. 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药是

A: 维生素 B₆

B: 托烷司琼

C: 甲氧氯普胺

D: 阿瑞吡坦

答案：B

15. 前列腺素类似物的降眼压机制是

A: 开放小梁网

- B: 浓缩玻璃体
- C: 增加巩膜葡萄膜通路房水外流
- D: 减少房水生成

答案：C

16. 氨基糖苷类

- A: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年
- B: 禁用于胆道阻塞患者
- C: 禁用于早产儿、新生儿
- D: 禁用于 8 岁以下儿童

答案：D

17. 下列对红霉素的说法错误的是()

- A: 对革兰阳性菌作用强大
- B: 是治疗军团病的首选药
- C: 容易透过血脑屏障
- D: 作用机制是抑制蛋白质合成

答案：C

18. 属于雄激素类的是()

- A: 他莫昔芬
- B: 睾酮
- C: 甲羟孕酮
- D: 己烯雌酚

答案：B

19. 链霉素首选用于()

- A: 钩端螺旋体病

- B: 伤寒、副伤寒
- C: 鼠疫、土拉菌病
- D: 布鲁菌病

答案：C

20. 可能发生不可逆性骨髓功能抑制，应避免重复疗程使用的药物是()

- A: 青霉素
- B: 四环素
- C: 氯霉素
- D: 多西环素

答案：C

21. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

- A: 艾塞那肽
- B: 阿卡波糖
- C: 罗格列酮
- D: 瑞格列奈

答案：B

22. 患者，男，45 岁。近来饭后出现上腹疼痛，胃镜检查后诊断为幽门螺杆菌感染所致的“胃溃疡”，与抗生素合用根除幽门螺杆菌治疗的是

- A: 东莨菪碱
- B: 泮托拉唑
- C: 雷尼替丁
- D: 昂丹司琼

答案：B

23. 临床上用于治疗躁狂症的是

- A: 苯妥英钠
- B: 卡巴西平
- C: 硫酸镁
- D: 苯巴比妥

答案：B

24. (2016 年真题) 铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是

- A: 罗红霉素
- B: 头孢曲松
- C: 利奈唑胺
- D: 头孢他啶

答案：D

25. 有明显耳毒性的药物是()

- A: 青霉素
- B: 磺胺嘧啶
- C: 链霉素
- D: 四环素

答案：C

26. 甲状腺危象宜选用

- A: 甲状腺片
- B: 硫脲类+大剂量碘
- C: 普萘洛尔
- D: 硫脲类

答案：B

27. 全身用药可以用于伤寒、副伤寒的酰胺醇类药物是()

- A: 呋喃妥因
- B: 复方磺胺甲噁唑
- C: 左氧氟沙星
- D: 氯霉素

答案: D

28. 成人使用阿托品最低致死量为

- A: 10mg
- B: 50mg
- C: 5mg
- D: 80mg~130mg

答案: D

29. 中毒症状主要表现为胃肠道反应、中枢神经系统反应和心脏毒性三个方面的是

- A: 地高辛
- B: 卡托普利
- C: 哌唑嗪
- D: 氨氯地平

答案: A

30. 关于地西泮的叙述，错误的是

- A: 是一种长效镇静催眠药物
- B: 抗焦虑作用时间长，是临床上常用的抗焦虑药之一
- C: 在临床上可用于缓解炎症引起的反射性肌肉痉挛
- D: 抗癫痫作用强，可用于治疗癫痫小发作

答案: D

31. 外用的增色素药分为 4 类，不包括

- A: 肾上腺皮质激素类
- B: 重金属元素及其化合物
- C: 补骨脂素及其衍生物
- D: 煤焦油类

答案：D

32. 可导致"类流感样"反应的药物是()

- A: 氯屈膦酸二钠
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 依替膦酸二钠
- D: 帕米膦酸二钠

答案：B

33. 急性化脓性中耳炎早期最有效的治疗是()

- A: 2%酚甘油滴耳
- B: 抗生素溶液滴耳
- C: 抗生素加激素全身应用
- D: 及早足量抗生素应用

答案：D

34. 抗酸作用较强、较快，有导泻作用

- A: 氢氧化铝
- B: 氢氧化镁
- C: 碳酸钙
- D: 三硅酸镁

答案：B

35. 与卡比马唑合用应谨慎的是

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 放射性碘
- C: 糖皮质激素
- D: 甲状腺素

答案：B

36. 精神紧张、情绪恐惧所致的失眠

- A: 夸西泮
- B: 谷维素
- C: 氟西泮
- D: 氯美扎酮

答案：D

37. 以下通过增加组织与肝脏对胰岛素的敏感性而降糖的是()

- A: 二甲双胍
- B: 吡格列酮
- C: 瑞格列奈
- D: 利拉鲁肽

答案：B

38. 可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是()

- A: 阿司匹林
- B: 塞来昔布
- C: 双氯芬酸
- D: 对乙酰氨基酚

答案：A

39. 治疗普通型奈瑟球菌脑膜炎是()

- A: 磺胺嘧啶
- B: 复方磺胺甲噁唑
- C: 磺胺米隆
- D: 柳氮磺吡啶

答案: A

40. 减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定，属于乙内酰脲类抗癫痫药的是

- A: 苯巴比妥
- B: 苯妥英钠
- C: 卡马西平
- D: 加巴喷丁

答案: B

41. 双炔失碳酯需服满的片数是

- A: 6 片
- B: 14 片
- C: 7 片
- D: 12 片

答案: D

42. 哌拉西林和羧苄西林()

- A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- B: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染
- C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染
- D: 肾毒性大

答案：C

43. 洋地黄的主要适应症不包括

- A: 心房扑动
- B: 急、慢性充血性心力衰竭
- C: 阵发性室上性心动过速
- D: 房室传导阻滞

答案：D

44. 治疗厌氧菌引起的严重感染最适合的是

- A: 红霉素
- B: 万古霉素
- C: 克林霉素
- D: 克拉霉素

答案：C

45. 在体内可与含羟基或羧基的毒物结合形成低毒或无毒结合物排出体外,起到解毒和保护肝脏的作用,用于急、慢性肝炎治疗的药物是 ()

- A: 异甘草酸镁
- B: 硫普罗宁
- C: 腺苷蛋氨酸
- D: 葡醛内酯

答案：D

46. (2018 年真题) 属于电解质补充药,可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是 ()

- A: 门冬氨酸钾镁
- B: 双环醇

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 异甘草酸镁

答案: A

47. 通过抑制胆碱酯酶活性，提高脑内乙酰胆碱含量的药物是

A: 艾地苯醌

B: 多奈哌齐

C: 舍曲林

D: 阿尼西坦

答案: B

48. 奈韦拉平的作用靶点是

A: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

B: HIV-1 反转录酶

C: 脱氧核糖核酸聚合酶

D: 神经氨酸酶

答案: B

49. (2019 年真题) 原发性肾病综合征患者，在院治疗时给予“注射用甲泼尼龙 40mgqd”静脉滴注，出院前调整为等效剂量的口服药物序贯治疗，适宜的方案是 ()

A: 泼尼松片 20mgqd

B: 泼尼松片 30mgqd

C: 泼尼松片 50mgqd

D: 地塞米松片 10mgqd

答案: C

50. 肾毒性大的是

- A: 阿莫西林
- B: 庆大霉素
- C: 头孢噻肟
- D: 头孢哌酮

答案：B

51. 有关氨茶碱平喘作用的叙述错误的是

- A: 激活腺苷酸环化酶
- B: 激活磷酸二酯酶
- C: 促进肾上腺素释放
- D: 拮抗腺苷受体

答案：B

52. 用于治疗便秘，也可在结肠镜检查或 X 线检查时用作肠道清洁剂，与碳酸氢钠等碱性药物作用，能引起尿液变色的是

- A: 乳果糖
- B: 聚乙二醇 4000
- C: 酚酞
- D: 开塞露

答案：C

53. 下列氨基糖苷类抗菌药物中，引起耳蜗神经损伤发生率最高的是

- A: 新霉素
- B: 链霉素
- C: 卡那霉素
- D: 妥布霉素

答案：A

54. (2020 年真题) 关于维 A 酸软膏治疗痤疮的说法，错误的是

- A: 不宜用于皮肤皱褶部位
- B: 使用初期可能出现皮肤干燥或脱屑，对紫外光敏感性增强，宜在睡前使用
- C: 为了加强疗效，可以一日多次给药
- D: 有明确的致畸性，妊娠期妇女禁用

答案：C

55. 不属于氟喹诺酮类的药物是

- A: 小檗碱
- B: 依诺沙星
- C: 莫西沙星
- D: 环丙沙星

答案：A

56. 物质代谢过程中催化"一碳单位"转移反应的辅酶组成成分是

- A: 维生素
- B: 维生素 B
- C: 叶酸
- D: 维生素 A

答案：C

57. (2021 年真题) 用于治疗湿性视网膜黄斑变性的药物是 ()

- A: 毛果芸香碱滴眼液
- B: 聚乙二醇滴眼液
- C: 硫酸阿托品眼用凝胶
- D: 雷珠单抗注射液

答案：D

58. 用于器官移植的抗排异反应的药物是()

- A: 环磷酰胺
- B: 甲泼尼龙
- C: 硫唑嘌呤
- D: 环孢素

答案: D

59. 属于肾上腺受体激动剂的降眼压药是()

- A: 拉坦前列素
- B: 噻吗洛尔
- C: 毛果芸香碱
- D: 地匹福林

答案: D

60. 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 口服补液盐
- B: 双歧杆菌三联活菌
- C: 洛哌丁胺
- D: 蒙脱石

答案: C

61. 复方左炔诺孕酮片、去氧孕烯炔雌醇片、复方孕二烯酮片均含有的成分是

- A: 炔雌醇
- B: 维生素 B6

C: 甲羟孕酮和炔雌醇

D: 去氧孕烯

答案: A

62. 下列属于窄谱抗菌药物的是

A: 环丙沙星

B: 阿莫西林

C: 氨曲南

D: 头孢唑啉

答案: C

63. 在血液中几乎不与血浆蛋白结合的口服降糖药是

A: 达格列净

B: 罗格列酮

C: 二甲双胍

D: 吡格列酮

答案: C

64. 治疗疟疾的药物是()

A: 甲硝唑

B: 吡喹酮

C: 氯喹

D: 乙胺嗪

答案: C

65. 可导致神经毒性(手指、足趾麻木、腱反射消失)的抗肿瘤药是

A: 博来霉素

B: 柔红霉素

C: 长春新碱

D: 紫杉醇

答案: C

66. 属于嘌呤类抗代谢类药物的是

A: 甲氨蝶呤

B: 吉西他滨

C: 长春瑞滨

D: 巯嘌呤

答案: D

67. 磺酰脲类药物最常见的不良反应

A: 腹痛、腹泻

B: 低血糖

C: 共济失调

D: 眩晕嗜睡

答案: B

68. 特布他林的平喘作用维持时间是

A: 10~20 分钟

B: 3~5 分钟

C: 4~6 小时

D: 10~12 小时

答案: C

69. 属于阴道局部用药的是

A: 聚甲酚磺醛

B: 地屈孕酮

C: 阿霉素

D: 环磷酰胺

答案: A

70. 可致肌痛、骨关节病损、跟腱断裂的药物

A: 氨基糖苷类

B: 大环内酯类

C: 氟喹诺酮类

D: 四环素类

答案: C

71. 属于 CYP2C9 的诱导剂，可以减少氟伐他汀的生物利用度 50% 的是

A: 地高辛

B: 烟酸

C: 利福平

D: 红霉素

答案: C

72. 属于 5-HT

A: 阿瑞吡坦

B: 格雷司琼

C: 甲地孕酮

D: 甲氧氯普胺

答案: B

73. 使用奥沙利铂后最需要关注的典型不良反应是

A: 肝毒性

B: 肾毒性

C: 消化道反应

D: 神经毒性

答案：D

74. 可使维生素 B

A: 糖皮质激素

B: 丙磺舒

C: 异烟肼

D: 雌激素

答案：D

75. 临床上最常用的内分泌治疗药物是

A: 雌激素

B: 雄激素

C: 他莫昔芬

D: 氨氯米特

答案：C

76. 下述种类的利尿药中，利尿作用最强的是

A: 留钾利尿剂

B: 袢利尿剂

C: 碳酸酐酶抑制剂

D: 噻嗪类利尿剂

答案：B

77. 预防急性肾衰竭可选用

A: 氢氯噻嗪

B: 螺内酯

C: 呋塞米

D: 乙酰唑胺

答案: C

78. 服用他汀类药物需要监测肌毒性，该临床指标是

A: 碱性磷酸酶

B: 肌酸激酶

C: 乳酸脱氢酶

D: 尿淀粉酶

答案: B

79. 氟替卡松吸入气雾剂用于中度哮喘时的用法和用量为

A: 一次 50~100 μg ，一日 2 次

B: 一次 500~1000 μg ，一日 2 次

C: 一次 100~250 μg ，一日 2 次

D: 一次 250~500 μg ，一日 2 次

答案: D

80. 雄激素可降低的体内物质是

A: 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)

B: 乳酸脱氢酶 (LDH)

C: 高密度脂蛋白 (HDL)

D: 低密度脂蛋白 (LDL)

答案: C

81. 临床用于军团菌病、支原体肺炎、空肠弯曲菌肠炎等首选的治疗药物是

A: 头孢米诺

B: 阿奇霉素

C: 四环素

D: 红霉素

答案: D

82. 患者，男性，48 岁，醉酒呕吐后出现发热、咳脓痰 1 周，头孢唑林治疗 4 天后体温稍下降，但痰量仍较多，有臭味，考虑厌氧菌感染，应加用以下哪种药物

A: 阿米卡星

B: 氟康唑

C: 阿奇霉素

D: 甲硝唑

答案: D

83. 下列药物中，不属于蒽环类抗肿瘤抗生素的是

A: 表柔比星

B: 多柔比星

C: 红霉素

D: 柔红霉素

答案: C

84. 依托泊苷注射液的溶媒选择要求是

A: 氯化钠注射液稀释

B: 5%葡萄糖注射液稀释

C: 先用乳酸钠注射液溶解，再用氯化钠注射液或 5%葡萄糖注射液进一步稀释

D: 先用氯化钠注射液溶解，再用 5%葡萄糖注射液进一步稀释

答案: A

85. 下列对外用糖皮质激素的叙述，不正确的是

- A: 氟轻松是强效外用糖皮质激素
- B: 丁酸氢化可的松是中效外用糖皮质激素
- C: 醋酸氢化可的松是弱效外用糖皮质激素
- D: 糠酸莫米松是中效外用糖皮质激素

答案：D

86. 治疗可能引起结晶尿的药物是()

- A: 氯霉素
- B: 左氧氟沙星
- C: 磺胺嘧啶
- D: 呋喃妥因

答案：C

87. 通过抑制 α -葡萄糖苷酶，减少多糖水解为葡萄糖()

- A: 艾塞那肽
- B: 格列本脲
- C: 二甲双胍
- D: 阿卡波糖

答案：D

88. 服用叶酸治疗巨幼细胞贫血，需同时联合使用的药品是()

- A: 维生素 B2
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 维生素 B1
- D: 维生素 B12

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/208037037044007022>