2024年预防接种知识技能大赛笔试试题190题

单位：　　姓名：

一、单项选择题，每题1.5分，共75分。

1.麻疹病例应至前驱期出现卡他症状时开始隔离至出疹后4天，并发肺部感染的应隔离至出疹后（C）天

A、6天　　B、8天　　C、14天　　D、21天

2、疫苗运输时间超过（　B　）小时，须记录途中温度。

A、3　　B、6　　C、12　　D、24

3、温度计应当分别放置在普通冰箱冷藏室及冷冻室的（ D ）位置？

A、边缘　　B、底层　　C、顶层　　D、中间

4、不符合常见预防接种异常反应的是（ C ）

A、无菌性脓肿　　B、群发性癔症　　C、死亡　　D、癫痫

5、预防接种应首选哪种注射器：（　C）

A、玻璃注射器　　B、标准型一次性注射器

C、自毁型注射器　　D、以上三种均可

6、冰箱蒸发器结霜厚度≥（B）mm 时要及时除霜？（　B ）

A、2　　B、4　　C、6　　D、8

7、冻制冰排时，冰排注水量为冰排容积的 （ C　）？

A、50%　　B、70%　　C、90%　　D、100%

8、抗狂犬病血清按照每千克体重（ C ）个国际单位计算。

A、20　　B、30　　C、40　　D、10

9、全程接种狂犬疫苗后3个月及以上再次暴露者，应于（　D

）各加强接种 1 剂次狂犬病疫苗。

A、1、3 天　　B、1、5 天　　C、0、5 天　　D、0、3 天

10、以下说法错误的是（ C ）

A、暴露前基础免疫程序为第 0、7、21（或 28）天各接种 1 剂次狂犬病疫苗

B、持续暴露于狂犬病风险者，全程完成暴露前基础免疫后，在没有动物致伤的情况下，1 年后加强 1 剂次，以后每隔 3—5 年加强 1 剂次

C、全程接种后 6 个月内再次暴露者一般不需要加强接种

D、按暴露前或者暴露后程序全程接种狂犬病疫苗者，除严重免疫功能低下者外，暴露或者再次暴露后无需使用被动免疫制剂

11、以下说法正确的是（　A ）

A、直接接触蝙蝠为III级暴露

B、判定为 I 级暴露者，清洗暴露部位，需进行医学处置。

C、对于狂犬病疫苗注射部位，2 岁以下婴幼儿在大腿前外侧肌内注射，可臀部注射

D、再次暴露发生在免疫接种过程中，应重新按照免疫程序从第 1 剂次开始进行接种。

12、狂犬病人免疫球蛋白按照每千克体重（C）个国际单位（20IU/kg）计算。

A、30　　B、40　　C、20　　D、10

13、

如未能在接种狂犬病疫苗的当天使用被动免疫制剂，接种首针狂犬病疫苗（D）仍可注射被动免疫制剂。

A、≤5 天　　B、≤6 天　　C、3 天　　D、≤7 天

14、狂犬暴露后，伤口用肥皂水（或者其他弱碱性清洁剂、专业冲洗液）和一定压力的流动清水交替彻底冲洗所有咬伤和抓伤处约（B）。

A、10 分钟　　B、15 分钟　　C、20 分钟　　D、30 分钟

15、狂犬暴露后，对特殊部位的伤口进行处置，正确的是（D）。

A、眼部：处置眼内伤口时，要用抗菌眼药水冲洗

B、口腔：冲洗口腔伤口时，患者头抬高

C、外生殖器或肛门部黏膜：伤口处置、冲洗方法同普通伤口，注意冲洗方向应向内。

D、以上均不正确

16、狂犬暴露后，如需同时注射狂犬病疫苗和破伤风疫苗，应分别注射在左、右上臂三角肌，如在同侧三角肌注射，需间隔至少（A）。

A、2.5 厘米　　B、3 厘米　　C、5 厘米　　D、3.5 厘米

17、狂犬暴露后，5 针免疫程序是（ D ）。

A、0、2、6、14 和 28 天　　B、0、7、14、21 和 28 天

C、0、3、7、21 和 28 天　　D、0、3、7、14 和 28 天

18、冰箱温度应控制在（ D ）规定范围？

A、冷藏室为 3℃～8℃，冷冻室 ≤－10℃

B、冷藏室为 2℃～8℃，冷冻室 ≤－10℃

C、冷藏室为 2℃～8℃，冷冻室 ≤－15℃

D、冷藏室为 2℃～8℃，冷冻室 ≤－15℃

19、两种及以上注射类减毒活疫苗如果未同时接种，应间隔不小于（C　）天进行接种？

A、7　　B、14　　C、28　　D、30

20、疫苗接种三查七对一验证：一是检查（B　）；二是查对预防接种证；三是检查疫苗、注射器的外观、批号、有效期。

A、受种者健康状况、核查接种人员

B、受种者健康状况、核查接种禁忌

B、受种者健康

C、受种者是否是本人、核查接种禁忌

21、皮内注射法适用（D　）疫苗

A、乙肝疫苗　B、乙脑减毒活疫苗　C、百白破疫苗　D、卡介苗

22、高风险人群接种第 3 剂乙型肝炎疫苗后 1~2 个月检测 HBsAg 和抗-HBs，若发现 HBsAg 阴性、抗-HBs 阴性或＜（　B）mIU/ml，可按照 0、1、6 月免疫程序再接种 3 剂 10μg 或 20μg 乙型肝炎疫苗。

A、5　　B、10　　C、20　　D、30

23、卡介苗（BCG）　接种剂量：（　A ）。

A.0.1ml　　B.0.5ml　　C.1.0ml　　D.2ml

24、卡介苗（BCG）大于或等于（ D　）儿童不予补种

A.1 岁　　B.2 岁　　C.3 岁　　D.4 岁

25、乙脑灭活疫苗（JE-I）共接种（ C　）

A.2 剂次　　B.3 剂次　　C.4 剂次　　D.5 剂次

26、两剂次 A 群流脑多糖疫苗，间隔不小于(C)

A.1 个月　　B.2 个月　　C.3 个月　　D.4 个月

27、HIV 感染母亲所生儿童可按照免疫程序接种(A)

A、百白破疫苗　　B、乙脑减毒活疫苗

C、脊灰减毒活疫苗　　D、甲肝减毒活疫苗

28、不作为疫苗接种禁忌：(A)

A、唐氏综合征　　B、急性肾脏疾病

C、癫痫控制处于急性期　　D、白血病

29、**皮内注射法进针**针头与皮肤角度（A）

A、5°～10°　　B、30°～40°　　C、90°　　D、15°～30°

30、疫苗接种三查七对一验证：一验证是指接种前请受种者或其监护人验证接种疫苗的品种和（C）等

A、注册日期　　B、批签发　　C、有效期　　D、生产日期

31、皮下注射法部位(B)

A、上臂外侧三角肌中部略下处　　B、上臂外侧三角肌下缘附着处

C、上臂外侧三角肌　　D、大腿前外侧中部肌内

32、九价人乳头瘤病毒疫苗，适用于（C）女性。

A、16-26 岁　　B、16-45 岁　　C、9-45 岁　　D、9-26 岁

33、流感疫苗主要作用（C）。

A、预防病毒感染引起的感冒　　B、预防细菌感染引起的感冒

C、预防流感病毒感染引起的季节性流感及其严重并发症

D、以上说法均正确

34、重组带状疱疹适用于（B）。

A、≥40 岁　　B、≥50 岁　　C、≥18 岁　　D、≥60 岁

35、水痘疫苗接种未完成 2 剂者，补齐 2 剂，≤14 岁人群 2 剂至少间隔（），≥15 岁人群 2 剂至少间隔（D）。

A、4 周，4 周　　B、3 个月，3 个月

C、4 周，3 个月　　D、3 个月，4 周

36、（B）岁及以上乙型肝炎易感者，可接种 60μg 乙型肝炎疫苗

A、12　　B、16　　C、18　　D、50

37、HBsAg 阳性或不详产妇所生新生儿体重小于 2000g 者 HepB，并在婴儿满(B)月龄时按程序完成 3 剂次 HepB 接种

A.0.1.6 月龄　B.1.2.7 月龄　C.0.3.6 月龄　D.0.4.6 月龄

38、23 价肺炎球菌多糖疫苗仅推荐功能性/解剖性无脾和免疫抑制等待定高危人群复种，只复种 1 剂，与前 1 剂间隔至少（B）。

A、3 年　　B、5 年　　C、6 年　　D、4 年

39、单支 4 剂次疫苗损耗系数不超过（C）

A、1.05　　B、1.5　　C、2.0　　D、2.5

40、温度记录资料，应保存至疫苗有效期满后不少于（B）年备查？

A、1　　B、5　　C、10　　D、20

41、（D）岁以下出现急性迟缓性麻痹（AFP）症状的病例，和任何年龄临床诊断为脊髓灰质炎的病例均作为 AFP。

A、3　　B、5　　C、10　　D、15

42、接种 MMR 后(B)内避免使用免疫球蛋白

A.1 周　　B.2 周　　C.3 周　　D.4 周

43、乙型脑炎灭活疫苗，儿童接种 4 剂，分别为（A）。

A、8 月龄接种 2 剂，间隔 7-10 天；2 岁和 6 岁各接种 1 剂

B、8 月龄接种 2 剂，间隔 7-14 天；2 岁和 6 岁各接种 1 剂

C、6 月龄接种 2 剂，间隔 7-10 天；2 岁和 6 岁各接种 1 剂

D、6 月龄接种 2 剂，间隔 7-14 天；2 岁和 6 岁各接种 1 剂

44、A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗接种人群为（D）。

A、6 月龄　B、≥6 月龄　C、3 月龄　D、≥3 月龄

45、现场接种时，接种证上不需要登记的资料是（C）

A、疫苗名称　B、接种时间　C、疫苗储存温度　D、疫苗批号

46、如何正确开启疫苗（A）

A、首先将疫苗瓶上部疫苗弹至底部，用砂轮在安瓿瓶颈部锯一圈，用 75%乙醇棉球消毒安瓿颈部，用消毒干棉球包在安瓿颈部将其折断

B、首先将疫苗瓶上部疫苗弹至底部，用砂轮在安瓿瓶颈部锯一圈，用 75%乙醇棉球消毒安瓿颈部，用消毒湿棉球包在安瓿颈部将其折断

C、首先将疫苗瓶上部疫苗弹至体部，用砂轮在安瓿瓶颈部锯一圈，用 75%乙醇棉球消毒安瓿颈部，用消毒干棉球包在安瓿颈部将其折断

D、首先将疫苗瓶上部疫苗弹至体部，用砂轮在安瓿瓶颈部锯一圈，用 75%乙醇棉球消毒安瓿颈部，用消毒湿棉球包在安瓿颈部将其折断

47、以下说法错误的是（D）

A、检查含吸附剂疫苗是否冻结，将被检和正常对照的疫苗瓶同时摇匀后静置竖立，被检疫苗在短时间（5～10 分钟）内与对照疫苗相比，如出现分层现象且上层液体较清，即可判断被检疫苗曾被冻结。

B、疫苗出入库管理、冷链温度监测和信息登记工作，可由非医疗卫生专业资格人员承担。

C、甲肝减毒活疫苗接种部位是上臂三角肌

D、国家免疫规划疫苗接种程序里面的补种人群指的是小于等于 16 周岁人群

48、5%左右的儿童接种卡介苗后不产生卡疤，建议（B）

A、补种　　B、不补种　　C、经 PPD 测试后再决定　　D、自愿选择

49、我国将 AEFI 分为几类（A）

A、5 类　　B、6 类　　C、7 类　　D、不分类

50、以下说法正确的是（A）

A、注射免疫球蛋白者应间隔不小于 3 个月接种乙脑减毒活疫苗。

B、流脑多糖疫苗预防的是流行性乙型脑炎。

C、接种单位按照候诊、健康询问、登记、知情告知、接种、留观的先后顺序合理布局，人员入口、出口尽可能分开，实现业务流程双向流动

D、预防接种相关人员均须经过预防接种专业培训，每 2 年至少 1 次

51、乙肝疫苗第 2 剂与第 1 剂间隔应(A)天

A、不少于 28

B、不少于 30

C、不少于 45 天

D、不少于 60 天

52、两剂次 MPSV-A 间隔不小于（B）个月

A、2

B、3

C、6

D、9

53、动态监测温度在 0℃～2℃（不含 0℃、2℃），（D）疫苗累计时间不超过过 48 小时（≤48 小时）的可以使用

A、水痘减毒活疫苗

B、腮腺炎减毒活疫苗

C、乙型脑炎灭活疫苗(Vero 细胞)

D、四价流感病毒裂解疫苗

54、肠道病毒 71 型灭活疫苗接种 2 剂，第 1、第 2 剂至少间隔（C）。

A、14 天

B、3 个月

C、4 周

D、2 个月

55、乙脑灭活疫苗免疫程序（C）

A、6 月-8 月-2 岁-6 岁

B、6 月-6 月-2 岁-6 岁

C、8 月-8 月-2 岁-6 岁

D、8 月-8 月-3 岁-6 岁

56、麻腮风疫苗，MMR 注射免疫球蛋白者应间隔不小于(A)接种 MMR

A .3 个月

B.4 个月

C.6 个月

D.12 个月

57、HIV 感染母亲所生 HIV 感染状况不详儿童无症状可接种（）疫苗？（A）

A、麻腮风疫苗

B、A 群流脑多糖疫苗

C、A 群 C 群流脑多糖疫苗

D、百白破疫苗

58、动态监测温度在 0℃～2℃（不含 0℃、2℃），（D）疫苗累计时间不超过 48 小时（≤48 小时）的可以使用

A、乙脑减毒活疫苗

B、A 群脑膜炎球菌多糖疫苗

C、甲肝疫苗

D、百白破疫苗

59、肠道病毒 71 型灭活疫苗接种人群为（D）。

A、≥3 月龄

B、3 月龄至 3 岁

C、≥6 月龄

D、6 月龄至 5 岁

60、乙脑减毒活疫苗免疫程序（D）

A、6 月-2 岁

B、2 岁-6 岁

C、8 月-6 岁

D、8 月-2 岁

61、大于或等于 24 月龄儿童已接种过 1 剂次 A 群流脑多糖疫苗，间隔不小于(B)接种 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗

A.1 个月

B.3 个月

C.6 个月

D.24 个月

62、HIV 感染母亲所生 HIV 感染儿童无症状和无免疫抑制可接种（）疫苗？（A）

A、麻腮风疫苗

B、乙脑减毒活疫苗

C、甲肝减毒活疫苗

D、脊灰减毒活疫苗

63、动态监测温度在 0℃～2℃（不含 0℃、2℃），（B）疫苗累计时间不超过 72 小时（≤72 小时）的可以使用

A、九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)

B、ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗

C、23 价肺炎球菌多糖疫苗

E、b 型流感嗜血杆菌结合疫苗

64、乙肝疫苗第 1 剂(C)完成

A、出生后 6 小时内

B、出生后 12 小时内

C、出生后 24 小时内

D、出生后 72 小时内

65、脊灰减毒活疫苗免疫程序（C）

A、3 月-4 岁

B、6 月-4 岁

C、4 月-4 岁

D、2 月-3 月

66、单价轮状病毒接种人群（D）婴幼儿。

A、6 周龄-12 周龄

B、6 周龄-32 周龄

C、6 周龄-3 岁

D、2 月龄-3 岁

67、HIV 感染母亲所生 HIV 感染儿童有症状或有免疫抑制不可接种（）疫苗？（A）

A、麻腮风疫苗

B、乙肝疫苗

C、脊灰灭活疫苗

D、白破疫苗

68、动态监测温度在 0℃～2℃（不含 0℃、2℃），（A）疫苗累计时间不超过 72 小时（≤72 小时）的可以使用

A、麻腮风联合减毒活疫苗

B、百白破疫苗

C、Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗

D、乙肝疫苗

69、乙肝疫苗第 3 剂与第 1 剂间隔(C)个月

A.不少于 2 个月

B.B.不少于 3 个月

C.C.不少于 4 个月

D.不少于 6 个月

70、麻腮风疫苗免疫程序（B）

A、8 月-12 月

B、8 月-18 月

C、6 月-12 月

D、6 月-18 月

71、A 群流脑多糖疫苗第 2 剂(B)完成

A.小于 12 月龄

B.小于 18 月龄

C.小于 24 月龄

D.小于 36 月龄

72、HIV 感染母亲所生 HIV 感染状况不详儿童有症状或有免疫抑制暂缓接种（）疫苗（A）

A、卡介苗

B、A 群流脑多糖疫苗

C、A 群 C 群流脑多糖疫苗

D、百白破疫苗

73、**冷藏储运的疫苗**动态监测温度在 25℃～37℃（不含 25℃），累计时间不超过（C）小时的可以使用。

A、2

B、6

C、8

D、12

74、乙肝疫苗第 3 剂与第 2 剂间隔应(D)天

A. 不少于 28 天

B. 不少于 30 天

C. 不少于 45 天

D. 不少于 60 天

75、第 1 剂 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗与第 2 剂 A 群流脑多糖疫苗，间隔不小于(C)。

A. 3 个月

B. 6 个月

C. 12 个月

D.36 个月

76、冷冻储运的疫苗动态监测温度在 0℃～25℃（不含 0℃），累计时间不超过（C）小时的可以使用

A、48

B、12

C、24

D、72

77、A 群流脑多糖疫苗免疫程序（A）

A、6-9

B、3-9

C、6-12

D、2-6

78、HIV 感染母亲所生小于(C)月龄婴儿在接种前不必进行 HIV 抗体筛查，按 HIV 感染状况不详儿童进行接种

A、6

B、12

C、18

D、24

79、目前纳入国家重点人群免疫规划的疫苗有多少种？（ B）

A、2

B、3

C、11

D、14

80、按照《疫苗储存和运输管理规范》，普通冷库每年至少全面维护几次？建议使用年限多久？（ B）

A、2 次，5-8 年

B、1 次，8-10 年

C、1 次，5-8 年

D、2 次，8-10 年

81、冷链室安装（B）台以上冰箱时，需安装空调或排气扇。

A、2

B、3

C、4

D、5

82、一婴幼儿体温达 39-40 摄氏度，皮疹为玫瑰色丘疹，自耳后、发际、前额、面、颈部开始自上而下波及躯干和四肢手掌足底，患儿流涕、喷嚏、咳嗽、流泪、畏光，眼结膜炎，口腔颊粘膜周围柯氏斑，是下列哪个疾病的临床特点？（B）

A、风疹

B、麻疹

C、幼儿急疹

D、猩红热

83、高危人群进行抗-HBs 检测，如抗-HBs 检测结果为以下哪项，可给予加强免疫？（A）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/208037060133006127