

2024 年广西壮族自治区福绵区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题内部题库【黄金题型】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 阿司匹林与华法林合用

- A: 心源性水肿
- B: 头晕、头痛、血压下降
- C: 诱发胃肠道溃疡出血
- D: 抗凝血作用增强

答案：D

2. 治疗绝经后妇女的骨质疏松选用

- A: 奥利司他
- B: 阿法骨化醇
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 鲑降钙素

答案：C

3. 可诱发或加重支气管哮喘急性发作的药物是()

- A: 苯妥英钠
- B: 奎尼丁
- C: 利多卡因
- D: 普萘洛尔

答案：D

4. 患者，男，56 岁，诊断为肝性脑病Ⅳ级，建议给予该患者使用的氨基酸是

- A: 脂肪族氨基酸
- B: 杂环氨基酸
- C: 芳香族氨基酸
- D: 支链氨基酸

答案：D

5. 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药物是

- A: 甲地孕酮
- B: 甲氧氯普胺
- C: 格雷司琼
- D: 阿瑞吡坦

答案：C

6. 下列关于吉非替尼的描述，错误的是

- A: 用于治疗经含有铂类或多西他赛治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者
- B: 与细胞毒类药物如铂类、紫杉类有协同作用
- C: 与传统化疗药存在交叉耐药
- D: 常见典型不良反应是皮肤毒性、腹泻

答案：C

7. 属于短效 β_2 受体激动剂的是

- A: 异丙托溴铵
- B: 福莫特罗
- C: 噻托溴铵
- D: 特布他林

答案：D

8. (2017 年真题) 减鼻充血药通常用于缓解鼻塞症状,其所激动的受体是 ()

- A: N 受体
- B: H₁ 受体
- C: α 受体
- D: M 受体

答案: C

9. 口服吸收少, 用于肠道感染的是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 甲氧苄啶
- C: 呋喃唑酮
- D: 氧氟沙星

答案: C

10. 下列药物属于肾素抑制剂的是 ()

- A: 硝苯地平
- B: 普萘洛尔
- C: 阿利克仑
- D: 卡托普利

答案: C

11. 与氯吡格雷合用, 竞争 CYP2C19, 使用氯吡格雷患者血栓不良反应事件增多的药物是

- A: 西咪替丁
- B: 雷贝拉唑
- C: 泮托拉唑

D: 奥美拉唑

答案: D

12. 与 50S 亚基结合，阻断转肽作用的药物是

A: 甲氧苄啶

B: 磺胺甲

C: 青霉素

D: 红霉素

答案: D

13. (2016 年真题) 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药是

A: 阿瑞吡坦

B: 维生素 B₆

C: 托烷司琼

D: 甲氧氯普胺

答案: C

14. (2019 年真题) 患者，男，64 岁，因“慢性肾脏病、肾性高血压”入院，血压 203/110mmHg，该患者宜首选（如果疗程超过 2 小时需密切监测血中硫氰酸盐水平）的降压药物是（）

A: 贝那普利

B: 美托洛尔

C: 氨氯地平

D: 硝普钠

答案: D

15. 可引起高钾血症，应避免与留钾利尿药联合应用的是（）

A: 卡托普利

- B: 呋塞米
- C: 地高辛
- D: 哌唑嗪

答案：A

16. 与奥美拉唑、甲硝唑三联治疗幽门螺杆菌感染的是

- A: 克拉霉素
- B: 红霉素
- C: 万古霉素
- D: 罗红霉素

答案：A

17. 从植物中提取，具有促进白细胞增生、抗炎、降血压、抗肿瘤、抗心肌缺氧缺血、抗心律失常等作用的是

- A: 小檗胺
- B: 丙酸诺龙
- C: 鲨肝醇
- D: 维生素 B₄

答案：A

18. 糖皮质激素的适应证，不包括

- A: 系统性红斑狼疮
- B: 风湿性关节炎
- C: 活动性肺结核
- D: 再生障碍性贫血

答案：C

19. 氨基糖苷类的作用特点是

- A: 口服给药可治疗全身性感染
- B: 只对繁殖期细菌有杀菌作用
- C: 在酸性环境中抗菌作用增强
- D: 日剂量一次给药可达到满意杀菌效果

答案：D

20. 为快速杀菌药的抗菌药是()

- A: 氯霉素和替考拉宁
- B: 万古霉素和替考拉宁
- C: 万古霉素和林可霉素
- D: 万古霉素和氯霉素

答案：B

21. 静脉滴注过量可消除噻嗪类利尿剂的利尿和降压作用的是

- A: 氯化钙
- B: 枸橼酸钾
- C: 氯化钠
- D: 氯化钾

答案：C

22. 米诺环素属于

- A: 氨基糖苷类
- B: 四环素类
- C: 酰胺醇类
- D: β -内酰胺类

答案：B

23. 卡替洛尔的副作用不包括

- A: 眼底黄斑部水肿
- B: 结膜充血
- C: 近视化倾向
- D: 可产生暗黑感

答案：B

24. 临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌或对 β -内酰胺类抗菌药物过敏的严重感染的抗生素为()

- A: 万古霉素
- B: 哌拉西林
- C: 氨曲南
- D: 阿莫西林

答案：A

25. 伴有痛风的水肿病人，不宜选用下列哪种药物利尿

- A: 氢氯噻嗪
- B: 阿米洛利
- C: 乙酰唑胺
- D: 氨苯蝶啶

答案：A

26. 患者，女，46 岁。以"口角歪斜 3 天"之主诉入院。3 天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

- A: 1 次/日，午后 14 时给药
- B: 夜间给药
- C: 1 次/日，上午 8 时给药
- D: 3 次/日

答案：C

27. 属于 5α 受体还原酶抑制剂的抗良性前列腺增生症的药品是()。

- A: 度他雄胺
- B: 普适泰
- C: 特拉唑嗪
- D: 酚妥拉明

答案：A

28. 氨基糖苷类作用机制

- A: 抑制细菌细胞壁合成
- B: 抑制细菌蛋白质合成
- C: 干扰细菌核酸代谢
- D: 抑制细菌糖代谢

答案：B

29. 可用于治疗肝性脑病的药物是

- A: 欧车前
- B: 多库酯钠
- C: 番泻叶
- D: 利那洛肽

答案：D

30. 用硝基咪唑类药物后出现神经系统反应的是

- A: 妊娠期妇女
- B: 新生儿
- C: 有活动性中枢神经系统疾病者
- D: 老人

答案：C

31. 在体内主要经 CYP3A4 代谢的质子泵抑制剂是

- A: 米索前列醇
- B: 兰索拉唑
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 铝碳酸镁

答案：B

32. 长期频繁使用可致眼部真菌感染

- A: 利巴韦林
- B: 氯霉素
- C: 更昔洛韦
- D: 四环素可的松

答案：D

33. 阻断 H₂ 受体的是

- A: 氢氧化镁
- B: 奥美拉唑
- C: 西咪替丁
- D: 利血平

答案：C

34. 奥司他韦治疗流行性感冒时，首次用药的时间是

- A: 出现流感症状 72 小时内
- B: 出现流感症状 100 小时内
- C: 出现流感症状 96 小时内
- D: 出现流感症状 48 小时内

答案：D

35. (2021 年真题) 用于验光配镜屈光度检查前散瞳的药物是 ()

- A: 雷珠单抗注射液
- B: 毛果芸香碱滴眼液
- C: 硫酸阿托品眼用凝胶
- D: 聚乙二醇滴眼液

答案：C

36. 对曲霉无效的药物是

- A: 伊曲康唑
- B: 氟康唑
- C: 伏立康唑
- D: 两性霉素 B

答案：B

37. 维生素 B

- A: 坏血病
- B: 脚气病
- C: 成人佝偻病
- D: 角膜软化症

答案：B

38. 关于地芬诺酯的叙述，不正确的是

- A: 可吸附肠内细菌及有毒气体
- B: 用于急、慢功能性腹泻
- C: 长期应用可产生依赖性
- D: 能提高肠张力，减少肠蠕动

答案：A

39. 胰岛素依赖型重症糖尿病用

- A: 二甲双胍
- B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- C: 胰岛素皮下注射
- D: 艾塞那肽

答案：C

40. 具有双向作用，小剂时抑制骨吸收，大剂量时抑制骨形成的药物是
()

- A: 氯屈膦酸二钠
- B: 帕米膦酸二钠
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 依替膦酸二钠

答案：D

41. 葡萄球菌感染的角膜炎可选用

- A: 多黏菌素 B 滴眼液
- B: 夫西地酸滴眼剂
- C: 1% 泼尼松滴眼液
- D: 金霉素眼膏

答案：B

42. 治疗良性前列腺增生症宜选用

- A: 坦洛新
- B: 利血平
- C: 尼莫地平

D: 托特罗定

答案：A

43. 镇静作用明显的 H

A: 苯海拉明

B: 阿司咪唑

C: 组胺

D: 西咪替丁

答案：A

44. 属于肾小管上皮细胞钠离子通道抑制剂的是()

A: 呋塞米

B: 乙酰唑胺

C: 阿米洛利

D: 氢氯噻嗪

答案：C

45. 已用指南推荐剂量或达到 ACEI / ARB 最大耐受剂量后，收缩压 >95mmHg，NYHA 心功能 II ~ III 级、仍有症状的 HFrEF 患者，可用

A: 美托洛尔

B: 沙库巴曲缬沙坦

C: 卡托普利

D: 伊伐布雷定

答案：B

46. 胆绞痛最好选用

A: 阿托品+哌替啶

B: 吗啡

C: 阿司匹林

D: 阿托品

答案: A

47. 选择性舒张脑血管的药物是

A: 硝苯地平

B: 地尔硫革

C: 维拉帕米

D: 氟桂利嗪

答案: D

48. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年。体检：血压 156 / 96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利控制血压。

A: 氨氯地平

B: 缬沙坦

C: 吲达帕胺

D: 美托洛尔

答案: B

49. 盐酸多柔比星属于

A: 抗代谢类抗肿瘤药物

B: 生物碱类

C: 抗肿瘤抗生素类

D: 烷化剂

答案: C

50. 急性化脓性中耳炎的局部治疗方案, 正确的是()

- A: 鼓膜穿孔前可使用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，鼓膜穿孔后可用 2%酚甘油滴耳，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗
- B: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，再用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，以防止进一步感染
- C: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗
- D: 鼓膜穿孔前可先用 3%过氧化氢溶液彻底清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液，鼓膜穿孔后可使用 2%的酚甘油滴耳继续治疗

答案：C

51. 中毒后可用等剂量维生素 B

- A: 乙胺丁醇
- B: 对氨基水杨酸
- C: 利福平
- D: 异烟肼

答案：D

52. 不可用于降低眼压的药物是

- A: 利福平滴眼剂
- B: 卡替洛尔滴眼剂
- C: 拉坦前列素滴眼剂
- D: 毛果芸香碱滴眼剂

答案：A

53. 法莫替丁可用于治疗

- A: 急慢性胃炎
- B: 十二指肠穿孔

C: 十二指肠溃疡

D: 心肌梗死

答案: C

54. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 吉西他滨

B: 顺铂

C: 奥沙利铂

D: 泼尼松

答案: B

55. 患者，男，45 岁，因“咳嗽、咳痰 1 周，发热 2 天”入院，诊断为社区获得性肺炎，两次痰培养为金黄色葡萄球菌(MSRA)，适合选用的是

A: 万古霉素

B: 阿莫西林

C: 苄星青霉素

D: 双氯西林

答案: A

56. 肾功能不全者不需要调整剂量的药物是

A: 氯霉素

B: 红霉素

C: 青霉素

D: 罗红霉素

答案: B

57. 患者，女，42 岁。双掌指关节、腕关节肿痛伴晨僵 1 月，诊断为类风湿关节炎，给予抗风湿药治疗，下列不属于该类药物的是

- A: 司来吉兰
- B: 萘普生
- C: 糖皮质激素
- D: 依那西普

答案：A

58. 抗真菌药与糖皮质激素合用于皮肤病，感染症状消失后，应

- A: 再持续使用 48h
- B: 再持续 1~2 周
- C: 立即停药，不得再用
- D: 再持续使用 1 个月

答案：B

59. (2018 年真题) 关于钙通道阻滞剂 (CCB 类) 药物的说法，错误的是 ()

- A: CCB 类主要扩张小动脉, 对小静脉和毛细血管作用较小, 可导致下肢或脚踝水肿
- B: 对既往有脑卒中病史的老年高血压患者, 优先选择 CCB 类降压药
- C: CCB 类对冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛无效
- D: 红霉素可显著增加硝苯地平或非洛地平的生物利用度

答案：C

60. (2020 年真题) 长期使用可引起维生素 B12 缺乏的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 头孢哌酮
- C: 阿司匹林

D: 华法林

答案：A

61. 合成五味子丙素时的中间体，降低血清谷丙转氨酶效果好的是

A: 还原型谷胱甘肽

B: 多烯磷脂酰胆碱

C: 双环醇

D: 异甘草酸镁

答案：C

62. 治疗轻度尿崩症可选用

A: 呋塞米

B: 螺内酯

C: 乙酰唑胺

D: 氢氯噻嗪

答案：D

63. 患者，女，55 岁。经皮冠状动脉介入治疗（PCI）术后一直服用他汀类药物，但是低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）未达标，医师增加了他汀类药物的剂量后，患者的 ALT 升至 120U/L，故医师拟恢复原他汀药物的剂量，并联用其他调血脂药，该患者宜联用的药物是

A: 非诺贝特

B: 氟伐他汀同德

C: 辛伐他汀

D: 依折麦布

答案：D

64. 属于 β_2 受体激动剂的是

- A: 异丙托溴铵
- B: 福莫特罗
- C: 孟鲁司特
- D: 乙酰胆碱

答案：B

65. 格列本脲的降糖作用机制是

- A: 静脉用胰岛素
- B: 二甲双胍
- C: 胰岛素皮下注射
- D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：D

66. 茶碱浓度 $42 \mu\text{g/ml}$ 时会出现

- A: 为有效的治疗浓度
- B: 呼吸、心跳停止
- C: 恶心、呕吐、失眠
- D: 心动过速、心律失常

答案：B

67. 属于广谱抗病毒药物的是

- A: 干扰素
- B: 阿昔洛韦
- C: 阿糖腺苷
- D: 奥司他韦

答案：A

68. 周某，男，31 岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

- A: 硫酸亚铁
- B: 维生素 B
- C: 叶酸
- D: 四氢叶酸

答案：A

69. 以下为广谱抗病毒药的是

- A: 更昔洛韦
- B: 利巴韦林
- C: 阿糖腺苷
- D: 碘苷

答案：B

70. 关于第一、二、三、四代头孢菌素类抗菌药物药理作用的叙述，错误的是

- A: 第四代头孢菌素对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌显示广谱抗菌活性
- B: 第一代头孢菌素对青霉素酶稳定，但可被革兰阴性菌产生的 β -内酰胺酶所破坏
- C: 第二代头孢菌素对铜绿假单胞菌无效，对多种 β -内酰胺酶较稳定
- D: 第三代头孢菌素对革兰阴性菌有较强的抗菌作用，但对 β -内酰胺酶不稳定

答案：D

71. 属于非噻吩并吡啶类二磷酸腺苷(ADP)P2Y₁₂ 受体阻断剂的是

- A: 替格瑞洛

B: 阿司匹林

C: 替罗非班

D: 双嘧达莫

答案：A

72. 雷尼替丁在使用中应注意

A: 对食管有刺激性，需整片吞服

B: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用

C: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗

D: 糖尿病患者避免使用

答案：D

73. 对小肠和结肠平滑肌无明显作用的促胃肠动力药是

A: 多潘立酮

B: 甲氧氯普胺

C: 伊托必利

D: 西沙比利

答案：A

74. 抑制 Na

A: 氨苯蝶啶

B: 呋塞米

C: 氢氯噻嗪

D: 乙酰唑胺

答案：C

75. 原形从肾脏排泄率最高的喹诺酮类药物是()

A: 环丙沙星

B: 培氟沙星

C: 氧氟沙星

D: 诺氟沙星

答案：C

76. 属于抗炎类保肝药的是

A: 多烯磷脂酰胆碱

B: 还原型谷胱甘肽

C: 异甘草酸镁

D: 双环醇

答案：C

77. 四环素类抗菌药物抗菌谱广，但无抗菌作用的是

A: 铜绿假单胞菌

B: 立克次体

C: 支原体

D: 衣原体

答案：A

78. 对鞭虫无效的药物是()。

A: 吡喹酮

B: 噻嘧啶

C: 阿苯达唑

D: 甲硝唑

答案：B

79. 属于第一代抗精神病药物的是

A: 氯丙嗪

- B: 奥氮平
- C: 氯氮平
- D: 利培酮

答案：A

80. (2016 年真题) 可用于治疗甲癣、足癣、体癣和股癣等浅表性真菌感染的药品是

- A: 特比萘芬
- B: 氟胞嘧啶
- C: 伏立康唑
- D: 两性霉素 B

答案：A

81. (2018 年真题) 紫杉醇抗肿瘤的作用机制是 ()

- A: 干扰微管蛋白的合成
- B: 抑制二氢叶酸还原酶, 使二氢叶酸不能被还原成四氢叶酸
- C: 与 DNA 发生共价结合, 使其失去活性或使 DNA 分子发生断裂
- D: 直接抑制拓扑异构酶, 并与拓扑异构酶形成复合物

答案：A

82. 患者, 女, 36 岁, 近期经常上腹灼烧痛、反酸, 疼痛多出现在上午 10 点及下午 4 点, 有时夜间痛醒。食后缓解, X 线钡餐诊断为十二指肠溃疡, 该患者宜使用的治疗药物是 ()

- A: 奥美拉唑
- B: 颠茄
- C: 甲氧氯普胺
- D: 多潘立酮

答案：A

83. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药的是（）。

- A: 维生素 B
- B: 托烷司琼
- C: 甲氧氯普胺
- D: 阿瑞吡坦

答案：C

84. 下述不属于质子泵抑制剂的是

- A: 法莫替丁
- B: 奥美拉唑
- C: 雷贝拉唑
- D: 泮托拉唑

答案：A

85. 治疗 MRSA 的首选药物是

- A: 万古霉素
- B: 林可霉素
- C: 青霉素
- D: 四环素

答案：A

86. （2019 年真题）长期使用可能导致血钾升高的降压药物是（）

- A: 贝那普利
- B: 硝普钠
- C: 氨氯地平
- D: 美托洛尔

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/208076050045007022>