

# 2022 年护理学（师）相关专业知识模考试卷

## 4

2022 年护理学（师）相关专业知识模考试卷 4

单选题（共 100 题，共 100 分）

1.急性梗阻性化脓性胆管炎的治疗原则，最主要的是

- A.纠正水、电解质紊乱
- B.使用足量有效的广谱抗生素
- C.恢复血容量
- D.改善和维持主要脏器功能
- E.紧急手术

2.细菌性肺炎的血常规检查表现为

- A.白细胞总数正常
- B.白细胞总数降低
- C.嗜酸性粒细胞增高
- D.中性粒细胞增高
- E.淋巴细胞增高

3.硫酸镁治疗妊娠高血压综合征剂量过大时，最先出现的毒性反应是

- A.头晕、血压过低
- B.呼吸减慢
- C.心率减慢
- D.膝反射减弱或消失

E.尿量过少

4.脑瘫的伴随症状中最常见的为

A.视力障碍

B.小头畸形

C.智力下降

D.癫痫

E.关节脱位

5.糖皮质激素

A.肺炎中毒症

B.上感

C.休克

D.肺炎伴肠麻痹

E.肺炎脓胸

6.穿刺引流

A.肺炎中毒症

B.上感

C.休克

D.肺炎伴肠麻痹

E.肺炎脓胸

7.停经3个月，子宫大于孕周，鉴别正常妊娠、多胎、异常妊娠的最好方法是

A.超声多普勒检查

B.腹部 X线片

C.B超检查

D.胎儿心电图检查

E.羊水中甲胎蛋白测定

8.淋病的潜伏期为

A.24小时

B.1~2天

C.3~7天

D.10~15天

E.1~2个月

9.在输注对血管刺激性强的化疗药物当出现外渗现象时，下列处理方法不正确的是

A.立即停止用药

B.局部封闭

C.冰袋局部冷敷

D.局部热敷

E.更换部位重新静脉穿刺

10.下列关于诊断性刮宫术护理要点中描述正确的是

A.术前3天禁性生活

B.注意观察休克、子宫穿孔、感染等并发症

C.刮出组织后立即进行固定保存

D.术后禁止性生活和盆浴1周

E.2周后复查

11.最能提示右心衰竭的表现是

A.水冲脉

B.左心室增大

C.肺型 P 波

D.肝颈静脉回流征阳性

E.舒张期奔马律

12.系统性红斑狼疮病人发生口腔真菌感染时，可选用的漱口液为

A.1%~4% 碳酸氢钠溶液

B.2%~3% 硼酸溶液

C.1%~3% 过氧化氢溶液

D.0.1%醋酸溶液

E.0.08%甲硝唑溶液

13.诊断肝性脑病最有价值的实验室检查是

A.血转氨酶

B.血胆红素

C.血淀粉酶

D.血糖

E.血氨

14.尿毒症最早出现的症状是

A.心血管系统症状

B.胃肠道症状

C.血液系统症状

D.呼吸系统症状

E.神经精神和肌肉系统症状

15.急性白血病病人的骨髓象是

A.多为原始细胞和幼稚细胞

B.多为中性核和中性分叶核细胞

C.多为早幼粒细胞和晚幼粒细胞

D.以淋巴细胞为主，少数幼稚淋巴细胞

E.多为中幼、晚幼粒和杆状粒细胞

16.以下治疗药物的注意事项不正确的是

A.糖皮质激素类勿擅自减药、停药，以免造成疾病治疗反跳

B.非甾体类抗炎药胃肠道反应多，宜饭后服

C.免疫抑制剂毒性较大，应定期查血象和肝功

D.抗疟药的衍生物排泄缓慢，可引起视网膜退行性病变，应定期查眼底

E.慢作用抗风湿药，其作用缓慢，副作用极少

17.有机磷农药中毒最常用的抗胆碱药阿托品，其作用是

A.缓解肌肉震颤

B.缓解肌肉抽搐

C.促使昏迷病人苏醒

D.使瞳孔缩小

E.抑制腺体分泌

18.脑出血急性期的治疗原则不正确的是

- A.保持安静，防止继续出血
- B.积极控制脑水肿，降低颅内压
- C.加强护理，防治并发症
- D.维持生命功能
- E.用抗生素，防止感染

19.周围神经病病人感觉障碍的特点是

- A.末梢型感觉障碍
- B.节段型感觉障碍
- C.传导束型感觉障碍
- D.交叉型感觉障碍
- E.皮质型感觉障碍

20.下列检查对诊断前列腺癌最有帮助的是

- A.血 AFP
- B.血 hCG
- C.血 HIV
- D.血 PSA
- E.血 ESR

21.术中因出血血压急剧下降时，应首选

- A.立即使用升压药
- B.快速输血输液，增加血容量
- C.及时补钙、钾

D.加快手术进程

E.大量使用麻醉药加深麻醉

22.尿沉淀中找到移行上皮癌细胞，下列不可考虑的情况是

A.肾细胞癌

B.输尿管癌

C.尿道癌

D.前列腺癌

E.膀胱癌

23.可诊断呼吸、心搏骤停的是

A.瞳孔缩小

B.桡动脉搏动消失

C.股动脉搏动消失

D.突然意识丧失、颈动脉搏动消失、没有呼吸动作

E.肱动脉搏动消失

24.呼吸、心搏骤停的体征是

A.瞳孔缩小

B.桡动脉搏动消失

C.股动脉搏动消失

D.突然意识丧失、颈动脉搏动消失、没有呼吸动作

E.肱动脉搏动消失

25.小儿易出现骨髓外造血的原因是

A.缺乏红骨髓

- B.骨髓造血功能尚不成熟
- C.骨髓外造血器官功能不成熟
- D.缺乏黄骨髓，造血代偿潜力很低
- E.黄骨髓过多，造血代偿潜力过高

26.下肢静脉曲张检查时，患者平卧，下肢抬高排空静脉，在大腿根部扎止血带，患者站立，立即松开止血带，若曲张静脉迅速充盈，提示

- A.深静脉不通畅
- B.小隐静脉瓣功能正常
- C.大隐静脉瓣功能异常
- D.交通静脉瓣功能正常
- E.小隐静脉瓣功能异常

27.患者女，甲亢行甲状腺次全切除术后，术后第3天患者出现手足抽搐，此时最便捷而有效的治疗是

- A.静脉注射10%葡萄糖酸钙或氯化钙10~20ml
- B.口服葡萄糖酸钙或乳酸钙2~4g
- C.口服维生素D35万~100万U
- D.口服双氢速固醇油剂
- E.停食肉类、乳品和蛋类食品

28.川崎病的治疗原则除对症、支持疗法外，要

- A.抗风湿
- B.积极寻找并避免过敏原

C.预防冠状动脉瘤及动脉栓塞

D.联合用药

E.保持关节功能

29.患者男，49岁。外伤后昏迷1小时，醒后即发现右侧肢体轻瘫，腰穿呈血性脑脊液，以后逐渐好转。最可能的诊断是

A.脑震荡

B.脑挫裂伤

C.急性硬膜外血肿

D.急性硬膜下血肿

E.脑内血肿

30.风湿性心脏病最常见的心律失常是

A.室性期前收缩

B.房性期前收缩

C.心房颤动

D.阵发性室上速

E.窦性心动过速

31.适用输卵管粘连的治疗检查

A.阴道镜检查

B.宫腔镜检查

C.腹腔镜检查

D.X线检查

E.B超检查

32.

- A.阴道镜检查
- B.宫腔镜检查
- C.腹腔镜检查
- D.X线检查
- E.B超检查

33.心肺复苏时首选药物是

- A.异丙肾上腺素
- B.肾上腺素
- C.利多卡因
- D.去甲肾上腺素
- E.阿托品

34.患者女，58岁。绝经2年阴道出血无任何不适。妇检：宫颈糜烂充血，子宫略大，附件（一），阴道脱落细胞检查为巴氏Ⅰ级。为进一步确诊，应选的检查是

- A.血CA125测定
- B.腹腔镜
- C.分段诊刮术
- D.阴道镜
- E.阴道后穹窿穿刺术

35.上尿路结石小于0.6cm，光滑，无其他并发症者，应首选

- A.输尿管镜取石术

B.

C.非手术治疗

D.体外冲击波碎石

E.经皮肾镜取石术

36.生理反射分为浅反射和深反射，深反射包括

A.角膜反射

B.腹壁反射

C.跖反射

D.膝腱反射

E.肛门反射

37.晚期食管癌的一般 X 线表现是

A.食管黏膜呈串珠样改变，食管蠕动尚好

B.食管出现充盈缺损、管腔狭窄、梗阻

C.食管下段呈光滑的鸟嘴样狭窄

D.食管呈不规则线样狭窄

E.食管移位、狭窄，黏膜正常

38.维生素 D 缺乏性手足搐搦症惊厥时首要的处理是

A.口服维生素 D

B.口服钙剂

C.给抗惊厥药

D.上、下磨牙间放压舌板

E.注射维生素 D

39.

- A.弹性固定
- B.疼痛
- C.肿胀
- D.局部压痛
- E.功能障碍

40.治疗三叉神经痛的关键是迅速有效地止痛，临床上首选的治疗方法是

- A.局部涂药
- B.介入治疗
- C.针灸
- D.药物治疗
- E.理疗

41.下列对于急性白血病患者治疗描述，错误的是

- A.骨髓移植患者安置在单间病房即可
- B.多饮水，给予别嘌醇抑制尿酸合成，预防尿酸肾病
- C.化疗过程分为诱导缓解及巩固强化治疗两个阶段
- D.化疗药物治疗患者必须定期查血常规、骨髓象
- E.化疗完全缓解的目标是白血病的症状、体征消失，血常规和骨髓象基本正常

42.水中毒治疗可选择下列哪项

- A.高渗盐水

B.

C.等渗盐水

D.5%葡萄糖溶液

E.血浆

43.临床上慢性盆腔炎和急性盆腔炎，慢性盆腔炎和急性盆腔炎的治疗方法不同。关于慢性盆腔炎的治疗，下列哪项不恰当

A.物理治疗

B.广谱抗生素静滴 2~3 周

C.中药治疗

D.透明质酸酶肌注

E.药物治疗无效者行手术治疗

44.污染伤口是指伤后几小时以内处理的伤口

A.6 小时

B.8 小时

C.10 小时

D.12 小时

E.16 小时

45.男性，83 岁。因腰痛就诊，X 线摄片证实腰椎有转移癌破坏，考虑最有可能来自前列腺癌，下列对前列腺癌诊断无意义的是

A.B 超

B.CT

C.血清 PSA 测定

D.

E.癌胚抗原测定

46.胰腺或壶腹周围癌的定位和定性诊断的相关检查是

A.血生化检查

B.免疫学检查

C.尿淀粉酶的检查

D.血清淀粉酶的检查

E.影像学的检查

47.一旦出现羊水栓塞，错误的处理措施为

A.立即给予吸氧

B.静滴宫缩素

C.监测尿量

D.给予抗生素预防感染

E.及时输入新鲜血液

48.难免流产的治疗原则是

A.清除宫腔内残留组织

B.促使胚胎及胎盘组织完全排出

C.无感染征象时不需特殊处理

D.及时进行凝血功能检查

E.卧床休息，减少刺激

49.患有下肢静脉曲张的患者，能否手术治疗，取决于

A.交通静脉瓣膜功能是否正常

B.

C.小隐静脉瓣膜功能是否正常

D.静脉瓣膜是否关闭不全

E.深静脉是否通畅

50.下列关于新生儿坏死性小肠结肠炎的临床表现，不正确的描述是

A.常有窒息史

B.腹痛引起

C.腹胀

D.呕吐

E.贫血

51.产后乳汁分泌量主要取决于

A.乳房发育情况

B.产妇的健康状况

C.产后的营养状况

D.新生儿的发育情况

E.新生儿的吸吮刺激

52.以下能反映肾功能不全的早期表现是

A.氮质血症

B.血肌酐 $>106\mu\text{mol/L}$

C.红细胞排泄率 $<50\%$

D.尿比重低而固定

E.少尿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/208117002027006132>