

目录

医学高级职称报考信息介绍	2
高级卫生专业技术资格考试专业一览表	4
结核病学（一）	10
结核病学（二）	错误！未定义书签。
结核病学（三）	错误！未定义书签。
结核病学（四）	错误！未定义书签。
结核病学（五）	错误！未定义书签。
结核病学（六）	错误！未定义书签。
历年真题汇编（一）	错误！未定义书签。
历年真题汇编（二）	错误！未定义书签。
历年真题汇编（三）	错误！未定义书签。

医学高级职称报考信息介绍

高级卫生专业技术资格考试组织实施

委托省医学学术交流管理中心承担考试的有关具体工作。各地负责当地考试的组织、管理和实施工作，有关的具体工作另行通知。

评审卫生高级专业技术资格的考试，改用人机对话的方式是职称工作的一项重大改革。各单位要高度重视、加强领导、精心组织，认真细致地做好有关工作，确保考试工作的顺利完成。在工作中遇到的情况和问题，请及时与当地卫生厅人事处联系。

高级卫生专业技术资格考试报名时间

高级卫生专业技术资格考试考试报名时间由各地卫生部门安排的，全国不统一时间。

高级卫生专业技术资格考试报名条件

（一）正高申报条件

- 1、取得大学本科以上学历后，受聘副高职务 5 年以上。
- 2、大学普通班毕业以后，受聘副高职务 7 年以上。

（二）副高申报条件

- 1、获得博士学位后，受聘中级技术职务 2 年以上；
- 2、取得大学本科以上学历后，受聘中级职务 5 年以上；
- 3、大学普通班毕业后，受聘中级职务 5 年以上；
- 4、大学专科毕业后，取得本科以上学历（专业一直或接近专业），受聘中级职务 7 年以上；

5、大专毕业，受聘中级职务 5 年以上；

6、大专毕业，受聘中级职务 7 年以上；

7、护理专业中专毕业，从事临床护理工作 25 年以上，取得护理专业的专科以上学历，受聘中级职务 5 年以上，可申报副主任护师任职资格。（此信息仅供参考，实际情况以当地报考公告为准）

高级卫生专业技术资格考试专业设置

考试共设 96 个专业，申报对象是必须按申报评审的专业参加考试，并具备想要的执业医师、执业护士资格。

申报社区卫生高级专业技术资格的临床、中医类人员，应分别参加全科医学，全科医学（中医类）专业的考试，其他人员可选择相应专业参加考试。申报综合组评审的人员，先参加本专业的考试，同时须加试卫生管理知识。

高级卫生专业技术资格考试专业一览表

注：仅供参考，具体申报专业请考生参照当地专业申报目录。

序号	考试专业	下载	要求具备执业资格	备注
1	全科医学	副高级	临床	
		正高级		
2	内科学	副高级	临床	
		正高级		
3	心血管内科学	副高级	临床	
		正高级		
4	呼吸内科学	副高级	临床	
		正高级		
	消化内科学	副高级	临床	
		正高级		
	肾内科学	副高级	临床	
		正高级		
	神经内科	副高级	临床	
		正高级		
	内分泌学	副高级	临床	
		正高级		
	血液病学	副高级	临床	
		正高级		
10	传染病学	副高级	临床	
		正高级		
11	急诊医学	副高级	临床	
		正高级		
12	普通外科学	副高级	临床	
		正高级		
13	骨外科学	副高级	临床	
		正高级		
14	胸心外科学	副高级	临床	
		正高级		
15	神经外科学	副高级	临床	
		正高级		
16	泌尿外科学	副高级	临床	
		正高级		
17	小儿外科学	副高级	临床	
		正高级		
18	烧伤外科学	副高级	临床	

		正高级	
19	整形外科 学	副高级 正高级	临床
20	康复医学	副高级 正高级	临床
21	妇产科学	副高级 正高级	临床
22	计划生育	正高级	临床 限评审正高
23	儿科学	副高级 正高级	临床
24	眼科学	副高级 正高级	临床
25	耳鼻咽喉科 学	副高级 正高级	临床
26	皮肤与性病 学	副高级 正高级	临床
27	精神病学	副高级 正高级	临床
28	肿瘤内科 学	副高级 正高级	临床
29	肿瘤外科 学	副高级 正高级	临床
30	肿瘤放射治疗 学	副高级 正高级	临床
31	放射医学	副高级 正高级	临床
32	超声医学	副高级 正高级	临床
33	核医学	副高级 正高级	临床
34	麻醉学	副高级 正高级	临床
35	病理学	副高级 正高级	临床
36	临床医学检验临床基础 检	副高级 正高级	临床
37	临床医学检验临床化 学	副高级 正高级	临床
38	临床医学检验临床免 疫	副高级 正高级	临床
39	临床医学检验临床血 液	副高级	临床

		正高级	
40	临床医学检验临床微生物	副高级 正高级	临床
41	口腔医学	副高级 正高级	口腔
42	口腔内科学	副高级 正高级	口腔
43	口腔颌面外科学	副高级 正高级	口腔
44	口腔修复学	副高级 正高级	口腔
45	口腔正畸学	副高级 正高级	口腔
46	职业卫生	副高级 正高级	公卫
47	环境卫生	副高级 正高级	公卫
48	营养与食品卫生	副高级 正高级	公卫
49	学校卫生与儿少卫生	副高级 正高级	公卫
50	放射卫生	副高级 正高级	公卫
51	传染性疾病预防控制	副高级 正高级	公卫
52	慢性非传染性疾病控制	副高级 正高级	公卫
53	地方病控制	副高级 正高级	公卫
54	寄生虫病控制	副高级 正高级	公卫
55	健康教育与健康促进	副高级 正高级	公卫
56	卫生毒理	副高级 正高级	公卫
57	妇女保健	副高级 正高级	临床、公卫
58	儿童保健	副高级 正高级	临床、公卫
59	护理学	副高级 正高级	护士

60	内科护理	副高级 正高级	护士	
61	外科护理	副高级 正高级	护士	
62	妇产科护理	副高级 正高级	护士	
63	儿科护理	副高级 正高级	护士	
64	医院药学	副高级 正高级		
65	药物分析	正高级 副高级		限评审正高
66	临床营养	正高级		
67	临床医学检验临床基础检	副高级 正高级		
68	临床医学检验临床化学技	副高级 正高级		
69	临床医学检验临床免疫技	副高级 正高级		
70	临床医学检验临床血液技	副高级 正高级		
71	临床医学检验临床微生物	副高级 正高级		
72	心电图技术	副高级		限评审副高
73	脑电图技术	副高级		高
74	病理学技术	副高级 正高级		限评审副高
75	放射医学技术	副高级 正高级		
76	超声医学技术	副高级 正高级		
77	核医学技术	副高级 正高级		
78	康复医学技术	副高级 正高级		
79	口腔医学技术	副高级 正高级		
80	理化检验技术	副高级 正高级		
81	微生物检验技术	副高级 正高级		

82	全科医学（中医类）	副高级 正高级	中医	
83	中医内科学	副高级 正高级	中医	
84	中医妇科学	副高级 正高级	中医	
85	中医儿科学	副高级 正高级	中医	
86	中医肿瘤学	副高级 正高级	中医	
87	中医外科学	副高级 正高级	中医	
88	中医眼科学	副高级 正高级	中医	
89	中医耳鼻喉科学	副高级 正高级	中医	
90	中医皮肤与性病学	副高级 正高级	中医	
91	中医骨伤学	副高级 正高级	中医	
92	中医推拿学	副高级 正高级	中医	
93	中医针灸学	副高级 正高级	中医	
94	中西医结合内科	副高级 正高级	中医	
95	中西医结合外科	副高级 正高级	中医	
96	中药学	副高级		

高级卫生专业技术资格考试形式和题型

全部采用人机对话形式，考试时间为 2 个小时（卫生管理知识单独加试时间为 1 时）。考试题型为单选题、多选题和案例分析题 3 种，试卷总分为 100 分。

高级卫生专业技术资格考试总分数及分数线

总分数 450-500 分，没有合格分数线的，排名前 60%为合格。其中的 40%为优秀。

高级卫生专业技术资格考试范围

考试以专业技术实践工作能力为主，不指定参考复习用书，可参考“卫生高级专业技术资格考试”高级卫生专业技术资格考试练习

要求每个参加考试的人员，认真进行人机对话考试方式的练习。

高级卫生专业技术资格考试效用 评审卫生高级专业技术资格的考试，是申报评审卫生高级专业技术资格的必经程序，作为评审卫生高级专业技术资格的重要参考依据之一，考试成绩当年有效。

高级卫生专业技术资格人机对话考试题型说明

一、副高：单选题、多选题和案例分析题 3 种题型。

二、正高：多选题和案例分析题 2 种题型。

以实际考试题型为准。

备注：一、超声医学专业：涵盖了心脏方向和非心脏方向的试题，单选题和多选题为必答题，案例分析题考生可以自行选择方向作答。

二、胸心外科专业：涵盖了胸外科方向和心外科方向的试题，单选题和多选题为必答题，案例分析题考生可以自行选择方向作答。

结核病学(一)

单项选择题：以下每道考题有五个备选答案，请选择一个最佳的答案。

- 1、男性，60岁，6年前因痰结核菌阳性而诊为继发性肺结核，当时予以1HRE治疗4个月，因病情好转而自动停药。3个月后低热、咳嗽，小量咯血再次自行用原方案治疗，症状改善。此后不规则应用过HRES等药物治疗，症状时好，时坏。半年前、咯血1次，再次采用上述方案治疗，体温升高，肺部病变增多，出现多个空洞，两肺门上提。此病例治疗过程中存在的最大问题为
- A. 初次治疗未采用含吡嗪酰胺方案
 - B. 初次治疗时疗程不足
 - C. 第一次恶化时治疗不彻底
 - D. 初次治疗时联合的药物种类和疗程均

答案：D

- 2、下述关于传染病流行病学特征的描述，哪项是错误的
- A. 霍乱是外来性传染病
 - B. 发病率高于一般水平为流行
 - C. 流行范围超过国界或洲界时为大流行
 - D. 短时间内病例集中发生为暴发
 - E. 不同人群中的分布不属于流行病学特征
- 答案：E

3、原发性肺结核 X线胸片表现为

- A. 结节状阴影
- B. 多态性
- C. 斑点状阴影
- D. 哑铃型阴影
- E. 肺门淋巴结肿大

答案：D

4、男性，52岁。因咳嗽，咳痰，偶有痰血及午后自觉潮热2周就诊。X线检查见右上肺浓密阴影，内有2cm×3cm不规则空洞，放射科报告肺结核伴空洞形成。PPD试验阴性，2周后重复试验仍阴性。应，选择下列哪项处理

- A. 抗结核治疗
- B. 磁共振检查
- C. 高分辨CT(HRCT)检查
- D. 纤维支气管镜检查
- E. 结核杆菌培养

答案：D

5、结核病的主要传染源是

- A. 初始耐药患者

- B. 继发性肺结核患者
- C. 肺结核菌阳性患者
- D. 活动性肺结核
- E. 痰涂片阳性

答案： B

6、下列哪项检查能清晰显示各型肺结核病变特点和性质

- A. 色谱技术检测
- B. 胸部 X 线检查
- C. 正侧位胸片
- D. 胸部 CT
- E. 支气管肺活检

答案： D

7、女性， 35 岁。患肺结核已 5 年，治疗不规则。近来痰菌 (++)，胸片示两上肺斑片状阴影，伴不规则透亮区。在治疗时，下列哪条意见是不正确的

- A. 参考用药史选择有效或未用过的药物
- B. 等待药物敏感试验报告后再作调整
- C. 参考病灶的情况
- D. 选择最新、最有效药物逐个试加，组成新方案
- E. 必须保证复治方案中有 2 个或 2 个以上预计敏感药物 答案： D

8、男性， 48 岁。因咳嗽、右上肺块影行纤维支气管镜检查，经支气管肺活组织检查 (TBLB)，病理组织学见典型结核结节。查房时上级医师提问此种改变与结核杆菌哪种成分有关

- A. 糖蛋白
- B. 蛋白质
- C. 糖
- D. 矿物质
- E. 类脂质

答案： E

9、结核病主要的免疫保护机制是

- A. 变态反应
- B. T 细胞

- C. 淋巴因子
- D. 体液免疫
- E. 细胞免疫

答案： E

10、女性， 30 岁。患者 20 岁时曾患胸膜炎，服药 3 月即自行停药。此次分娩后高热不退，胸片示两肺弥漫性、大小、密度和分布均较一致的粟粒状阴影，拟诊粟粒性肺结核。上级医师查房时强调化学治疗方案必须联合主要作用于细胞内细菌的药物。下列药物中哪种对细胞内细菌无作用

- A. 利福平
- B. 异烟肼
- C. 链霉素
- D. 利福喷汀
- E. 吡嗪酰胺

答案： C

11、女性， 45 岁，近 2 年来反复出现多发口腔溃疡，两个月前劳累后出，现左膝关节肿痛，双下肢皮肤结节红斑伴疼痛，一周前突发右眼视物不清，化验 ESR 增快， ANA 阴性，最可能的诊断是

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 类风湿关节炎
- C. 白塞病
- D. 结核病
- E. 干燥综合征

答案： A

12、不属于有机磷农药中毒表现的是

- A. 无汗，尿潴留
- B. 恶心、呕吐、头昏、头痛
- C. 视力模糊、多涎
- D. 双肺湿啰音，肺水肿
- E. 肌束震颤，大便失禁

答案： B

13、肺结核患者痰结核菌检查连续 2 个月由阳性转为阴性，表示

- A. 痊愈
- B. 不必休息

- C. 病变静止
- D. 无传染性
- E. 可停用抗结核药物

答案： D

14、结核分枝杆菌感染后建立充分变态反应需要

- A. 12~14周
- B. 10~15周
- C. 1~2周
- D. 4~8周
- E. 2~3周

答案： D

15、男性， 35岁。某市企业职工。因发热、咳嗽、痰中带血 1周就诊， X线检查示右上肺大片阴影。医生嘱作结核菌素试验，患者询问该试验的意义。下列解释中哪一种是正确的

- A. 人型结核杆菌的结核蛋白，阳性反应表示感染了结核杆菌；若排除免疫抑制等影响因素，阴性可以除外结核病
- B. 人型结核杆菌的结核蛋白，阳性反应表示患活动性结核病
- C. 人型结核杆菌的类脂质，阳性反应表示感染了结核杆菌
- D. 人型结核杆菌的类脂质，阳性反应表示活动性结核病
- E. 牛型结核杆菌的结核蛋白，阴性反应肯定排除结核病

答案： A

16、结核病的基本病理变化是

- A. 粒细胞浸润
- B. 炎症渗出、增生、干酪样坏死
- C. 纤维壁增生
- D. 炎症渗出
- E. 干酪性坏死

答案： B

17、男， 31岁，因发热，头痛，呕吐 1周，确诊为结核性脑膜炎，其治疗除降颅压外，抗结核治疗应选择的药物依次为

- A. 异烟肼，吡嗪酰胺，利福平，乙胺丁醇
- B. 吡嗪酰胺，乙胺丁醇，异烟肼，利福平
- C. 异烟肼，利福平，乙胺丁醇，吡嗪酰胺
- D. 异烟肼，乙胺丁醇，吡嗪酰胺，利福平

E. 利福平, 异烟肼, 乙胺丁醇, 吡嗪酰胺 答案: A

18、肺结核较大的空洞病变听诊可闻及

- A. 呼吸音减弱
- B. 支气管呼吸音
- C. 听诊呼吸音增强
- D. 呼吸音消失
- E. 局限性哮鸣音

答案: B

19、为了便于国际间结核感染率的比较, 推荐使用

- A. 硬结为特异性变态反应
- B. 卡介苗普遍接种
- C. 选择左侧前臂
- D. 结核菌素试验
- E. 结核菌素为纯蛋白衍生物

答案: E

20、出现肺结核可疑症状的患者要进行哪项检查

- A. 血常规
- B. 痰涂片检查
- C. 胸部 CT
- D. 痰抗酸杆菌和胸部 X 线检查
- E. 支气管纤维镜

答案: D

21、男, 25岁, 因大面积深度烧伤入院, 4天后畏寒, 寒战, 发热, 烦躁, 体温 40.0°C , 心率 40次/分, 血压 $8/6\text{kPa}$ ($60/45\text{mmHg}$), 10小时尿量 50ml, 血象, 白细胞总数 $20 \times 10^9/\text{L}$, 中性 94%, $\text{BE} -3.5\text{mmol}/\text{L}$, CO_2CP 为 $10\text{mmol}/\text{L}$, $\text{ALT} 60\text{IU}/\text{L}$, 总胆红素 $34\mu\text{mol}/\text{L}$ 。在判断该病人的病原菌时, 下列哪一个可能性较低

- A. 大肠埃希菌
- B. 变形杆菌属

- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 表皮葡萄球菌
- E. 铜绿假单胞菌 答案： D

22、高危人群出现下列情况应考虑艾滋病的可能，下列哪项描述有误 A. 体重下降 10%以上者
B. 慢性咳嗽或腹泻 1 个月以上
C. 间歇或持续发热 1 个月以上 D. 双侧腹股沟淋巴结肿大 E. 反复出现带状疱疹或慢性播散性单纯疱疹
答案： D

23、HBV 感染者血清中一般情况下哪种颗粒最少
A. 核状颗粒
B. 丝状颗粒
C. 棒状颗粒
D. 小球形颗粒
E. Dane 颗粒 答案： E

24、单一抗结核药物中早期杀菌力最强者是
A. 利福平
B. 链霉素
C. 利福喷丁
D. 乙胺丁醇
E. 异烟肼 答案： E

25、确诊肺结核的主要的方法是
A. 结核菌素试验
B. 痰结核分枝杆菌检查
C. 免疫学方法检测抗原
D. 卡介苗接种
E. 支气管镜检查
答案： B

26、女， 20 岁，午后发热伴咳嗽，痰中带血 1 周。体检：左肩胛间区有湿啰音，血沉 50mm / L 第 1 小时末，白细胞 $10.9 \times 10^9 / L$ ，中性 70%，胸片示左上肺斑片状阴影，其中有 $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ 透光区，最可能的诊断是
A. 支原体肺炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/208132034054006033>