

2024 河南省遂平县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题大全（模拟题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 饮酒后酒精除了影响神经系统、心血管系统的功能外，还会影响药物的疗效作用和毒副作用。因此，在服用药物时应该考虑酒精对药物的影响。

- A: 出现蛋白尿
- B: 血压升高
- C: 嗜睡
- D: 痛风急性发作

答案：D

2. 为下列各类慢性阻塞性肺病治疗药物选择合适的代表药，白三烯受体阻断剂

- A: 扎鲁司特
- B: 异丙托溴铵
- C: 沙丁胺醇
- D: 茶碱

答案：A

3. （2017 年真题）患者，男，72 岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入沙丁胺醇气雾剂 100 μ g prn 吸入，氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg prn 舌下含服治疗。

- A: 非洛地平
- B: 普萘洛尔
- C: 缬沙坦
- D: 维拉帕米

答案：C

4. 患者女 45 岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片 20mgbid，甲硝唑片 0.4gbid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 0.6gbid。

- A: 维生素 B12 缺乏
- B: 维生素 B6 缺乏
- C: 维生素 B2 缺乏
- D: 维生素 A 缺乏

答案：A

5. 患者接受索拉非尼治疗时，药师应重点监测的不良反应是（）

- A: 肺纤维化
- B: 心脏毒性
- C: 生殖系统毒性
- D: 肝脏毒性

答案：C

6. 6 岁以下的儿童应该慎用的抗过敏药品是

- A: 氯雷他定
- B: 依巴斯汀
- C: 庆大霉素
- D: 四环素

答案：B

7. 表现为"牛肉样舌"的疾病为

- A: 再生障碍性贫血
- B: 淋巴瘤
- C: 缺铁性贫血
- D: 巨幼细胞性贫血

答案：D

8. 患者，女，65 岁，体检结果示：低密度脂蛋白胆固醇 5.7mmol/L，颈动脉粥样硬化斑块，宜选用的药物是（）

- A: 阿托伐他汀
- B: 甲巯咪唑
- C: 氢氯噻嗪
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：A

9. 抑郁症患者的核心症状为（）

- A: 心境低落
- B: 认知功能损害
- C: 意志活动减退
- D: 思维迟缓

答案：A

10. 在药物信息(MI)源中，文献资料的数量最大的是

- A: 互联网站
- B: 一级信息源
- C: 数据库

D: 二级信息源

答案: B

11. 患者静脉滴注两性霉素 850mg，临床药师建议两性霉素 B 应该调节至适当的滴注速度。

A: 患者家属

B: 护士

C: 患者

D: 医生

答案: B

12. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件，具有

A: 技术性、有效性和经济性

B: 经济性、法律性和合理性

C: 技术性、经济性和合法性

D: 法律性、技术性和经济性

答案: D

13. 以健康受试者进行初步的临床药理学及人体安全性评价是指

A: III期临床试验

B: II期临床试验

C: 临床预试验

D: I期临床试验

答案: D

14. 下列疾病中，WHO 视为艾滋病最常见的机会性感染的是

A: 腹泻

B: 卡氏肉瘤

C: 肺炎

D: 结核病

答案：D

15. 治疗胆囊炎的药物需选用

A: 质子泵抑制剂

B: H₂ 受体阻断剂

C: 消炎利胆片

D: M 受体激动剂

答案：C

16. 下列临床试验分期中，属于上市后药品临床再评价阶段的是

A: I 期临床试验

B: IV 期临床试验

C: III 期临床试验

D: IIa 期临床试验

答案：B

17. (2016 年真题) 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量

B: 每次调整 1-4 单位

C: 每 3-5 天调整 1 次

D: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存

答案：D

18. 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用的止吐治疗方案是

- A: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予阿瑞吡坦和地塞米松
- B: 化疗联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予地塞米松或昂丹司琼
- C: 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药
- D: 化疗前使用阿瑞吡坦，化疗后需要继续使用止吐药

答案：A

19. 可提示轻度黄疸的是

- A: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$
- B: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- C: $>342 \mu\text{mol/L}$
- D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案：B

20. 应报告药品引起的严重、罕见或新的不良反应的是

- A: 上市 5 年以上的药品
- B: 上市 5 年以内的药品
- C: 国家重点监测的药品
- D: 上市 3 年以内的药品

答案：A

21. 下列哪种药对强心苷类中毒引起的快速型心律失常疗效最佳

- A: 苯妥英钠
- B: 阿托品
- C: 普萘洛尔
- D: 普鲁卡因胺

答案：A

22. 食入何种物质对抗高血压药有影响

- A: 食盐
- B: 蛋白质
- C: 脂肪
- D: 食醋

答案：A

23. 给予非甾体解热镇痛药的依据是

- A: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D
- B: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素
- C: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛
- D: 有助于合成红细胞

答案：C

24. 药师应及时向患者交待有关用药的注意事项，以避免误用药物，减轻患者不必要的恐慌，提高用药依从性。根据患者用药情况，发药时药师应有针对性的提示患者各类药物的应用注意事项。

- A: 患者一?
- B: 患者三?
- C: 患者二?
- D: 患者四?

答案：A

25. 口服避孕药妇女所致心肌梗死，在吸烟人群中危险性加大

- A: 药物制剂因素
- B: 生活和饮食习惯
- C: 生理因素

D: 药物的使用

答案：B

26. 可吸附砷、沉淀汞的是

A: 鸡蛋白

B: 3%~5%鞣酸溶液

C: 1%氯化钠溶液

D: 药用炭混悬液

答案：A

27. 有关噻托溴铵干粉吸入剂（吸乐装置）正确使用操作：①拉开防尘帽，打开吸嘴，从包装中取出 1 粒胶囊，将胶囊放入中央室内，合上吸嘴直至听到一声“咔嗒”声；②尽量呼气（避开吸嘴），用口唇包裹住吸嘴，保持头部垂直，缓慢深吸气，屏住呼吸，约 10 秒后慢慢呼气；③漱口，去除咽部残留药物；④手持吸入器将吸嘴朝上，将刺针按钮完全按下 1 次；⑤擦拭吸嘴，再次打开吸嘴，取出胶囊壳，关闭吸嘴和防尘帽。正确的操作步骤是

A: ①②③④⑤

B: ⑤④②①③

C: ②④①⑤③

D: ①④②⑤③

答案：D

28. 具有肝毒性和性功能障碍不良反应，与其他药物同服时容易影响后者的血药浓度，不应成为该类药物首选的是

A: 硫糖铝

B: 西咪替丁

C: 埃索美拉唑

D: 莫沙必利

答案: B

29. 患者，女，34 岁，因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊。化验结果显示 TSH 增高，TT4 降低。临床诊断为甲状腺功能减退症。药师对该患者的用药指导和教育，错误的是

A: 若出现手抖、心悸、心律不齐、多汗、腹泻、体重下降、失眠和烦躁，必要时需停药，直至不良反应消失后，再从更小的剂量开始

B: 推荐使用甲状腺激素含量稳定的甲状腺素片

C: 治疗初期每 4~6 周测定甲状腺激素指标，然后根据检查结果调整给药剂量

D: 左甲状腺素钠片应于早餐前 1 小时，空腹将 1 日剂量一次性用水送服

答案: B

30. 给幼儿患者选用糖浆、水剂、冲剂等较合适，体现儿童用药原则中的

A: 严格掌握用药剂量

B: 根据儿童特点选择适宜的给药方案

C: 密切监护

D: 避免食物的影响

答案: B

31. 属于胃黏膜保护剂的是 ()

A: 铝碳酸镁

B: 埃索美拉唑

C: 法莫替丁

D: 多潘立酮

答案：A

32. 治疗发热，成人服对乙酰氨基酚，每隔 4~6 小时重复用药 1 次；1 日用量不得超过

A: 4.0g

B: 2.5g

C: 3.0g

D: 4.5g

答案：A

33. 妊娠早期妇女使用可能引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的药物是

A: 甲氨蝶呤

B: 辛伐他汀

C: 沙利度胺

D: 苯妥英钠

答案：C

34. 结核病化学治疗的基本原则是（）

A: 早期、单一、足量、规律、全程

B: 早期、联合、足量、规律、全程

C: 早期、联合、适量、规律、全程

D: 早期、单一、适量、规律、全程

答案：C

35. 患者，女，33 岁，因“近期阴道分泌物增多，呈鱼腥臭味，并伴有外阴瘙痒，且性交后症状加重”前来就诊。

A: 输卵管炎

B: 急性尿道炎

C: 外阴阴道假丝酵母菌病

D: 细菌性阴道病

答案: D

36. 下列哪种药物不会引起丙氨酸氨基转移酶 (ALT、GPT) 升高 ()。

A: 克林霉素

B: 阿昔洛韦

C: 氟康唑

D: 硝苯地平

答案: D

37. 可了解工作效果、并为之后工作的进一步完善的是

A: 对问题进行确定并归类

B: 形成答案并以口头形式提供给询问者

C: 随访了解效果，并建立档案

D: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

答案: C

38. 不宜与中成药虎骨酒、人参酒、舒筋活络酒同服的药品是

A: 地高辛

B: 可待因

C: 氨茶碱

D: 氯苯那敏

答案: D

39. 下列药物中，一般不会呈现肝毒性的药物是

A: 氯丙嗪

B: 异烟肼

C: 水杨酸

D: 青霉素类

答案: D

40. 给予(透析患者)维生素 B、维生素 C 的依据是

A: 有助于机体合成红细胞

B: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D

C: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素

D: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛

答案: C

41. 成年人血清中高密度脂蛋白胆固醇含量是

A: 0.56~1.70mmol / L

B: 3.1~5.7mmol / L

C: 2.1~3.1mmol / L

D: 1.03~2.07mmol / L

答案: D

42. 使患者可清晰看到咨询药师的是

A: 环境舒适

B: 适当隐秘

C: 位置标志明确

D: 配备必备设备

答案: C

43. IV 期临床试验样本数为

A: 20~30 例

B: 常见病 $\geq$ 1000 例

C: 100~300 例

D: 常见病 $\geq$ 2000 例

答案: D

44. 以下叙述中，处方审核结果可判定为“超常处方”的是

A: 使用“遵医嘱”字句

B: 无正当理由超说明书用药

C: 联合用药不适宜

D: 字迹难以辨认

答案: B

45. 患者，男性，35 岁，因间断上腹痛 5 年、加重 1 周来诊。患者自 5 年前开始间断出现上腹胀痛，空腹时明显，进食后可自行缓解，有时夜间痛醒，无放射痛，有暖气和反酸，常因进食不当或生气时诱发，每年冬春季节易发病。1 周前因吃凉白薯后病情再犯，腹痛较前加重。发病以来无恶心、呕吐和呕血，饮食尚可，二便正常，无便血和黑便，体重无明显变化。既往体健，无肝肾疾病及胆囊炎和胆石症病史，无手术、外伤和药物过敏史，无烟酒嗜好。

A: 遗传因素

B: 化学物质的刺激

C: 吸烟

D: 胃窦部幽门螺杆菌感染

答案: D

46. 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

- A: 每天用药最多不应超过 6 次，用药不超过 3 天
- B: 每天用药最多不应超过 5 次，用药不超过 3 天
- C: 每天用药最多不应超过 3 次，用药不超过 3 天
- D: 每天用药最多不应超过 4 次，用药不超过 3 天

答案：D

47. 有关"书写处方药品剂量与数量"的叙述中，最正确的是

- A: 按照药品说明书
- B: 不能超过药品说明书中的用量
- C: 以阿拉伯数字书写
- D: 以罗马数字书写药品用量

答案：C

48. 引起急性支气管炎的常见病原体是

- A: 铜绿假单胞菌
- B: 肺炎链球菌
- C: 结核杆菌
- D: 呼吸道合胞病毒

答案：D

49. 患者，男，25 岁，咳嗽、咳痰伴胸痛，发热，体温 38.5℃，入院检查肺部湿啰音，WBC $12 \times 10^9 / L$ ，X 线显示片状、斑片状浸润性阴影及间质性改变，不伴胸腔积液。

- A: 头孢羟氨苄
- B: 头孢克洛
- C: 红霉素
- D: 头孢噻肟

答案：A

50. 药物经济学研究的 4 种方法的主要差别在于

- A: 对于用药结果的不同测量
- B: 用药成本的不同测量上
- C: 计算不同类型的成本
- D: 所采用的实验研究方法不同

答案：A

51. (在乳汁中排泄的药物)地西泮可分布在乳汁中的机制是地西泮

- A: 呈弱酸性
- B: 呈弱碱性
- C: 在脂肪与水中都有一定的溶解度
- D: 脂溶性高

答案：D

52. 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的药物是

- A: 克拉维酸钾
- B: 奥美拉唑
- C: 苧丝肼
- D: 叶酸

答案：B

53. 属于 MA-B 抑制剂的是

- A: 恩托卡朋
- B: 司来吉兰
- C: 普拉克索
- D: 苯海索

答案：B

54. 患者，女，28 岁，处于哺乳期，因阴道分泌物增多、稀薄且带鱼腥臭味，就医后确诊为细菌性阴道病，首选用药方案是

- A: 咪康唑栓，阴道给药，每晚 1 粒（200mg），连用 7 日
- B: 甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚 1 次，连用 7 日
- C: 1: 2 服克林霉素 300mg，每日 2 次，连用 7 日
- D: 口服甲硝唑 400mg，每日 2 次，连服 7 日

答案：B

55. 举重运动员使用后，可短时间内急速降低体重，因此需按兴奋剂管理的药物是（）

- A: 呋塞米
- B: 普萘洛尔
- C: 缬沙坦
- D: 硝苯地平

答案：A

56. 患者，女，65 岁，诊断为房性心律失常，给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

- A: 西咪替丁抑制 CYP3A4，升高胺碘酮血浆药物浓度
- B: 西咪替丁抑制 CYP1A2，升高胺碘酮血浆药物浓度
- C: 西咪替丁诱导 CYP2C9，升高胺碘酮血浆药物浓度
- D: 胺碘酮与西咪替丁竞争 CYP2D6，减慢胺碘酮的代谢

答案：A

57. 脑出血急性期体位应注意的是（）

- A: 侧卧位
- B: 仰卧位

C: 抬高床头 15-30°

D: 俯卧位

答案: C

58. 患者，女，62 岁，医师处方如下：姓名：×××性别：女年龄：62 岁
临床诊断：2 型糖尿病、高血压 2 级、高脂血症、PCI 术后

A: 二甲双胍

B: 阿卡波糖

C: 氨氯地平

D: 氯吡格雷

答案: C

59. (2016 年真题) 以质量调整为生命年或者质量调整为预期寿命为指标开展的药物经济学评价方法属于 ()。

A: 成本-效用分析

B: 成本-效果分析

C: 成本-效益分析

D: 最小成本分析

答案: A

60. 解热镇痛药治疗头痛，首选的药物是

A: 麦角胺咖啡因片

B: 对乙酰氨基酚

C: 阿司匹林

D: 苯妥英钠

答案: B

61. 药物相互作用有发生在体内的药动学、药效学方面的作用；亦有发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

- A: 抗酸药合用四环素类
- B: 用药时同服甲氧氯普胺
- C: 阿司匹林合用格列美脲
- D: 磺胺类药与青霉素合用

答案：C

62. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是

- A: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判定疗效
- B: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗
- C: 当单药治疗无效时，可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药
- D: 剂量逐步递增，尽可能采用最小有效剂量，使不良反应减至最小

答案：A

63. 应用华法林抗凝治疗时，INR 的安全有效范围在我国通常为

- A: 2.0~3.0
- B: >3.0
- C: <2.0
- D: 2.0~2.5

答案：A

64. （2018 年真题）患者，女，71 岁，2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白（HbA1c）9.2%，空腹血糖 10.5mmol/L，餐后血糖 15.5mmol/L。

目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo，格列美脲片 2mgtidpo，罗格列酮片 2mgbidpo，甲钴胺片 0.5mgtidpo，羟苯磺酸钙胶囊 250mgbidpo。

- A: 注射胰岛素制剂时，应变换注射部位，两次注射点要间隔 2cm

- B: 在注射胰岛素制剂时,针头可重复使用
- C: 开启的胰岛素需要冷藏保存
- D: 未使用的胰岛素可以冷冻保存

答案: A

65. 对一般药品而言,安全贮存的环境可以是

- A: 室温(20~30℃)
- B: 室温(10~30℃)
- C: 室温 25℃
- D: 室温 20℃

答案: B

66. 药物相互作用使毒性增加的事例是

- A: 阿托品联用普萘洛尔
- B: 阿托品联用吗啡
- C: 铁剂联用维生素
- D: 山莨菪碱联用哌替啶

答案: D

67. 比沙可啶适用于

- A: 急性便秘
- B: 功能性便秘
- C: 习惯性便秘
- D: 低张力性便秘

答案: C

68. 患者女，68 岁体重 54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查 ALT20IU/L，血肌酐(Cr)1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5~6g，分 2~3 次给药肌酐清除率为 31~50ml/min 时剂量为每 12 小时 1g；肌酐清除率为 16~30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g；肌酐清除率为 6~15ml/min 时量为每 24 小时 0.5g；肌酐清除率≤5ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

- A: 每 12 小时 1g
- B: 每 8 小时 2g
- C: 每 24 小时 1g
- D: 每 24 小时 0.5g

答案：C

69. 使用解热镇痛药用于解热，症状未缓解应及时就诊或向医师咨询，一般不超过

- A: 3 日
- B: 2 日
- C: 4 日
- D: 1 日

答案：A

70. 药学服务的最基本的要素是

- A: 调配
- B: 与药物有关的服务
- C: 用药指导
- D: 药学知识

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

71. 下列高血压的降压目标普通高血压患者

A: $<120/80\text{mmHg}$

B: <140/90mmHg

C: <150/80mmHg

D: <130/80mmHg

答案：B

72. 属于超适应证用药的是

A: 食管癌应用顺铂、氟尿嘧啶、表柔比星进行治疗

B: 黄体酮用于排除结石

C: 肠炎、细菌感染性腹泻同时应用小檗碱、双八面体蒙脱石散、盐酸地芬诺酯进行治疗

D: I 类手术切口应用第三代头孢菌素

答案：B

73. 右心衰竭最常见的症状是

A: 腹胀、食欲不振、恶心、呕吐

B: 端坐呼吸

C: 劳力性呼吸困难

D: 夜间阵发性呼吸困难

答案：A

74. 提示：不要驾车，操作机器或高空作业等，是针对

A: 氯苯那敏

B: 铋制剂

C: 卡托普利

D: 氟西汀

答案：A

75. 前记

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 医师签名、药品金额
- B: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量
- C: 主要实验室数据
- D: 临床诊断、费别

答案：D

76. 患者，男，48 岁，患有青光眼 3 年。今日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗，应告知该患者用药后需漱口的药物是（）

- A: 沙丁胺醇气雾剂
- B: 孟鲁斯特纳咀嚼片
- C: 多索茶碱注射液
- D: 布地奈德混悬液

答案：D

77. （2018 年真题）患者，男，53 岁，因纳差、食欲减退来药店购药，药师应推荐的药品是（）

- A: 多潘立酮片
- B: 乳酶生片
- C: 酵母片
- D: 甲氧氯普胺片

答案：C

78. 中成药舒肝丸具有舒肝和胃、理气止痛的功效，与其合用会导致作用相反、降低药效的药物是

- A: 地高辛
- B: 甲氧氯普胺
- C: 复方利血平

D: 氯苯那敏

答案: B

79. 患者，女，27 岁，确诊慢性乙型肝炎 3 年。近日化验结果：HBV-DNA 2×10^5 copies/ml，ALT122U/L。拟予以抗病毒治疗，首选的药物是

A: 恩替卡韦

B: 利巴韦林

C: 阿糖腺苷

D: 泛昔洛韦

答案: A

80. 肝功能评价的方法是

A: FEV1 占预计值%

B: HAS-BLED 评分

C: CTP 分级

D: CHA₂DS₂-VASc 评分

答案: C

81. 对局部发生水疱和糜烂者可选用

A: 10%氧化锌软膏

B: 溃疡膏

C: 赛庚啶

D: 10%樟脑软膏

答案: A

82. 以下关于抑郁症的介绍错误的是

A: 及时恰当的治疗能提高抑郁症的临床治愈率

B: 该病具有高发病、高复发、高致残的特点

C: 抑郁症的好发年龄在 20~50 岁

D: 抑郁症的病因明确

答案: D

83. 可作为根除幽门螺杆菌感染的一线治疗方案是:

A: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mgbid+阿莫西林 1.0gbid+枸橼酸铋钾 0.6gbid

B: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mgqd+阿莫西林 0.5gtid

C: 埃索美拉唑 20mgqd+克拉霉素 1.0gqd+枸橼酸铋钾 0.6gbid

D: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mg tid+枸橼酸铋钾 0.6gbid

答案: A

84. 患者，女，29 岁，孕 25+6 周，近日出现乏力、困倦、食欲不振、恶心等症状。化验结果为 Hb71g / L。诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是

A: 先少量缓慢静注，观察无过敏反应，1 小时后继续静脉注射余下剂量

B: 快速静脉注射

C: 口服，每次 5ml，一日 3 次

D: 先静脉注射负荷剂量，再静脉滴注余下剂量

答案: A

85. 解救经口急性铅中毒的洗胃液是

A: 3%过氧化氢

B: 1%硫酸铜

C: 1%氯化钠

D: 1%硫酸镁

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/215231011114012033>