SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

- 基础阶段 – 专业知识
- 刷题阶段 – 重点题库
- 冲刺阶段 – 押题点睛
- 考点覆盖 – 精编习题
- 紧扣考纲 – 直击考点
- 历年真题 – 押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

急诊医学测试题含答案

1、支气管哮喘和心源性哮喘鉴别困难时,应首先选用的药物是( )。

A、 麻黄碱

B、 氨茶碱

C、 吗啡

D、 肾上腺素

E、 异丙肾上腺素

答案：B

2、患者女,55 岁,中上腹痛反复发作 2 月余,伴皮肤巩膜黄染 10 天,发热 3 天(38℃~38.5℃)。体格检查。巩膜、皮肤黄染, 直接胆红素 156μmol/L,尿胆红素强阳性。为明确诊断,首选检查( )。

A、 口服胆囊造影

B、 静脉胆道造影

C、 经皮肝穿刺胆道造影

D、 逆行胰胆管造影

E、 B 型超声检查

答案：E

3、成年人 P-R 间期正常值是( )。

A、 0.11~0.20s

B、 0.12~0.20s

C、 0.08~0.20s

D、 0.10~0.20s

E、 0.06~0.10s

答案：B

4、气胸线位于外 1/4 时,肺压缩( )。

A、 25%

B、 35%

C、 50%

D、 65%

E、 75%

答案：B

5、患者男,42 岁,6 小时前于饱餐后上腹剧痛,伴恶心、呕吐。呕吐物为胃内容物,呕吐后腹痛更剧烈,如刀割样,注射阿托品止痛无效。查体:脉搏 124 次/min,血压 80/50mmHg,痛苦容貌,腹胀,全腹肌紧张、压痛、反跳痛,上腹部为主重,肠鸣音 消失,肝浊音界存在,右下腹穿刺抽出淡红色血性液,白细胞

12×109/L,血清淀粉酶 4000U/L,血钙 1.5mmol/L。经 3 小时治疗观 察,病情无好转,诊断应考虑为( )。

A、 急性胃炎

B、 胆囊穿孔,弥漫性腹膜炎

C、 溃疡病穿孔,弥漫性腹膜炎

D、 急性出血坏死性胰腺炎

E、 急性绞窄性肠梗阻

答案：D

6、患者男,70 岁。反复咳嗽、咳痰 30 年,活动后气短 12 年。动脉血气分析示:PaCO250mmHg,PaO245mmHg,防止 COPD 发展 的最有效的家庭治疗是( )。

A、 抗生素控制感染

B、 支气管舒张剂治疗

C、 吸入糖皮质激素

D、 呼吸机锻炼

E、 长期家庭氧疗

答案：E

7、肝性脑病最有意义的体征是( )。

A、 头晕

B、 腱反射亢进

C、 踝阵挛阳性

D、 巴宾斯基征阳性

E、 扑翼样震颤

答案：E

8、肾前性急性肾衰尿沉渣镜检常见管型( )。

A、 红细胞管型

B、 白细胞管型

C、 棕色管型

D、 透明管型

E、 颗粒管型

答案：D

9、关于镇静催眠药慢性中毒的治疗,正确的是( )。

A、 发现慢性中毒后,立即停药

B、 先增加剂量,再逐渐减量至停药

C、 可长期维持小剂量用药

D、 缓慢减少药量,逐渐停药

E、 以上都不正确

答案：D

10、女,28 岁。甲状腺肿大 3 年。性情急躁、怕热、多汗、心悸,食欲强但消瘦。有哮喘病史。拟行手术治疗,其术前药物准备措施应首选的是( )。

A、 单用复方碘剂

B、 单用硫脲类药物

C、 先用硫脲类药物,后加用复方碘剂

D、 单用普萘洛尔

E、 应用普萘洛尔+硫脲类药物

答案：C

11、下面能导致下腹部肿块的疾病有( )。

A、 子宫腺肌瘤

B、 子宫肌瘤

C、 异位妊娠

D、 输卵管癌

E、 以上都是

答案：E

12、女性,22 岁。月经量增多伴反复下肢紫癜 2 年,肝脾未及。血常规示:血小板 14×109/L,血红蛋白 88g/L,白细胞正常。网织 红细胞 3%,骨髓有核细胞增生活跃,巨核细胞 180 个/片,细胞产板型巨核细胞减少,应做哪项检查协助诊断?( )

A、 凝血功能

B、 酸化血清溶血试验

C、 凝血酶原时间

D、 血小板抗体 PAIgG

E、 血小板聚集试验

答案：D

13、下列哪项不是肺脓肿的 CT 表现特征?( )

A、 早期病灶 CT 上呈均匀中等密度

B、 较易显示实变阴影内早期坏死后液化

C、 空洞一般为厚壁空洞,内壁较光整

D、 增强后扫描空洞壁强化

E、 病灶治愈后常见钙化影

答案：E

14、下列关于十二指肠球后溃疡说法中错误的是( )。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/215301113201011210