2024年辽宁省义县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题真题题库附答案【基础题】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.用于治疗水肿性疾病,当起始治疗剂量未达到满意的治疗效果时,可追加剂量,每日最大剂量可达600mg但一般应控制在100mg以内的利尿剂是（）

A：布美他尼

B：呋塞米

C：依他尼酸

D：托拉塞米

答案：B

2.红霉素的主要不良反应是

A：过敏反应

B：肝损伤

C：耳毒性

D：胃肠道反应

答案：D

3.对M3受体选择性高，可避免心脏及中枢神经系统的严重不良反应，用于治疗膀胱过度活动症用药的是

A：索利那新

B：黄酮哌酯

C：托特罗定

D: 奥昔布宁

答案：A

4.长期使用应定期检查甲状腺功能的药物是

A: 胺碘酮

B: 利多卡因

C: 普罗帕酮

D: 索他洛尔

答案：A

5.下列氨基糖苷类抗菌药物中，引起耳蜗神经损伤发生率最高的是

A: 链霉素

B: 新霉素

C: 卡那霉素

D: 妥布霉素

答案：B

6.低分子量肝素发挥抗凝作用主要抑制的凝血因子是

A: 凝血酶III（AT—III）

B: 因子IXa

C: 因子Xa

D: 因子IIa

答案：C

7.以下哪种药物对心脏影响最轻

A: 肾上腺素

B: 茶碱

C: 异丙肾上腺素

D：沙丁胺醇

答案：D

8.属于芳基乙酸类的是

A：塞来昔布

B：吲哚美辛

C：阿司匹林

D：对乙酰氨基酚

答案：B

9.下列头孢菌素药物中，半衰期最长的药物是

A：头孢曲松

B：头孢克洛

C：头孢氨苄

D：头孢孟多

答案：A

10.长期大量服用维生素A会出现

A：视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

B：低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

C：视物模糊、疲乏、乳腺肿大

D：疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

答案：D

11.关于阿司匹林在心血管疾病治疗中的作用描述，错误的是

A：抑制血管损伤后内膜增生

B：可抑制血小板聚集

C：调节血脂

D：抑制细胞因子的合成

答案：C

12.（2016年真题）对血小板聚集及凝血机制无影响的药品是

A：吲哚美辛

B：罗非昔布

C：阿司匹林

D：对乙酰氨基酚

答案：D

13.有抗胆碱作用和阻断 α 受体的抗心律失常药是

A：奎尼丁

B：利多卡因

C：维拉帕米

D：普萘洛尔

答案：A

14.硝酸酯类、β 受体阻断剂、Ca2+通道阻滞药治疗心绞痛的共同作用是

A：缩小心室容积

B：降低心肌耗氧量

C：减慢心率

D：扩张冠状动脉

答案：B

15.关于钙通道阻滞剂(CCB类)药物的说法错误的是()

A：CCB类对冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛无效

B：CCB类主要扩张小动脉,对小静脉和毛细血管作用较小,可导致下肢或脚踝水肿

C：对既往有脑卒中病史的老年高血压患者,优先选择CCB类降压药

D：红霉素可显著增加硝苯地平或非洛地平的生物利用度

答案：A

16.阿片类药物可影响患者驾驶能力属于

A：认知障碍

B：尿频、尿急、尿潴留

C：便秘、恶心、镇静功能受损

D：身体和精神依耐性

答案：A

17.患者，男，35岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

A：蔗糖铁

B：硫酸亚铁

C：琥珀酸亚铁

D：叶酸

答案：A

18.属于白三烯受体阻断剂的是

A：孟鲁司特

B：奥关拉唑

C：乙酰半胱氨酸

D：右美沙芬

答案：A

19.氟尿嘧啶的前体药物，对结肠和直肠癌疗效较高

A：羟喜树碱

B：来曲唑

C：卡莫氟

D：甲氨蝶呤

答案：C

20.患者，女，56岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食、增加运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片20mg/d治疗。服药期间应监测血生化指标，其中超过正常值上限10倍，应立即停药的指标是()。

A：BUN

B：CK

C：Cr

D：Hcy

答案：B

21.不属于中枢性镇咳药典型不良反应的是

A：情绪激动

B：成瘾性

C：腹泻

D：心率增快

答案：C

22.静脉注射速度不宜超过50mg/min的是

A：氯化钠

B：氯化钙

C：枸橼酸钾

D: 氯化钾

答案：B

23.有关阿莫西林特点的说法正确的是()

A: 广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效

B: 口服吸收差，生物利用度小

C: 耐酸、耐酶

D: 对耐药金黄色葡萄球菌有效

答案：A

24.剂量过大会引起高铁血红蛋白血症的是

A: 硝苯地平

B: 地尔硫

C: 硝酸甘油

D: 普萘洛尔

答案：C

25.属于嘧啶类的是

A: 氟胞嘧啶

B: 制霉菌素

C: 特比萘芬

D: 卡泊芬净

答案：A

26.骨髓抑制较严重的是

A: 亚叶酸钙

B: 奥沙利铂

C: 顺铂

D：卡铂

答案：D

27.以下有关ACEI药物治疗高血压的监护叙述中，不正确的是

A：我国对ACEI在肾病方面的建议：用药初2个月血肌酐升幅大于30%～50%时应停药

B：对已接受多种或大剂量利尿剂的患者，在首剂治疗时注意低血压反应

C：对伴低钠血症、脱水、低血容量患者在首剂治疗时注意低血压反应

D：心力衰竭加重所致的咳嗽应当停用ACEI

答案：D

28.复方氨基酸注射液（6AA）与等量10%葡萄糖注射液稀释后缓慢静脉滴注，滴速为

A：滴速80～100滴/分

B：滴速20～30滴/分

C：不超过40滴/分

D：不超过15滴/分

答案：C

29.患者，男，62岁。高血压病史10年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压162/80mmHg，心率72次/分。该患者日前服用的药物处抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙D。

A：氢氯噻嗪

B：美托洛尔

C：特拉唑嗪

D：双氯芬酸

答案：A

30.患者，男，63岁，2型糖尿病病史20年，现服用二甲双胍0．5g，一日3次；阿卡波糖0．1g，一日3次；吡格列酮30mg，一日1次。既往高血压病史5年，冠心病病史5年，心功能Ⅰ级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

A：阿卡波糖

B：二甲双胍

C：罗格列酮

D：贝那普利

答案：C

31.患者，男性，46岁，经常头痛，头晕近8年。2天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压230／120mmHg。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为202／120mmHg，且气急不能平卧，心率108次／分，早搏3次／分。两肺底有湿啰音。

A：硫氰酸盐不超过100μg／ml，氰化物不超过3μmol／ml

B：硫氰酸盐不超过50μg／ml，氰化物不超过2μmoL／ml

C：硫氰酸盐不超过200μg／ml，氰化物不超过4μmol／ml

D：硫氰酸盐不超过20μg／ml，氰化物不超过1μmol／ml

答案：A

32.（2016年真题）具有成瘾性的中枢性镇咳药是

A：苯丙哌林

B：可待因

C：氯化铵

D：右美沙芬

答案：B

33.半合成青霉素类中，属于耐青霉素酶青霉素类的是()

A: 替莫西林

B: 氨苄西林

C: 羧苄西林

D: 甲氧西林

答案：D

34.下述不属于扩瞳药不良反应的是()

A: 结膜炎

B: 一过性针刺感

C: 眼压降低

D: 接触性眼睑皮肤炎

答案：C

35.对组胺H

A: 丙谷胺

B: 甲硝唑

C: 哌仑西平

D: 雷尼替丁

答案：D

36.a肾上腺素受体分布占优势的效应器是

A: 皮肤黏膜血管

B: 骨骼肌血管

C: 肾血管

D: 冠状血管

答案：A

37.治疗滴虫性阴道炎适宜使用的药物是（）

A：苄星青霉素

B：庆大霉素

C：甲硝唑

D：呋喃妥因

答案：C

38.颅内压增高和颅脑损伤、支气管哮喘、肺源性心脏病代偿失调患者禁用()。

A：吗啡

B：曲马多

C：哌替啶

D：芬太尼

答案：A

39.治疗间日疟和三日疟首选的联合方案是

A：静脉滴注奎宁

B：乙胺嘧啶+磺胺药

C：氯喹+伯氨喹

D：咯萘啶或甲氟喹

答案：C

40.（2018年真题）可用于治疗非何杰金（非霍奇金）淋巴瘤的单克隆抗体是（）

A：曲妥珠单抗

B：西妥昔单抗

C：贝伐珠单抗

D: 利妥昔单抗

答案：D

41.可用维生素B12治疗的疾病是

A: 缺铁性贫血

B: 慢性失血性贫血

C: 再生障碍性贫血

D: 神经炎

答案：D

42.患者，女，56岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食，增强运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片20mg/d治疗。

A: CK

B: BUN

C: AST

D: Cr

答案：A

43.选择性抑制COX-2的是

A: 对乙酰氨基酚

B: 塞来昔布

C: 吲哚美辛

D: 阿司匹林

答案：B

44.既能增加糖分解和减少糖生成，又能改善对胰岛素的敏感性的药物是

A：胰岛素
B：罗格列酮
C：氢氧化镁
D：二甲双胍
答案：D

45.润滑性泻药()
A：地芬诺酯
B：甘油
C：乳果糖
D：硫酸镁
答案：B

46.（2020年真题）哮喘急性发作首选的药物是
A：沙丁胺醇气雾剂
B：羧甲司坦口服液
C：布地奈德福莫特罗吸入剂
D：孟鲁司特片
答案：A

47.双香豆素与阿司匹林合用可
A：竞争性对抗
B：诱导肝药酶加速灭活，作用减弱
C：产生协同作用
D：与其竞争结合血浆蛋白
答案：C

48.使用环磷酰胺化疗，以下检查结果可能升高的是

A：白细胞计数

B：血尿酸

C：血红蛋白

D：血小板计数

答案：B

49.（2020年真题）痛风缓解期，抑制内源性尿酸生成的药物是

A：秋水仙碱

B：非布司他

C：碳酸氢钠

D：苯溴马隆

答案：B

50.煤焦油治疗银屑病的作用机制是

A：与维A酸细胞核受体有较高亲和力

B：通过角蛋白表达正常化，促进角朊细胞末端分化

C：可抑制表皮细胞的有丝分裂，使皮肤增生速率恢复正常

D：能抑制皮肤角质形成细胞的过度增生和诱导其分化，从而使银屑病表皮细胞的增生和分化得到纠正

答案：C

51.（2021年真题）血培养结果为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，首选的抗菌药物是（）

A：青霉素G

B：左氧氟沙星

C：头孢唑林

D：万古霉素

答案：D

52.下列哪种属于长效青霉素

A：阿莫西林

B：青霉素V

C：苯唑西林

D：苄星青霉素

答案：D

53.某患者，突发高热、呕吐、惊厥，数小时后出现面色苍白、四肢厥冷、脉搏细速、血压下降至休克水平。经实验室检查诊断为暴发型流脑所致的感染中毒性休克，应采取的抗休克药物为()

A：阿托品

B：酚妥拉明

C：糖皮质激素

D：右旋糖酐

答案：C

54.需停5周才能换用单胺氧化酶抑制剂的药物是

A：吗氯贝胺

B：氟西汀

C：文拉法辛

D：吡拉西坦

答案：B

55.聚乙二醇4000可用于

A：哺乳期便秘

B：炎症性肠病患者

C：果糖不耐受儿童

D: 成人及1岁以上儿童（包括1岁）便秘

答案：A

56.双香豆素应用过量可选用的拮抗药是()

A: 氨甲苯酸

B: 葡萄糖酸钙

C: 鱼精蛋白

D: 维生素K1

答案：D

57.下列属于新型非苯二氮

A: 劳拉西泮

B: 佐匹克隆

C: 地西泮

D: 阿普唑仑

答案：B

58.属于必需氨基酸，人体不能合成或合成速度不能满足人体需要的是

A: 复方氨基酸注射液(3AA)

B: 赖氨酸

C: 复方氨基酸注射液(18AA)

D: 精氨酸

答案：B

59.关于地芬诺酯的叙述，不正确的是

A: 可吸附肠内细菌及有毒气体

B: 用于急、慢功能性腹泻

C: 能提高肠张力，减少肠蠕动

D：长期应用可产生依赖性

答案：A

60.下列药物中不属于降压药的是()

A：肼屈嗪

B：利血平

C：阿利克仑

D：左旋多巴

答案：D

61.关于庆大霉素使用的叙述，错误的是

A：可静脉快速推注或静脉滴注给药

B：应定期检查尿常规、血尿素氮、血肌酐，注意患者听力变化或听力损害先兆

C：避免该药耳部滴用

D：与第一代注射用头孢菌素类合用时可能加重肾毒性

答案：A

62.治疗伤寒、副伤寒，且有耳毒性的药物是

A：青霉素

B：氯霉素

C：加替沙星

D：红霉素

答案：B

63.其缓释混悬液制剂应空腹服用的是

A：红霉素

B：阿奇霉素

C：氨曲南

D：克拉霉素

答案：B

64.以下关于胰高血糖素样肽-1受体激动剂使用的描述，错误的是

A：口服需快速通过胃肠道吸收的药物在注射本品前至少1小时服用

B：存在发生胰腺炎的风险

C：不良反应主要发生于胃肠道

D：建议与DPP-4抑制剂联用

答案：D

65.β-内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是（）

A：舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸

B：舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦

C：他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦

D：他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸

答案：C

66.低分子量肝素的作用靶点是

A：因子Ⅸa

B：因子Ⅱa

C：因子Ⅹa

D：凝血酶Ⅲ（AT—Ⅲ）

答案：D

67.下列氨基糖苷类抗菌药物中，引起耳蜗神经损伤发生率最高的是

A：妥布霉素

B：卡那霉素

C：核糖霉素

D：链霉素

答案：B

68.（2018年真题）急性化脓性中耳炎的局部治疗方案,正确的是（）

A：鼓膜穿孔前可先用3%过氧化氢溶液彻底清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液，鼓膜穿孔后可使用2%的酚甘油滴耳继续治疗

B：鼓膜穿孔前可使用3%过氧化氢溶液清洗外耳道，鼓膜穿孔后可用2%酚甘油滴耳，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

C：鼓膜穿孔前可使用2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，再用3%过氧化氢溶液清洗外耳道，以防止进一步感染

D：鼓膜穿孔前可使用2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后可先用3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

答案：D

69.属于促胰岛素分泌剂的是()。

A：那格列奈

B：阿卡波糖

C：二甲双胍

D：艾塞那肽

答案：A

70.替比夫定的作用靶点是

A：HIV-1反转录酶

B：脱氧核糖核酸聚合酶

C：HIV-1和HIV-2蛋白酶

D：神经氨酸酶

答案：B

71.（2018年真题）适应症仅应用于治疗失眠的药物是（）

A: 氟西汀

B: 地西泮

C: 苯巴比妥

D: 佐匹克隆

答案：D

72.盐酸多柔比星属于

A: 抗肿瘤抗生素类

B: 烷化剂

C: 抗代谢类抗肿瘤药物

D: 生物碱类

答案：A

73.中致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐,宜选用的止吐治疗方案是()

A: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药

B: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予2天的地塞米松或昂丹司琼

C: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予2天的阿瑞吡坦和2~3天的地塞米松

D: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

答案：B

74.可导致视神经炎和血尿酸升高的药物是()

A: 吡嗪酰胺

B: 乙胺丁醇

C: 利福平

D: 对氨基水杨酸

答案：B

75.葡萄球菌引起的感染应选用

A: 利福平

B: 夫西地酸

C: 头孢他啶

D: 阿昔洛韦

答案：B

76.原发性肾病综合征患者，在院治疗时给予“注射用甲泼尼龙40mgqd"静脉滴注，出院前调整为等效剂量的口服药物序贯治疗，适宜的方案是

A: 泼尼松片30mgq

B: 地塞米松片10mgqD

C: 泼尼松片50mgqD

D: 泼尼松片20mgqD

答案：C

77.氢氯噻嗪的利尿作用机制是

A: 抑制肾小管碳酸酐酶

B: 抑制远曲小管近端的Na

C: 抑制髓袢升支粗段的Na

D: 对抗醛固酮的K

答案：B

78.（2021年真题）属于阳离子型表面活性剂，可用于治疗咽喉炎的药物是（）e

A：氨溴索

B：度米芬

C：羟甲唑啉

D：西地碘

答案：B

79.（2018年真题）属于电解质补充药,可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是（）

A：门冬氨酸钾镁

B：多烯磷脂酰胆碱

C：异甘草酸镁

D：双环醇

答案：A

80.不宜与三环类抗抑郁药合用的是()

A：麻黄碱

B：羟甲唑啉

C：赛洛唑啉

D：酚甘油滴耳液

答案：A

81.不能用于曲霉菌感染的抗真菌药是()

A：两性霉素B

B：卡泊芬净

C：氟康唑

D：伏立康唑

答案：C

82.在动物试验中发现可引起幼龄动物软骨关节病变（损伤和水疱），儿童不推荐使用的药物是

A：氯霉素眼膏

B：红霉素眼膏

C：左氧氟沙星滴眼剂

D：阿托品滴眼剂

答案：C

83.以下关于PPI用法用量的描述，错误的是

A：奥美拉唑口服用于Hp根除时，一次40mg，一日2次

B：艾司奥美拉唑口服用于Hp根除时，一次40mg，一日2次

C：泮托拉唑静脉给药用于急性上消化道出血时，一次40mg～80mg，每日1～2次

D：泮托拉唑口服用于Hp根除时，一次40mg，一日2次

答案：A

84.磺酰脲类促胰岛素分泌药存在“继发失效”的问题，应用磺酰脲类降糖药治疗5年，患者发生继发性失效的发生率是

A：50%～60%

B：30%～40%

C：5%～15%

D：1%～5%

答案：B

85.（2019年真题）服用后易出现呃逆、腹胀和嗳气，甚至引起反跳性胃酸分泌增加的药物是（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/215321043303012033