

2024 年河北省饶阳县《执业药师之西药学专业二》资格考试完整题库附答案【考试直接用】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 与多柔比星合用或配伍可增加心脏毒性的药物是()

- A: 甲氨蝶呤
- B: 阿糖胞苷
- C: β 受体阻断剂
- D: 利福平

答案：C

2. 下列哪项不属于地西洋的注意事项

- A: 静注速度过快可引起高血压
- B: 不应连续滴注，癫痫持续状态除外
- C: 同类药之间的交叉过敏反应
- D: 可使肌无力者病情加重

答案：A

3. 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺

- A: 利多卡因
- B: 特布他林
- C: 碘化钾
- D: 普萘洛尔

答案：D

4. 属于促凝血因子活性药的是

- A: 凝血酶
- B: 卡巴克洛
- C: 氨苯甲酸
- D: 酚磺乙胺

答案：D

5. 与唑来膦酸合用可使颌骨坏死的发生率升高的药物是

- A: 萘普生
- B: 抗血管生成药
- C: 高钙食品
- D: 沙利度胺

答案：B

6. 临床首选用于治疗土拉菌病和鼠疫的抗生素为()

- A: 链霉素
- B: 阿米卡星
- C: 奈替米星
- D: 异帕米星

答案：A

7. (2015 年真题) 降糖作用迅速，被称为“餐时血糖调节剂”的降糖药是()。

- A: 普萘洛尔
- B: 格列美脲
- C: 瑞格列奈
- D: 二甲双胍

答案：C

8. 不易导致便秘或腹泻不良反应的药物是

- A: 氢氧化铝
- B: 碳酸钙
- C: 三硅酸镁
- D: 铝碳酸镁

答案：D

9. (2021 年真题) 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

- A: 替格瑞洛
- B: 氯吡格雷
- C: 双嘧达莫
- D: 利伐沙班

答案：D

10. 对曲霉无效的药物是

- A: 氟康唑
- B: 伏立康唑
- C: 两性霉素 B
- D: 伊曲康唑

答案：A

11. 对于丝裂霉素注意事项的描述，错误的是

- A: 只需要在用药期间密切监测血常规、肾功能
- B: 溶解后尽快使用，尽量避免同低 pH 的注射液配伍

C: 长期应用可抑制卵巢及睾丸功能，造成闭经或精子缺乏

D: 老年患者及肾功能不全者慎用

答案：A

12. 青霉素的抗菌谱不包括

A: 脑膜炎双球菌

B: 破伤风杆菌

C: 肺炎球菌

D: 伤寒杆菌

答案：D

13. 与细菌核蛋白体的 30s 亚基结合，抑制细菌蛋白质合成的是

A: 林可霉素

B: 四环素

C: 万古霉素

D: 青霉素

答案：B

14. 属于 P-糖蛋白的底物，提高辛伐他汀发生横纹肌溶解危险性的是

A: 红霉素

B: 利福平

C: 烟酸

D: 地高辛

答案：D

15. 属于治疗固醇性胆囊结石的是

A: 胶体果胶铋

B: 多潘立酮

C: 熊去氧胆酸

D: 山莨菪碱

答案: C

16. 患者，男，56 岁，诊断为肝性脑病Ⅳ级，建议给予该患者使用的氨基酸是

A: 支链氨基酸

B: 杂环氨基酸

C: 脂肪族氨基酸

D: 芳香族氨基酸

答案: A

17. (2019 年真题) 患者，男，34 岁，晨起出现上腹部剧烈疼痛，考虑为胃肠道平滑肌痉挛，适宜该患者使用的治疗药物是 ()

A: 溴吡斯的明

B: 多潘立酮

C: 山莨菪碱

D: 酚妥拉明

答案: C

18. 可升高高密度脂蛋白胆固醇水平的维生素是

A: 维生素 B

B: 烟酸

C: 叶酸

D: 泛酸钙

答案: B

19. 主要降三酰甘油的药物的是

- A: 硝酸甘油
- B: 胍乙啶
- C: 阿昔莫司
- D: 普萘洛尔

答案：C

20. (2021 年真题) 属于维生素 K 拮抗剂的抗凝血药物是 ()

- A: 利伐沙班
- B: 氯吡格雷
- C: 华法林
- D: 依诺肝素

答案：C

21. 氢氯噻嗪的利尿作用部位在 ()

- A: 集合管
- B: 远曲小管初段
- C: 髓袢升支粗段
- D: 肾小球

答案：B

22. 服用抗帕金森病药恩他卡朋的患者，其尿液可变成

- A: 红棕色
- B: 蓝绿色
- C: 淡绿色
- D: 深蓝色

答案：A

23. 以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者，宜使用的药物是

- A: 甘草酸二铵
- B: 还原型谷胱甘肽
- C: 多烯磷脂酸胆碱
- D: 葡醛内酯

答案：C

24. 不属于血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）类药物作用特点的是

- A: ACEI 类禁用于双侧肾动脉狭窄者
- B: ACEI 可改善左心室功能
- C: ACEI 对肾脏有保护作用
- D: ACEI 可引起反射性心率加快

答案：D

25. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 莫西沙星可覆盖社区获得性肺炎的常见病原体
- B: 莫西沙星对厌氧菌有效
- C: 莫西沙星对非典型病原体无效
- D: 莫西沙星属于氟喹诺酮类

答案：C

26. 与肝素比较，低分子量肝素的特点不包括()

- A: 半衰期长，皮下注射吸收较好
- B: 达肝素钠对延长 APTT 的作用较弱
- C: 应用期间应常规检测抗凝疗效及调整剂量
- D: 不易致出血

答案：C

27. 用药过程中需要监护迟发性腹泻的是()

- A: 紫杉醇
- B: 伊立替康
- C: 长春碱类
- D: 多柔比星

答案：B

28. 用于治疗急、慢性支气管炎及各种刺激引起的刺激性干咳。缓释片一次 40mg，一日 2 次的药物是

- A: 苯丙哌林
- B: 右美沙芬
- C: 喷托维林
- D: 可待因

答案：A

29. 为克服服药初期的类早孕反应，双炔失碳酯肠溶片成分中增加了

- A: 炔雌醇
- B: 甲羟孕酮和炔雌醇
- C: 去氧孕烯
- D: 维生素 B6

答案：D

30. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是

- A: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇
- B: 肾功能不全者可以使用
- C: 定期检测电解质、肾功能，同时观察 24h 尿量及尿颜色

D: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂

答案：B

31. 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化，利尿的同时，还应给予的药物是（）

A: 美司钠

B: 氯化钾

C: 螺内酯

D: 二甲双肌

答案：A

32. 链激酶的作用机制是

A: 促进纤维蛋白溶解

B: 抑制血小板聚集

C: 加速抗凝血酶Ⅲ的作用

D: 抑制维生素 K 在肝细胞合成凝血因子

答案：A

33. 属于贝丁酸类调节血脂药是（）。

A: 阿昔莫司

B: 依折麦布

C: 阿托伐他汀

D: 非诺贝特

答案：D

34. （2017 年真题）属于选择性 5-HT₄ 受体激动剂，促进乙酰胆碱释放的促胃肠动药是（）

A: 莫沙必利

B: 甲氧氯普胺

C: 昂丹司琼

D: 多潘立酮

答案: A

35. 抗瘤谱较广，对恶性淋巴瘤效果显著，还能用于治疗自身免疫性疾病的药物是

A: 长春新碱

B: 多柔比星

C: 博来霉素

D: 环磷酰胺

答案: D

36. 抑制血管平滑肌和心肌细胞 Ca

A: 氢氯噻嗪

B: 肼屈嗪

C: 硝苯地平

D: 利血平

答案: C

37. 属于胰岛素增敏剂的是

A: 艾塞那肽

B: 阿卡波糖

C: 罗格列酮

D: 瑞格列奈

答案: C

38. 抑制 H⁺, K⁺-ATP 酶活性的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 哌仑西平
- C: 氢氧化铝
- D: 雷尼替丁

答案：A

39. 肝功能不全的心衰患者可选用

- A: 地高辛
- B: 普萘洛尔
- C: 美西律
- D: 地尔硫卓

答案：A

40. 用于过敏性休克的是()

- A: 熊去氧胆酸
- B: 肾上腺素
- C: 甲氧氯普胺
- D: 阿托品

答案：B

41. 镇痛药合理用药原则不包括

- A: 用药剂量个体化，根据患者需要由小剂量开始，逐渐加大剂量
- B: 按时给药，而不是按需给药
- C: 按阶梯给药，对于轻度疼痛患者首选弱阿片类药物
- D: 尽可能选择口服给药

答案：C

42. 以下抗寄生虫药的使用方法错误的是

- A: 阿苯达唑治疗蛲虫病一次即为一疗程，药片需用水吞服
- B: 氯硝柳胺驱牛带绦虫和猪带绦虫应空腹吞服
- C: 左旋咪唑驱蛔虫空腹或睡前顿服
- D: 蛲虫病易自身重复感染，故在阿苯达唑治疗 2 周后应重复治疗一次

答案：B

43. 主要以降低三酰甘油为目标的首选药是

- A: 辛伐他汀
- B: 烟酸
- C: 阿托伐他汀
- D: 非诺贝特

答案：D

44. 对曲霉属无效的药物是()

- A: 氟康唑
- B: 伊曲康唑
- C: 两性霉素 B
- D: 伏立康唑

答案：A

45. 低致吐性化疗药物所引起的恶心呕吐,宜选用的止吐治疗方案是()

- A: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼
- B: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松
- C: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺
- D: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药

答案：D

46. 功能性子宫出血可选用的药物是

- A: 缩宫素
- B: 他莫昔芬
- C: 雌二醇
- D: 垂体后叶素

答案：C

47. （2015 年真题）应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是（）。

- A: 血管内皮生长因子
- B: B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原
- C: 表皮生长因子受体
- D: 人表皮生长因子受体-2

答案：D

48. 与氨曲南在结构上相似的头孢菌素类药是

- A: 氨曲南
- B: 头孢美唑
- C: 头孢他啶
- D: 头孢噻肟

答案：C

49. （2018 年真题）可用于 1 岁以下婴幼儿急、慢性腹泻，具有固定和清除多种病原体和毒素药物是（）

- A: 番泻叶
- B: 蒙脱石散
- C: 洛哌丁胺

D: 地芬诺酯

答案: B

50. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

A: 中和胃酸

B: 保护胃黏膜

C: 阻断组胺 H

D: 抑制 H

答案: C

51. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌引起的肺炎宜选用()

A: 万古霉素

B: 克林霉素

C: 阿奇霉素

D: 氟康唑

答案: A

52. 在使用减毒活流感疫苗后一段时间内不应服用奥司他韦，该时间是

A: 3 周内

B: 1 周内

C: 4 周内

D: 2 周内

答案: D

53. (2021 年真题) 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 嗜酸乳杆菌
- B: 双歧杆菌
- C: 梭状芽孢杆菌
- D: 粪肠球菌

答案：C

54. 抑制细菌叶酸合成的抗菌药物是

- A: 利福喷丁
- B: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶
- C: 头孢米诺
- D: 头孢吡肟

答案：B

55. 以下不属于干扰核酸生物合成的药物是

- A: 培美曲塞
- B: 表柔比星
- C: 卡培他滨
- D: 甲氨蝶呤

答案：B

56. (2018 年真题) 具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类似物是 ()

- A: 预混胰岛素注射液
- B: 普通胰岛素注射液
- C: 甘精胰岛素注射液

D: 精蛋白锌胰岛素注射液

答案: C

57. 用于治疗疥疮的药物有()

A: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比萘芬软膏

B: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏

C: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏

D: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏

答案: D

58. 丙烯胺类抗真菌的代表药为()

A: 伏立康唑

B: 特比萘芬

C: 伊曲康唑

D: 卡泊芬净

答案: B

59. 既能增加糖分解和减少糖生成，又能改善对胰岛素的敏感性的药物是

A: 二甲双胍

B: 胰岛素

C: 罗格列酮

D: 氢氧化镁

答案: A

60. 利福平与口服避孕药合用

A: 后者血药浓度下降，药效降低

B: 不良反应叠加

C: 后者血药浓度升高，不良反应增加

D: 药理作用拮抗

答案：A

61. 唑类抗真菌药()

A: 特比萘芬

B: 阿莫罗芬

C: 氟康唑

D: 两性霉素

答案：C

62. 服用阿司匹林可增加患者消化道黏膜损伤和胃溃疡的风险为降低此风险,应采取的措施是()

A: 应长期合用质子泵抑制剂

B: 阿司匹林不应与其他抗血小板药物合用

C: 用阿司匹林前宜先根治幽门螺杆菌感染

D: 不推荐 65 岁以上老年患者使用阿司匹林进行冠心病二级预防

答案：C

63. 下列从作用机制讲不属于抗血小板药物的是

A: 氯吡格雷

B: 氨甲环酸

C: 双嘧达莫

D: 噻氯匹定

答案：B

64. 治疗铜绿假单胞菌感染选用()

A: 红霉素

- B: 磺胺嘧啶
- C: 多西环素
- D: 庆大霉素

答案: D

65. 治疗伤寒、副伤寒的首选药是

- A: 氯霉素
- B: 青霉素
- C: 诺氟沙星
- D: 四环素

答案: A

66. 下列药物组合混合可减弱抗菌活性的是

- A: 青霉素+阿米卡星
- B: 青霉素+红霉素
- C: 青霉素+氯霉素
- D: 青霉素+四环素

答案: A

67. 哌嗪类驱虫药主要用于治疗

- A: 蛔虫病和蛲虫病
- B: 疟疾
- C: 蛲虫病
- D: 绦虫病

答案: A

68. 患者，男，35岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

- A: 蔗糖铁
- B: 琥珀酸亚铁
- C: 硫酸亚铁
- D: 叶酸

答案：A

69. 抗酸作用较弱而慢，但持久，对溃疡面有保护作用的是

- A: 氢氧化镁
- B: 碳酸钙
- C: 氢氧化铝
- D: 三硅酸镁

答案：D

70. 洋地黄毒苷的半衰期是

- A: 48h
- B: 5 天
- C: 7 天以上
- D: 72h

答案：C

71. 抗真菌作用最强的是

- A: 甲硝唑
- B: 链霉素
- C: 阿奇霉素
- D: 两性霉素 B

答案：D

72. 适应症仅应用于治疗失眠的药物是()

- A: 佐匹克隆
- B: 地西泮
- C: 苯巴比妥
- D: 氟西汀

答案：A

73. 口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 柳氮磺吡啶
- C: 磺胺甲
- D: 磺胺米隆

答案：B

74. 通过与敏感需氧革兰阴性菌细胞膜上 PBP3 的高度亲合而发挥杀菌作用，仅对需氧革兰阴性菌包括铜绿假单胞菌具有良好抗菌活性，对革兰阳性菌和厌氧菌作用差的是

- A: 头孢噻肟
- B: 头孢他啶
- C: 头孢美唑
- D: 氨曲南

答案：D

75. 下列不属于凝血因子 X 抑制剂的是

- A: 阿哌沙班
- B: 利伐沙班
- C: 磺达肝癸钠
- D: 华法林

答案：D

76. 下列氨基糖苷类抗菌药物中，引起耳蜗神经损伤发生率最高的是

- A: 卡那霉素
- B: 妥布霉素
- C: 核糖霉素
- D: 链霉素

答案：A

77. 利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可作用与慢性心力衰竭治疗的利尿剂是

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 呋塞米
- D: 螺内酯

答案：D

78. 特布他林属于

- A: M 胆碱受体阻断剂
- B: β 肾上腺素受体激动剂
- C: 黄嘌呤类药物
- D: 白三烯调节剂

答案：B

79. 过量引起严重心脏毒性的是

- A: 哌唑嗪
- B: 地高辛
- C: 卡托普利
- D: 氨氯地平

答案：B

80. 肾功能轻度减退患者可按原治疗量应用而活动性肝病时避免应用的是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 异烟肼
- C: 青霉素
- D: 红霉素

答案：B

81. 阻断 H

- A: 哌仑西平
- B: 雷尼替丁
- C: 氢氧化铝
- D: 奥美拉唑

答案：B

82. 下列关于 IA 类抗心律失常药物的描述，错误的是

- A: 抑制 Na
- B: 延长 APD 和 ERP
- C: 降低膜反应性
- D: 减慢 0 相去极化速度

答案：A

83. 硫脲类抗甲状腺药的主要药理作用是()

- A: 促进甲状腺素的释放
- B: 干扰甲状腺素的作用
- C: 抑制甲状腺素的合成

D: 影响碘的摄取

答案: C

84. 巨细胞病毒可致

A: 流行性结膜炎

B: 巨细胞病毒性视网膜炎

C: 角膜炎

D: 急性出血性结膜炎

答案: B

85. 新生儿和早产儿使用可能会出现致命性的“喘息综合征”的药物是

A: 多烯磷脂酰胆碱注射剂

B: 硫普罗宁注射剂

C: 甘草酸二铵注射剂

D: 双环醇

答案: A

86. 对滴虫、阿米巴和兰氏贾第鞭毛虫等原虫，以及脆弱拟杆菌等厌氧菌具有强大抗菌活性，为治疗阴道滴虫病的首选药物是

A: 多黏菌素

B: 呋喃妥因

C: 甲硝唑

D: 克林霉素

答案: C

87. 用药期间可引起眼泪、尿、粪、痰等呈橘红色的药物是

A: 利福平

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 链霉素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/216114145100011030>