

安义 2022 年卫生系统招聘考试真题及答案 解析【下载版】

1: 患者，男性，56 岁。3 年前诊断为 COPD，现病情加重，入院治疗。

患者缺氧的临床表现主要是

单项选择题:

- A、皮肤湿冷，尿量削减
- B、面色潮红，脉搏洪大
- C、辗转反侧，呻吟不止
- D、烦躁担心，口唇发绀
- E、头晕眼花，血压下降

2: 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

单项选择题:

- A、奥美拉唑
- B、雷尼替丁
- C、昂丹司琼
- D、维生素 B6
- E、茶苯海明

3: 患者，男性，56 岁。肝硬化病史 7 年，此次因腹水入院治疗，某

日大量利尿放腹水后消失肝性脑病。导致该患者肝性脑病最主要的诱因是

单项选择题：

- A、上消化道出血
- B、高蛋白饮食
- C、缺钾性碱中毒
- D、感染
- E、药物

4：溶胶剂与溶液剂之间最大的不同是


单项选择题：

- A、药物分子大小
- B、药物分散形式
- C、溶剂种类
- D、体系荷电
- E、临床用途

5：患者 58 岁，已绝经 8 年，因不规章出血来院检查，诊断为子宫内膜癌，下述哪项不是该病的特点

单项选择题：

- A、生长缓慢
- B、转移较晚



- C、绝经后妇女多见
- D、痛苦消失较早
- E、5年存活率较高

6: 患者, 女性, 59岁。风心病伴二尖瓣狭窄6年, 伴心房抖动5年, 无明显缘由突然消失意识障碍, 最可能的缘由是

单项选择题:

- A、发生室颤
- B、心排出量削减, 脑供血不足
- C、心房血栓脱落, 脑栓塞
- D、高凝状态, 脑血栓形成
- E、发生房颤

7: 属于乌鸡白凤丸主治

多项选择题

- A、气血两虚
- B、身体瘦弱
- C、月经不调
- D、腰膝酸软
- E、崩漏带下

8: 妇科疾病的治疗原则应当侧重于

单项选择题：

- A、妇科病应和其他病一样，重视脏腑功能的恢复
- B、妇女经、孕、产、乳，数伤气血，尤易伤血，当以养血为主
- C、妇科病多由于肝、脾、肾，当着重调理肝、脾、肾
- D、妇科病多由冲、任、督、带受损而引起，当侧重于调理冲、任、督、带
- E、依据妇女生理、病理特点，根据辨证论治原则进行调治

9：下列哪项表现不是强心苷类中毒症状

单项选择题：

- A、心动过缓
- B、心律失常
- C、恶心、呕吐
- D、头晕、嗜睡
- E、易激惹、惊厥

10：参芪降糖胶囊与养胃舒胶囊的共同功能有

多项选择题

- A、健脾
- B、补肾
- C、益气
- D、养阴

E、行气导滞

11: 肝损害的中毒表现为

多项选择题

A、纳差乏力

B、恶心厌油

C、肝功能特别

D、总胆红素上升

E、皮肤黄染

12: 脱疽患者，男，38岁，症见患肢夜间痛甚难寐，抱膝而坐，患肢紫红，下垂更甚，汗毛脱落，舌质红，苔薄白，脉沉细。症属

单项选择题:

A、虚寒型

B、血淤型

C、热毒型

D、肾虚型

E、气血两虚型

13: 能溶于水的生物碱是

单项选择题:

A、莨菪碱

- B、小檗碱
- C、长春新碱
- D、长春碱
- E、长春地辛

14：升麻在升麻葛根汤中的作用不涉及

单项选择题：

- A、解肌散邪
- B、透疹
- C、清热解毒
- D、阳明引经
- E、升阳举陷

15：下列哪些是白鲜皮的性状鉴别特征

多项选择题

- A、呈卷筒状
- B、折断时有粉尘飞扬
- C、断面不平坦，略呈层片状，迎光可见有闪耀的小亮点
- D、外表面灰白色或淡灰黄色，常有突起的颗粒状小点
- E、有羊膻气，味微苦

16：四妙丸的药物组成是

单项选择题：

- A、盐黄柏、苍术、党参、甘草
- B、盐黄柏、党参、薏苡仁、甘草
- C、盐黄柏、牛膝、防风、白芍
- D、盐黄柏、苍术、薏苡仁、牛膝
- E、盐黄柏、苍术、茯苓、细辛

17：静态作业的特点是（ ）。

单项选择题：

- A、能量消耗水平高
- B、能量消耗水平不高
- C、能量消耗水平因人而异
- D、能量消耗水平不高，不易疲惫
- E、能量消耗水平不高，易疲惫

18：下列关于靶向制剂的叙述，正确的是

多项选择题

- A、靶向作用机制包括被动靶向、主动靶向和物理化学靶向
- B、能提高药物的疗效
- C、能降低药物的毒副作用
- D、能增加-药物对靶组织的特异性
- E、靶区内药物浓度高于正常组织的给药体系

19: 不参加三羧酸循环的化合物是

单项选择题:

- A、柠檬酸
- B、草酰乙酸
- C、丙二酸
- D、 α -酮戊二酸
- E、琥珀酸

20: 使用血液制品的管理规定包括


多项选择题

- A、将调剂处方保存 3 年
- B、慎用人血白蛋白等制品
- C、严格把握适应证和禁忌证
- D、对使用者进行有效的血液警戒和药物警戒
- E、留意制品中的防腐剂、稳定剂等辅料的不良反应或潜在风险

21: 对参与器官移植的医师, 应当特殊强调的道德责任可除外

单项选择题:

- A、对本人供职的医院, 大力宣扬器官移植优势, 塑造医院良好形象
- B、对活体器官捐赠者, 必需在严格坚持各项标准的状况下摘取器官
- C、对尸体器官捐赠者, 坚持亲属知情同意、死亡推断精确



无误

D、对器官安排，尽量体现社会公正

E、对接受者，坚持正确的医疗动机并尽量保证手术胜利

22：检测酸不溶性灰分使用的酸是

单项选择题：

A、稀盐酸

B、稀磷酸

C、稀硫酸

D、稀醋酸

E、稀硝酸

23：受体阻断剂的特点是

单项选择题：

A、与受体有亲和力，有内在活性

B、与受体有亲和力，无内在活性

C、与受体无亲和力，有内在活性

D、与受体有亲和力，有弱的内在活性

E、与受体有弱亲和力，有强的内在活性

24：颤证患者年高病久，部分患者呈逐年加重倾向，治宜

单项选择题：

- A、运用虫类药物
- B、活血化瘀
- C、熄风止颤
- D、图缓
- E、逐邪

25：扩张冠脉的中成药如速效救心丸、山海丹、活心丹、心宝丸、益心丸、滋心阴液、补心气液等忌与哪类药联用

单项选择题：

- A、含朱砂的中成药
- B、含牛黄的中成药
- C、含麻黄的中成药
- D、含甘草的中成药
- E、含天麻的中成药

26：依据以下材料，回答{TSE}题患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌II级，同侧腋下淋巴结1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+).肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。{TS}下列关于多西他赛的描述，错误的是

单项选择题：

- A、属于半合成紫杉类抗肿瘤药物

- B、作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成
- C、抗肿瘤作用比紫杉醇强
- D、多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同
- E、典型不良反应是骨髓功能抑制、脱发、过敏反应

27: 生命质量论中最重要的问题是

单项选择题:

- A、以生命的优劣确定生命存在的必要与否
- B、以生命的神圣确定生命存在的价值
- C、确认生命从何开头
- D、确认生命保存的意义
- E、确认生命质量的标准

28: 参与执业医师资格考试,须具有高等学校医学专业本科以上学历,并在执业医师指导下,在医疗、预防、保健机构中试用期满'

单项选择题:

- A、6个月
- B、18个月
- C、1年
- D、2年
- E、3年

29: 丙谷胺用于消化道溃疡宜配用具协同作用的中药是

多项选择题

A、甘草

B、白芍

C、冰片

D、茯苓

E、泽泻

30: 血清甘油三酯上升不常见于

单项选择题:

A、冠心病

B、原发性高脂血症

C、堵塞性黄疸

D、甲状腺功能减退

E、甲亢

31: 依据以下材料, 回答{TSE}题患儿, 男, 5岁, 体重18kg, 以“咳嗽、憋喘2天”之主诉入院, 临床诊断为“急性支气管炎, 支气管哮喘”。入院查体: T 36.6°C, BP 110 / 65mmHg, P 100次/分, R 26次/分, 鼻通气良好, 各鼻窦区无压痛。咽充血, 双肺呼吸音粗, 可闻及哮鸣音。血常规: 白细胞计数 $10.97 \times 10^9 / L$, 中性粒细胞百分比 78.9%, 嗜酸性粒细胞百分比 7.7%。既往有青霉素过敏史。

医嘱：单项选择题：

- A、晨起空腹
- B、早餐后
- C、午餐后
- D、睡前
- E、下午

32：性激素的周期性变化中下述哪项是正确的

单项选择题：

- A、孕激素在排卵前有一个低峰，排卵后才有高峰
- B、雌激素有两个峰值，排卵后的峰值较平坦
- C、雌、孕激素的峰值在排卵后第 10 天形成
- D、黄体分泌雌激素和孕激素，如不受精 20 天后退化
- E、在月经周期中均有较大量的雌孕激素

33：观看舌苔以辨别病邪深浅的主要依据是

单项选择题：

- A、舌苔的有无
- B、苔色的黄白
- C、舌苔的有根无根
- D、舌苔的厚薄
- E、舌苔的润燥

34: 固本益肠片的留意事项有

多项选择题

- A、热病汗出、阴虚盗汗者慎用
- B、湿热痢疾者忌用
- C、湿热泄泻者忌用
- D、湿热下注扰动精室所致遗精、早泄者不宜用
- E、肝经湿热所致的遗尿与膀胱湿热所致的小便频数忌用

35: 目前临床上主要采纳的牙种植体为

单项选择题:

- A、黏膜内种植体
- B、骨膜下种植体
- C、骨内种植体
- D、牙内骨内种植体
- E、穿下颌种植体

36: 关于甲亢的药物治疗, 下列说法正确的是

多项选择题

- A、丙硫氧嘧啶减弱抗凝药的抗凝作用
- B、胺碘酮可使甲亢病情加重
- C、服用碳酸锂时, 应监测血药浓度, 当血锂浓度 1.5mmol/L 时,

可消失中毒症状

D、妊娠伴甲亢患者应采纳最小有效剂量的丙硫氧嘧啶

E、抗甲状腺药物在白细胞数偏高的状况下慎用

37：维 A 酸联合过氧苯甲酰治疗寻常痤疮的正确用法是

单项选择题：

A、将两药的凝胶或乳膏充分混合后应用

B、两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用

C、睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶

D、晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏，睡前应用过氧苯甲酰凝胶

E、前额、颜面部应用维 A 酸凝胶或乳膏，胸背上部应用过氧苯甲酰凝胶

38：儿童多吃精制糖引起的最常见健康问题（ ）。

单项选择题：

A、糖尿病

B、龋齿

C、癌症

D、动脉硬化

E、脂肪肝

39：患者面现黄色，多由于

多项选择题

- A、脾虚
- B、气血不足
- C、阳虚水寒
- D、湿邪内蕴
- E、气滞血瘀

40：血府逐瘀汤的功用是

单项选择题：

- A、活血祛瘀，养血清热
- B、活血祛瘀，行气止痛
- C、活血祛瘀，疏肝通络
- D、活血祛瘀，散结止痛
- E、活血祛瘀，温经止痛

41：急性心肌梗死，下列哪项指标最具诊断价值

单项选择题：

- A、血清肌酸激酶
- B、淀粉酶
- C、丙氨酸氨基转移酶
- D、三酰甘油
- E、血肌酐

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/216200002143010045>