

2024 年甘肃省临洮县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题附答案（综合卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可引起胰岛素自身免疫综合征的抗甲状腺药是

- A: 甲巯咪唑片
- B: 甲状腺片
- C: 卡比马唑片
- D: 复方碘口服液

答案：A

2. 可用于慢性支气管炎引起的痰液稠厚、呼吸困难的是

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 羧甲司坦
- C: 右美沙芬
- D: 氨溴索

答案：B

3. 头孢拉定()

- A: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染
- B: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染
- C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- D: 肾毒性大

答案：D

4. 与避孕药合用，可能导致避孕失败的药物不包括

- A: 四环素
- B: 环孢素
- C: 苯巴比妥
- D: 利福平

答案：B

5. 对革兰阳性菌作用强，而对革兰阴性菌作用弱的药物是

- A: 第二代头孢菌素
- B: 第三代头孢菌素
- C: 第四代头孢菌素
- D: 第一代头孢菌素

答案：D

6. 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的轻、中度感染或青霉素过敏者

- A: 克林霉素
- B: 克拉霉素
- C: 红霉素
- D: 万古霉素

答案：C

7. 用于治疗对阿司匹林敏感的哮喘以及预防运动性哮喘，也用于减轻季节性过敏性鼻炎引起的症状的是

- A: 孟鲁司特
- B: 沙丁胺醇
- C: 茶碱
- D: 沙美特罗

答案：A

8. 伴有前列腺增生的哮喘患者不宜选用的药物是

- A: 长效 B₂ 受体激动剂
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: 白三烯受体阻断剂
- D: M 胆碱受体阻断剂

答案：D

9. 抑制 HIV 的反转录酶，导致链合成的终止并打断病毒复制的循环的药物是

- A: 非核苷类反转录酶抑制药
- B: 整合酶抑制剂
- C: 蛋白酶抑制药
- D: 核苷类反转录酶抑制药

答案：D

10. 对抗胰岛素降血糖作用的药物是

- A: 蛋白同化激素
- B: 甲状腺素
- C: 磺胺类药
- D: 口服降血糖药

答案：B

11. 伴有（ ）的患者在应用 ACEI 首剂治疗时可能出现严重低血压

- A: 脑水肿
- B: 蛋白尿
- C: 低钠血症
- D: 干咳

答案：C

12. 患者，女 52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片每日 1 次，每次 2mg。

- A: 绝经后使用雌激素可缓解更年期症状，但增加患糖尿病的风险
- B: 激素替代疗法应结合患者情况个体化制定
- C: 应在绝经后 6 年之内开始
- D: 可以降低绝经后妇女心脑血管病发生风险

答案：D

13. 肝功能不全者应禁用氯化铵，是因为氯化铵

- A: 可降低血氨浓度，诱发肝性脑病
- B: 可增加血氨浓度，诱发肝性脑病
- C: 可降低门脉压力，诱发出血
- D: 可升高门脉压力，诱发出血

答案：B

14. 通过抑制胆碱酯酶活性，提高脑内乙酰胆碱含量的药物是

- A: 舍曲林
- B: 多奈哌齐
- C: 阿尼西坦
- D: 艾地苯醌

答案：B

15. 氨苯蝶啶可导致的不良反应是

- A: 低血糖
- B: 高钾血症

C: 低氯碱血症

D: 血小板增多

答案：B

16. 用于先兆性流产和习惯性流产

A: 黄体酮

B: 地塞米松

C: 米非司酮

D: 雷洛昔分

答案：A

17. (2016 年真题) 外用糖皮质激素作用强度的比较，正确的是

A: 卤米松>地塞米松>氟轻松

B: 地塞米松>氟轻松>卤米松

C: 地塞米松>卤米松>氯轻松

D: 卤米松>氟轻松>地塞米松

答案：D

18. 长期服用可导致结肠黑变病的药物是

A: 液体石蜡

B: 聚乙二醇

C: 乳果糖

D: 番泻叶

答案：D

19. 与顺铂联合应用可致严重肾毒性的药物是

A: 利妥昔单抗

B: 氟尿嘧啶

C: 甲氨蝶呤

D: 阿糖胞苷

答案: A

20. 下述利尿药中，可增加卡那霉素耳毒性的是

A: 氨苯蝶啶

B: 氢氯噻嗪

C: 呋塞米

D: 螺内酯

答案: C

21. 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是()

A: 预混胰岛素注射液

B: 甘精胰岛素注射液

C: 精蛋白锌胰岛素注射液

D: 普通胰岛素注射液

答案: D

22. 属于 ACEI 类药，临床用于糖尿病肾病的是

A: 硝苯地平

B: 普萘洛尔

C: 卡托普利

D: 肼屈嗪

答案: C

23. 有关氨茶碱平喘作用的叙述错误的是

A: 促进肾上腺素释放

B: 激活磷酸二酯酶

C: 拮抗腺苷受体

D: 激活腺苷酸环化酶

答案：B

24. 变异型心绞痛宜选用

A: 硝苯地平

B: 地尔硫

C: 普萘洛尔

D: 维拉帕米

答案：A

25. 长期大量使用林旦后可导致的不良反应是

A: 肝脏损害

B: 白细胞减少

C: 中枢神经系统毒性

D: 眼部水肿

答案：C

26. 对 I 型和 II 型单纯疱疹病毒作用最强的是

A: 阿糖腺苷

B: 阿昔洛韦

C: 干扰素

D: 奥司他韦

答案：B

27. 青光眼患者应该慎用

A: 噻托溴铵

B: 沙美特罗

C: 孟鲁司特

D: 沙丁胺醇

答案: A

28. 属于维生素 K 类抗出血药的是

A: 酚磺乙胺

B: 艾曲泊帕乙醇胺

C: 氨甲环酸

D: 甲萘氢醌

答案: D

29. 属于 I b 类抗心律失常药且具有抗癫痫作用的是()

A: 苯妥英钠

B: 普鲁卡因胺

C: 利多卡因

D: 维拉帕米

答案: A

30. 治疗维生素 D 中毒导致的变应性骨炎可选用

A: 奥利司他

B: 鲑降钙素

C: 阿法骨化醇

D: 阿仑膦酸钠

答案: B

31. 对革兰阳性菌作用弱，而对革兰阴性菌作用强的药物是

A: 第四代头孢菌素

B: 第二代头孢菌素

C: 第三代头孢菌素

D: 第一代头孢菌素

答案：C

32. 下列关于眼部细菌感染说法错误的是()

A: 急性期或严重的衣原体感染可口服阿奇霉素治疗

B: 淋球菌性结膜炎采用眼局部抗菌药物治疗即可

C: 眼科术后引起细菌性眼内炎，可向眼内注射万古霉素

D: 局部给予抗菌药物是眼科细菌感染疾病的首选方法

答案：B

33. 有关阿托品的叙述，错误的是

A: 婴幼儿对其毒性不敏感

B: 存在潜在性青光眼时，使用阿托品有诱发危险

C: 与促胃肠动力药合用时应有间隔时间

D: 妊娠期静脉滴注阿托品可使胎儿心动过速

答案：A

34. 刺激胰岛细胞分泌胰岛素的是()

A: 二甲双胍

B: 磺酰脲类

C: A 和 B 均无效

D: 胰岛素

答案：B

35. (2019 年真题) 患者，男，8 岁，静脉滴注美洛西林后立即出现胸闷、气短、呼吸困难，喉头水肿，考虑为青霉素类抗生素的过敏反应，按照其发生机制，该患者发生的过敏反应，在分型上属于 ()

- A: II 型变态反应
- B: III 型变态反应
- C: IV 型变态反应
- D: I 型变态反应

答案：D

36. 有明显耳毒性的药物是()

- A: 青霉素
- B: 四环素
- C: 链霉素
- D: 磺胺嘧啶

答案：C

37. () 与利福平合用时，在用利福平前和疗程中不需调整剂量

- A: 糖皮质激素
- B: 氯霉素
- C: 地高辛
- D: 氨茶碱

答案：C

38. (2018 年真题) 碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时, 适宜的服药时间是()

- A: 清晨或睡前
- B: 餐中
- C: 餐后 2h
- D: 餐前即刻

答案：B

39. 糖尿病酮症酸中毒患者选用 ()

- A: 胰岛素
- B: 格列本脲
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 二甲双胍

答案：A

40. 以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌

- A: 急性前壁心肌梗死
- B: 严重低血压者
- C: 青光眼患者
- D: 已使用西地那非者

答案：A

41. 可用于配合防治肝性脑病的泻药为

- A: 甘油
- B: 硫酸镁
- C: 乳果糖
- D: 酚酞

答案：C

42. 对铜绿假单胞菌有较强作用的药物是

- A: 哌拉西林
- B: 阿莫西林
- C: 美西林
- D: 氯唑西林

答案：A

43. (2017 年真题) 服用后可能导致口中有氨味、舌苔、大便呈灰黑色的药物是 ()

- A: 西咪替丁
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 硫糖铝
- D: 奥美拉唑

答案: B

44. 与诺氟沙星合用可提高对致病性细菌感染的疗效的是

- A: 酚酞
- B: 地芬诺酯
- C: 莫沙必利
- D: 双八面体蒙脱石

答案: D

45. 主要阻滞电压依赖性的钠通道，属于二苯并氮

- A: 苯巴比妥
- B: 苯妥英钠
- C: 加巴喷丁
- D: 卡马西平

答案: D

46. 下述关于过氧苯甲酰的描述中，不正确的是 ()

- A: 可导致皮肤干燥
- B: 可杀灭痤疮丙酸杆菌
- C: 为强还原剂，极易分解
- D: 可分解出新生态氧而发挥作用

答案: C

47. 脓疱型痤疮可选用()

- A: 阿达帕林
- B: 维 A 酸
- C: 林旦霜
- D: 酮康唑

答案: A

48. 药粉误入眼内可能引起或加重窄角型青光眼、眼睛疼痛或不适、短暂视物模糊、视觉晕轮或彩色影像的是

- A: 沙丁胺醇
- B: 喷托维林
- C: 氨溴索
- D: 噻托溴铵

答案: D

49. 患者，男，65 岁。高血压病史 8 年，血压峰值 180/110mmHg，冠心病史 5 年，双侧肾动脉狭窄，不宜选用的抗高血压药是

- A: 赖诺普利
- B: 吧达帕胺
- C: 普萘洛尔
- D: 氨氯地平

答案: A

50. (2016 年真题) 属于胆固醇吸收抑制剂的是

- A: 非诺贝特
- B: 阿昔莫司
- C: 阿托伐他汀

D: 依折麦布

答案: D

51. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

A: 泮托拉唑

B: 雷尼替丁

C: 氢氧化铝

D: 复方碳酸钙

答案: A

52. 精神病患者及神经中毒症状者慎用

A: 利巴韦林

B: 四环素可的松

C: 更昔洛韦

D: 氯霉素

答案: C

53. (2021 年真题) 患者，女，27 岁，孕 34 周。诊断为轻度便秘，宜选用的药物是 ()

A: 乳果糖

B: 普芦卡必利

C: 硫酸镁

D: 蓖麻油

答案: A

54. 患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶。下列关于氟尿嘧啶的说法中错误的是()

- A: 用药期间不宜饮酒或同用阿司匹林类药
- B: 属于嘌呤核苷合成酶抑制剂
- C: 典型不良反应是恶心、呕吐、腹泻
- D: 与甲氨蝶呤合用，两者可产生协同作用

答案：B

55. (2018 年真题) 对 β -内酰胺类抗菌药物过敏的患者，I 类切口围术期预防应用抗菌药物时，可选用 ()

- A: 万古霉素
- B: 头孢唑林
- C: 氨曲南
- D: 青霉素 G

答案：C

56. 可使后者疗效显著下降的是

- A: 红霉素
- B: 氯丙嗪
- C: 他莫昔芬
- D: 维生素 C

答案：D

57. 对服用双炔失碳酯后月经周期延长或闭经者，可加服

- A: 炔雌醇
- B: 去氧孕烯

C: 甲羟孕酮和炔雌醇

D: 维生素 B6

答案: C

58. 属于广谱抗心律失常药物的是()

A: 胺碘酮

B: 苯妥英钠

C: 地高辛

D: 利多卡因

答案: A

59. 维拉帕米的药理作用是

A: 促进 Ca

B: 增加心肌收缩力

C: 降低窦房结和房室结的自律性

D: 直接抑制 Na

答案: C

60. 下列药物属于高选择性非肽类血小板膜糖蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是

A: 硫酸亚铁

B: 阿司匹林

C: 替罗非班

D: 双嘧达莫

答案: C

61. (2020 年真题) 治疗难辨梭状芽孢杆菌引起的假膜性肠炎，宜选择的药物是

- A: 阿奇霉素
- B: 利奈唑胺
- C: 米诺环素
- D: 万古霉素

答案：D

62. 典型不良反应为皮肤毒性,属于酪氨酸激酶抑制剂的药物是 ()

- A: 吉非替尼
- B: 顺铂
- C: 奥沙利铂
- D: 氟尿嘧啶

答案：A

63. 异烟肼抗结核杆菌的作用原理是

- A: 抑制蛋白质合成
- B: 抑制分枝菌酸合成
- C: 抑制 RNA 多聚酶
- D: 与锌离子络合、影响戊糖代谢

答案：B

64. 阿卡波糖降血糖作用的机制是

- A: 增强胰岛素的作用
- B: 拮抗胰岛高血糖素的作用
- C: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性
- D: 竞争性抑制 α -葡萄糖苷酶, 减少碳水化合物的水解

答案：D

65. (2017 年真题) 降低同型半胱氨酸水平的是 ()

- A: 叶酸
- B: 泛酸钙
- C: 烟酸
- D: 维生素 B2

答案：A

66. 以下不属于胰岛素不良反应的是

- A: 低血糖
- B: 脂肪萎缩与肥厚
- C: 高钾血症
- D: 皮下硬结

答案：C

67. 患者，女，70 岁，BMI $21\text{kg}/\text{m}^2$ ，45 岁时绝经，10 年前开始，经常出现腰背部疼痛，活动后加重，但未就诊，平日外出活动较少，近 5 年身高降低，驼背明显。10 天前患者不慎摔倒，上肢活动受限、疼痛，就诊后检查结果：血钙 $1.97\text{mmol}/\text{L}$ ，血磷 $1.7\text{mmol}/\text{L}$ ，右上肢 X 光检查提示：右桡骨远端骨折。骨密度检查结果：T 值（-2.9）。

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 地塞米松
- C: 秋水仙碱
- D: 双醋瑞因

答案：A

68. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

- 。
- A: 注射与口服并用

B: 短期口服给药

C: 长期口服给药

D: 注射给药

答案：B

69. 眼底检查时的快速短效扩瞳药

A: 去氧肾上腺素

B: 多巴胺

C: 去甲肾上腺素

D: 异丙肾上腺素

答案：A

70. 与避孕药同时服用，不会导致避孕失败的药物是

A: 利福平

B: 四环素

C: 苯巴比妥

D: 环孢素

答案：D

71. 与柔红霉素合用，可能增加心脏毒性的是

A: 肝素

B: 放线菌素

C: 对乙酰氨基酚

D: 氧烯洛尔

答案：D

72. 急性室性心律失常可选用

A: 美西律

- B: 阿托品
- C: 硝苯地平
- D: 利多卡因

答案：D

73. 患者，男，17 岁。拔牙 2 天后出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈。12 天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。查体：T39℃，脉搏 89 次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音。实验室检查：WBC 28×10

- A: 咳出的痰直接涂片
- B: 痰细胞学检查
- C: 咳出的痰进行细胞培养
- D: 通过环甲膜穿刺吸取痰液，进行痰涂片和需氧、厌氧菌检查

答案：D

74. 维生素 B

- A: 坏血病
- B: 脚气病
- C: 角膜软化症
- D: 成人佝偻病

答案：B

75. 其他 β -内酰胺类抗生素的主作用靶位是

- A: 二氢叶酸合成酶
- B: 细菌核蛋白体 50S 亚基
- C: 细菌胞浆膜上特殊蛋白 PBP_s
- D: DNA 螺旋酶

答案：C

76. 药粉接触患者的眼睛，可导致眼睛疼痛、结膜充血的是

- A: 特布他林
- B: 噻托溴铵
- C: 沙美特罗
- D: 布地奈德

答案：B

77. 属于 PDE5 抑制剂的禁忌人群的是

- A: 中度的充血性心力衰竭
- B: 高血压未得到控制者
- C: 2 周前发生过心肌梗死或脑卒中
- D: 轻度、稳定型心绞痛

答案：B

78. （2019 年真题）患者，男，30 岁，有长期便秘病史，因胃痛就医，诊断为胃溃疡，该患者治疗胃溃疡应避免使用的药物是（）

- A: 氢氧化铝
- B: 奥美拉唑
- C: 雷贝拉唑
- D: 西咪替丁

答案：A

79. 下列可用于治疗哮喘的是

- A: 氯雷他定
- B: 氯苯那敏
- C: 氮革斯汀
- D: 孟鲁司特

答案：D

80. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 餐时
- B: 餐后 1 小时
- C: 餐前半小时
- D: 餐后半小时

答案：A

81. 关于地高辛作用特点的说法，正确的是()

- A: 地高辛通过激动 Na,K
- B: 地高辛消除半衰期为 12h
- C: 地高辛不经细胞色素 P450 酶代谢，以原形药物从肾脏排泄
- D: 地高辛口服生物利用度小于 50%

答案：C

82. 非麻醉性镇痛药中属于中枢性镇痛药的是

- A: 秋水仙碱
- B: 吗啡
- C: 布洛芬
- D: 曲马多

答案：D

83. 下列药物中，能促进食物消化的是()

- A: 雷尼替丁
- B: 胶体果胶铋
- C: 兰索拉唑

D: 乳酶生

答案: D

84. 患者，女，46 岁。以"口角歪斜 3 天"之主诉入院。3 天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

A: 苯巴比妥

B: 卡马西平

C: 伊曲康唑

D: 苯妥英钠

答案: C

85. (2016 年真题) 患者，女，26 岁，妊娠 3 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是

A: 阿莫西林

B: 左氧氟沙星

C: 头孢氨苄

D: 青霉素 G

答案: B

86. (2021 年真题) 关于美罗培南使用注意事项的说法，错误的是 ()

A: 肝功能不全者需调整剂量

B: 可用于治疗妊娠期呼吸系统感染

C: 有其他 β -内酰胺类药物过敏性休克史的患者禁用

D: 与中枢神经系统 γ -氨基丁酸受体的亲和力较亚胺培南弱，故癫痫等中枢神经系统不良反应的发生率显著低于亚胺培南

答案: A

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/217020055051010024>