

卫生资格考试中级主管护师综合知识(习题卷53)

第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]葡萄胎患者宜选用的避孕方法是

- A) 宫内节育器避孕
- B) 安全期避孕
- C) 药物避孕
- D) 安全套
- E) 免疫避孕法

答案:D

解析:

2. [单选题]癫痫患者服药最不应

- A) 服药量太小
- B) 只在夜间服药
- C) 服药次数多
- D) 突然停药
- E) 两药同服

答案:D

解析:突然停药，很容易造成癫痫持续状态的发生，加重脑损伤。

3. [单选题]妇科检查前护理工作应除外

- A) 向患者做好解释工作
- B) 嘱患者排尿
- C) 准备好干净的布垫
- D) 协助患者取仰卧位
- E) 准备好消毒的检查器械

答案:D

解析:

4. [单选题]下列不属于羊水过少的原因的是

- A) 过期妊娠
- B) 胎儿畸形
- C) 胎儿脱水
- D) 先兆早产
- E) 胎膜病变

答案:D

解析:羊水过少临床常见以下情况:1. 母体因素 孕妇脱水、服用某些药物有引起羊水过少的可能。2. 胎儿畸形 胎儿畸形主要包括染色体异常、囊性淋巴瘤、泌尿生殖道畸形、小头畸形、法洛四联症等，以先天性泌尿系统异常最多见。3. 胎盘功能 异常过期妊娠、胎儿生长受限、胎盘退行性变、胎儿脱水以及宫内慢性缺氧、胎儿成熟过度等。4. 其他 如胎膜病变等因素。【该题针对“基础知识-第七章妊娠期并发症妇女的护理”知识点进行考核】

5. [单选题]宫颈癌最早期症状

- A) 腹痛
- B) 水肿
- C) 阴道出血
- D) 接触性出血

E) 大量血性脓白带

答案:D

解析:

6. [单选题] 在下列甲状腺癌中, 最常见的是

A) 乳头状腺癌

B) 髓样癌

C) 未分化癌

D) 滤泡性腺癌

E) 细胞癌

答案:A

解析: 甲状腺癌的病理分类: ①乳头状腺癌, 约占成人甲状腺癌总数的70%; ②滤泡性腺癌, 约占15%; ③未分化癌, 约占5%~10%; ④髓样癌, 少见。

7. [单选题] 移植术后的急性排斥反应多发生在

A) 24小时内

B) 1周内

C) 1个月内

D) 6个月内

E) 1年内

答案:C

解析: 急性排斥反应多发生于移植后1个月内, 并往往在几周或术后1年内多次重复发生。故选C。

8. [单选题] 甲胎蛋白阳性对下列哪种疾病最有诊断价值

A) 原发性肝癌

B) 急性坏死性肝炎

C) 肝血吸虫病

D) 肝转移癌

E) 肝硬化

答案:A

解析: 甲胎蛋白是诊断肝细胞癌最特异性的标志物, 现已广泛用于肝癌的普查、诊断、判断治疗效果和预测复发。【该题针对“基础知识-原发性肝癌病因及发病机制、辅助检查”知识点进行考核】

9. [单选题] 高血压发病机制中占主导地位的是

A) 血容量过多

B) 内分泌因素

C) 肾功能异常

D) 高级神经中枢失调

E) 血管内皮功能异常

答案:D

解析: 高级神经中枢功能失调在高血压发病中占主导地位, 反复过度紧张与精神刺激引起的交感神经兴奋、儿茶酚胺分泌增加, 使心排出量和外周血管阻力增加。

10. [单选题] 男性, 34岁, 因失血性休克正在输液。现测得其CVP4.8cmH₂O(0.47kPa), BP90/55mmHg(127/7.3kPa)。应采取的措施是

A) 加快输液速度

B) 减慢输液速度

C) 应用强心药物

D) 应用去甲肾上腺素

E) 静脉滴注多巴胺

答案:A

解析：病人血压及中心静脉压均低。为严重血容量不足，应加快输液速度。反之中心静脉压高，而血压偏低。应考虑心功不全或血容量相对过多，应减慢输液，加用强心剂。

11. [单选题]某肾病型慢性肾炎病人，水肿明显，血浆白蛋白28 g/L，尿蛋白定量5 g/24h，血尿素氮5mmol/L，血肌酐 $5\mu\text{mol/L}$ ，原则上给予下列哪项饮食最适宜()

- A) 低盐高糖高蛋白
- B) 低盐禁蛋白
- C) 低盐低蛋白
- D) 低盐适量蛋白
- E) 低盐高蛋白

答案:D

解析:

12. [单选题]健康计划的总体目标中的三个"W"指

- A) who, what, when
- B) what, when, why
- C) who, what, which
- D) what, when, where
- E) when, where, which

答案:A

解析:总体目标的三个"W"分别指who-对象; what-实现什么变化; when-实现变化的期限。

13. [单选题]急性心力衰竭的病因不包括

- A) 急性广泛心肌梗死
- B) 高血压急症
- C) 严重心律失常
- D) 洋地黄中毒
- E) 输液过快过多

答案:D

解析:急性心力衰竭病因：(1) 与冠心病有关的急性广泛前壁心肌梗死、室间隔破裂穿孔、乳头肌梗死断裂等。

(2) 感染性心内膜炎引起的瓣膜穿孔、腱索断裂所致瓣膜性急性反流。(3) 高血压性心脏病血压急剧升高，在原有心脏病基础上出现快速性心律失常或严重缓慢性心律失常。(4) 输液过快过多突然加重心脏前负荷。【该题针对“基础知识-急性心力衰竭病因及发病机制、辅助检查”知识点进行考核】

14. [单选题]提示导管管尖培养阳性的结果是()

- A) 每平板细菌数 $\geq 5\text{cfu}$
- B) 每平板细菌数 $\geq 10\text{cfu}$
- C) 每平板细菌数 $\geq 15\text{cfu}$
- D) 每平板细菌数 $\geq 20\text{cfu}$
- E) 每平板细菌数 $\geq 30\text{cfu}$

答案:C

解析:导管管尖培养其接种方法应取导管尖端5cm，在血平板表面往返滚动一次，细菌数 $\geq 15\text{cfu/平板}$ 即为阳性。

15. [单选题]不可采用硬膜外麻醉的手术部位是

- A) 头部
- B) 上肢
- C) 腹部
- D) 背部
- E) 四肢

答案:A

解析:硬膜外麻醉是将局麻药注入硬膜外间隙，阻滞脊神经根，使其支配区域产生暂时性麻痹的麻醉方法，适用于除头

部以外的任何手术。

16. [单选题]一氧化碳中毒时最先受损的器官是

- A) 肺部
- B) 肾脏
- C) 胃肠道
- D) 心脑
- E) 肝脏

答案:D

解析:

17. [单选题]患儿，男，3岁，左股骨干骨折，最恰当的治疗是

- A) 骨牵引
- B) 手术切开钢板固定
- C) 夹板外固定
- D) 皮肤牵引
- E) 石膏外固定

答案:D

解析:

18. [单选题]王女士在回家路上看见一人躺在路上，询问得知，此人骨折。若此人为脊柱骨折，急救时应特别注意

- A) 仔细检查患者
- B) 及时给予止痛药物
- C) 立即送往医院
- D) 搬运时勿使患者脊柱弯曲
- E) 用硬板抬送

答案:D

解析:骨折的急救包括：①镇痛、止血、包扎伤口。②有休克的先抗休克处理。③妥善固定伤肢。④要严密观察病情变化。⑤搬运、护送要平稳；脊柱骨折，急救时应特别注意搬运时勿使患者脊柱弯曲。

19. [单选题]除使用抗生素外，支气管扩张症护理的另一关键措施是

- A) 卧床休息
- B) 补充营养
- C) 呼吸功能训练
- D) 痰液引流
- E) 消毒隔离

答案:D

解析:对于支气管扩张症而言，痰液引流和抗生素治疗同样重要。良好的痰液引流可以清除积痰，减少继发感染和全身中毒症状，有时其作用强于抗生素治疗。

20. [单选题]观察8小时如仍有高热，应采取的措施为

- A) 肠外营养液中加胰岛素
- B) 雾化吸入
- C) 胸腔穿刺抽气
- D) 拔除中心静脉导管
- E) 咽拭子细菌培养

答案:D

解析:患者行中心静脉插管，胸腹无异常表现，找不到原因的寒战、高热考虑导管性脓毒症。

21. [单选题]宫颈内膜上皮是

- A) 鳞状上皮

- B) 鳞状上皮，有腺体
- C) 柱状上皮，无腺体
- D) 高柱状上皮，有许多腺体
- E) 单层高柱状上皮，含有纤毛细胞和分泌细胞

答案:D

解析:宫颈管粘膜为单层高柱状上皮，粘膜层腺体可分泌碱性粘液，形成宫颈管内粘液栓，堵于宫颈外口。宫颈粘膜受卵巢激素影响发生周期性变化。宫颈阴道部被覆复层鳞状上皮。输卵管黏膜的上皮为单层高柱状上皮，含有纤毛细胞和分泌细胞。

22. [单选题]葡萄胎刮宫前，应准备好静脉通路并配血，其理由是

- A) 防止刮宫时大出血造成休克
- B) 葡萄胎刮宫中要静脉给药
- C) 葡萄胎刮宫前需要输血
- D) 病人要求
- E) 医师建议

答案:A

解析:

23. [单选题]对食管描述正确的是

- A) 成人的食管长约40cm
- B) 食管下连咽部
- C) 食管的第2狭窄在其与左支气管交叉处
- D) 食管分为颈、胸、腹、盆四部
- E) 食管的第3狭窄位于其与贲门相接处

答案:C

解析:食管上连咽部，约起于第6颈椎平面，下端在膈下与贲门相连接，长约25cm，门齿距食管起点约15cm。食管位于气管之后，但因气管的下端稍偏，故在气管分叉处食管的前面是左支气管。食管分为颈、胸、腹三部，胸部食管为了便于描述，又分为上、中、下三段。食管有三处较为狭窄：一处是在食管上端，有环咽肌围绕食管的入口；另一处在主动脉弓水平，有主动脉和左支气管横跨食管；最后一处在食管下端，即食管穿过膈的裂孔处。【该题针对“基础知识-消化系统结构与功能”知识点进行考核】

24. [单选题]急性脓胸最主要的感染灶是

- A) 化脓性心包炎
- B) 肝脓肿破溃
- C) 膈下脓肿
- D) 肺脓肿
- E) 急性阑尾炎

答案:D

解析:

25. [单选题]急性坏死型胰腺炎患者出现的休克多属于

- A) 中毒性休克
- B) 低血容量性休克
- C) 过敏性休克
- D) 心源性休克
- E) 神经源性休克

答案:B

解析:急性坏死型胰腺炎是急性胰腺炎的一种类型，系由急性水肿型胰腺炎病变继续发展所致。胰腺腺泡、脂肪、血管大片坏死，胰腺组织水肿，体积增大，广泛性出血坏死。腹膜后间隙大量血性渗出液。出现休克的主要原因为有效血容量不足，属于低血容量性休克。

26. [单选题]关于淋病的病因及主要传播途径，正确的是

- A) 以血液传播为主
- B) 主要通过性交直接传染
- C) 阴道最多见
- D) 发病率较低
- E) 由革兰阳性菌引起

答案:B

解析:淋病由革兰阴性菌引起，发病率位于我国性传播疾病之首，主要通过性交直接传染，以子宫颈管最多见。

27. [单选题]在整个生命周期中，人类行为的形成和发展顺序的排列，正确的是

- A) 被动发展、主动发展、巩固发展、自主发展
- B) 被动发展、主动发展、自主发展、巩固发展
- C) 自主发展、被动发展、巩固发展、主动发展
- D) 自主发展、被动发展、主动发展、巩固发展
- E) 自主发展、巩固发展、被动发展、主动发展

答案:B

解析:人类行为的发展顺序依次为被动发展、主动发展、自主发展、巩固发展。【该题针对“人类行为的基本概念”知识点进行考核】

28. [单选题]新生儿寒冷损伤综合征的病因不包括

- A) 新生儿体温调节中枢不成熟
- B) 体表面积大
- C) 棕色脂肪储存不足
- D) 新生儿皮下脂肪以不饱和脂肪酸含量多
- E) 血管丰富，易散热

答案:D

解析:新生儿皮下脂肪组织中饱和脂肪酸含量多，熔点较高，体温降低时易凝固。【该题针对“基础知识-新生儿寒冷损伤综合征病因及发病机制”知识点进行考核】

29. [单选题]患者女性，17岁，学生，其母陪同就诊，诊断为单纯性甲状腺功能亢进，采用药物治疗、定期复查，医生要求母亲对张某的用药实行督促。然而三个月的治疗未见病情好转。原因是其父认为年纪轻轻不必天天吃药，主张靠锻炼，而母亲不敢多说，致使用药过程断续。该问题说明该家庭对个人的作用体现在

- A) 家庭权力中心
- B) 家庭结构
- C) 家庭功能
- D) 家庭发展周期
- E) 家庭关系

答案:A

解析:由于该家庭父亲是权威，家庭权力中心在于父亲。家庭权力中心决定了家庭事务的解决主要依靠中心人物。

30. [单选题]8岁小儿，结核菌素试验结果硬结直径5mm，无结核病临床症状，其结果正确的解释是

- A) 阴性，可能未受感染
- B) 强阳性，提示活动病灶
- C) 弱阳性，提示曾经感染
- D) 中度阳性，提示有新感染灶
- E) 阴性，可能处于结核变态反应初期

答案:C

解析:8岁小儿无结核病临床症状，结核菌素试验弱阳性，提示曾经感染过结核或接种过卡介苗。7~

31. [单选题]控制支气管哮喘症状的首选药是

- A) β_2 受体激动剂

- B) 糖皮质激素
- C) 抗胆碱能药物
- D) 茶碱类
- E) 肥大细胞膜稳定剂

答案:A

解析:本题考核了支气管哮喘的药物治疗, β_2 受体激动剂为控制症状的首选药。

32. [单选题]性兴奋时润滑阴道口的分泌物来自于

- A) 子宫分泌物
- B) 前庭大腺
- C) 尿道旁腺
- D) 宫颈分泌物
- E) 阴道粘膜腺体

答案:B

解析:记忆性知识点:性兴奋时润滑阴道口的分泌物来自于前庭大腺。

33. [单选题]3岁的小强手里拿着一袋怪味花生正开心地吃着,小贝从他后面猛地推了他一把,小强哭了一声后就出现阵阵呛咳,随后脸色微微发青,哭不出声来,就用嘴咬站在他旁边的妈妈。他妈妈正确的做法是

- A) 批评他不要太娇气
- B) 推开他,让他到一边玩去
- C) 让他打小贝
- D) 训斥小贝不乖
- E) 立即将小强面朝下横过自己的双膝间,用手掌根部在两侧肩胛骨之间给予有力的冲击

答案:E

解析:

34. [单选题]羊水栓塞的核心问题是

- A) 胎膜残留
- B) 子宫收缩乏力
- C) 子宫畸形
- D) 胎盘嵌顿
- E) 凝血机制紊乱与变态反应

答案:E

解析:羊水进入母体血循环后,其中有形成分如上皮细胞、胎脂、胎粪等在肺内形成栓子;羊水内含有大量激活凝血系统的物质,能使小血管内形成广泛的血栓,阻塞肺小血管,反射性引起迷走神经兴奋,使肺小血管痉挛加重;羊水抗原成分引起变态反应,很快使小支气管痉挛,故正确选项是E。

35. [单选题]需要进行接触隔离的疾病是

- A) 大面积烧伤
- B) 霍乱
- C) 乙型肝炎
- D) 麻疹
- E) 艾滋病

答案:A

解析:接触隔离用于传染性强或有重要流行病学意义,经接触传播但不必严密隔离的感染采用的隔离方式。用于皮肤白喉、多重耐药的金黄色葡萄球菌感染、大面积烧伤、破伤风、气性坏疽、脓疱病等。

36. [单选题]胆总管结石合并急性胆管炎时表现为

- A) 腹痛
- B) 寒战
- C) 高热

- D) 黄疸
- E) 以上都有

答案:E
解析:

37. [单选题]适用于了解对方感觉、态度等真实情况的提问方式是()

- A) 封闭式
- B) 开放式
- C) 简明式
- D) 探索式
- E) 偏向式

答案:B

解析:开放式提问的问题比较笼统,旨在诱发对方说出自己的感觉、认识、态度和想法。适用于了解对方真实的情况。

38. [单选题]共用题干患者,女性,30岁,已婚。因畏寒发热3天,腰部酸痛及尿频尿急2天,收入院。尿液检查:尿蛋白(+),红细胞少许,白细胞(+++)。为了明确诊断,该患者必须检查的项目是

- A) 血尿素氮
- B) 内生肌酐清除率
- C) 尿比重
- D) 尿细菌学检查
- E) 腹部B超

答案:D

解析:初步诊断该患者为急性肾盂肾炎。急性肾盂肾炎常用的检查有:尿常规白细胞显著增加,红细胞也增加,尿蛋白常为阴性或微量;尿细菌学检查可判断细菌种类,对诊疗有重大意义。影像学检查如腹部平片、IVP等以确定有无梗阻、结石、泌尿系先天性畸形等。

尿路感染可根据膀胱刺激征、尿液改变和尿液细菌学检查加以确诊,对于有明显的全身感染症状、腰痛、肋脊角压痛和叩击痛、血液中白细胞计数增多的患者多考虑为肾盂肾炎。

39. [单选题]健康促进的核心策略为

- A) 护理科研
- B) 改善环境
- C) 效果评价
- D) 社会动员
- E) 护理教育

答案:D

解析:《渥太华宣言》明确了健康促进的三个基本策略,即倡导、赋权与协调。其核心策略是社会动员。

40. [单选题]下列情况属于医院感染的是

- A) 患者原有的慢性感染在医院内急性发作
- B) 新生儿经胎盘获得的感染(出生后48小时内发病)
- C) 创伤而产生的炎症表现
- D) 皮肤黏膜开放性伤口虽无炎症反应但有细菌定植
- E) 诊疗措施激活的潜在性感染

答案:E

解析:医院感染诊断标准规定由于诊疗措施激活的潜在性感染,如疱疹病毒、结核杆菌等的感染属于医院感染。

41. [单选题]管理职能循环中最后一环是

- A) 计划工作
- B) 控制工作
- C) 领导工作
- D) 组织工作

E) 协调工作

答案:B

解析:控制工作是管理职能中最后的一环。

42. [单选题]6个月以内小儿的最佳食品是

A) 母乳

B) 牛乳

C) 羊乳

D) 全脂奶粉

E) 乳儿糕

答案:A

解析:

43. [单选题]产后坐浴何时开始

A) 产后7天

B) 产后6天

C) 产后5天

D) 产后4天

E) 产后3天

答案:A

解析:产后坐浴, 产后7天开始。

44. [单选题]6个月小儿, 哪种表现最符合维生素D缺乏性手足搐搦症

A) 抽风后意识障碍

B) 多发生在清晨空腹时的抽搐

C) 发生在春天无热时的抽搐

D) 磕头样发作性痉挛样抽搐

E) 间歇性抽搐伴有痴呆状态

答案:C

解析:春季接触阳光增多, 体内维生素D合成增加, 使大量的钙沉积在骨骼上而导致血钙暂时下降, 容易促发佝偻病性手足搐搦症。

45. [单选题]不可作为常规预防性应用的药物是

A) 庆大霉素

B) 红霉素

C) 万古霉素

D) 林可霉素

E) 头孢克洛

答案:C

解析:

46. [单选题]T管引流病人护理不正确的是

A) 妥善固定

B) 观察引流液的量和性质

C) 必要时可用无菌盐水冲洗导管

D) 通常留置3~5天拔管

E) 拔管前须试行夹管1~2天

答案:D

解析:

47. [单选题]为了保护瘻口周围皮肤, 护理措施错误的

- A) 无菌纱布包裹引流口
- B) 氧化锌软膏涂抹
- C) 皮肤保护膜涂抹
- D) 红霉素软膏涂抹
- E) 保持引流通畅

答案:A

解析:

48. [单选题]属于肿瘤外源性致癌因素的是

- A) 慢性刺激与炎症
- B) 心理社会因素
- C) 遗传因素
- D) 内分泌因素
- E) 免疫因素

答案:A

解析:肿瘤外源性致癌因素包括:①环境因素;②不良生活方式;③慢性刺激与炎症等。心理社会因素、遗传因素、内分泌因素、免疫因素等属于内源性因素。

49. [单选题]判断甲状腺功能亢进症病情程度的主要指标是

- A) 脉率增快和脉压增大的程度
- B) 体重减轻程度
- C) 突眼的程度
- D) 甲状腺肿大程度
- E) 食欲亢进程度

答案:A

解析:

50. [单选题]某小儿听见悦耳声时会微笑,听见声音时头可转向声源,该小儿的年龄最小可能为

- A) 1个月
- B) 3个月
- C) 5个月
- D) 7个月
- E) 9个月

答案:B

解析:小儿1个月时能分辨“吧”“咿”的声音;3~4个月时头可转向声源(定向反应),听到悦耳声时会微笑。【该题针对“基础知识-感知的发育(视、听感知的发育)”知识点进行考核】

51. [单选题]对外界抵抗力最强的细菌结构

- A) 细胞壁
- B) 荚膜
- C) 芽胞
- D) 核质
- E) 细胞膜

答案:C

解析:

52. [单选题]男,2岁。1个月前患麻疹,近2周来有发热。T39℃,咳嗽、气促、双肺呼吸音粗。肝肋下3cm。脾肋下2cm。结核菌素试验阴性。X线胸片:见双肺均匀分布大小一致的点状阴影。可能诊断是

- A) 原发性肺结核
- B) 粟粒型肺结核
- C) 支气管肺炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/21711410065006103>