

三基知识考试模拟题及答案

一、单选题（共 70 题，每题 1 分，共 70 分）

1、促胃液素的生理作用中，下述哪项是错误的

- A、刺激胃窦与常运动
- B、刺激胰液、胆汁分泌
- C、刺激胃黏膜细胞增殖
- D、刺激胃黏膜细胞分泌盐酸与胃蛋白酶原
- E、刺激幽门括约肌收缩

正确答案：E

2、关于开放性骨折病人的急救处理，下列哪项是错误的

- A、观察血压、脉搏，迅速转运病人至医院
- B、有较大血管出血者可用止血带，并注明时间
- C、应用止血带者每 30 分钟放松一次
- D、用夹板固定患肢
- E、包扎伤口

正确答案：C

3、孕妇最易发生那种贫血

- A、巨幼红细胞性贫血
- B、恶性贫血
- C、溶血性贫血
- D、缺铁性贫血
- E、再生障碍性贫血

正确答案：D

4、糖尿病最常见的神经病变是

- A、周围神经病变
- B、自主神经病变
- C、神经根病变
- D、颅神经病变
- E、脊髓病变

正确答案：A

5、体温每升高 1℃，心率平均每分钟约增加

- A、18 次
- B、10 次
- C、15 次

D、20 次

E、5 次

正确答案：A

6、休克代偿期的临床表现为

A、收缩血压正常或稍高，脉稍快，脉压缩小

B、血压稍低，脉快，脉压正常

C、血压稍升高，脉细速，脉压缩小

D、血压稍低，脉快，脉压缩小

E、血压稍升高，脉搏无变化，脉压缩小

正确答案：A

7、下述哪项不是代谢性酸中毒的血气特点

A、SB降低

B、AB降低

C、BB降低

D、BE正值增大

E、PaCO₂代偿性降低

正确答案：D

8、呼吸和呼吸暂停现象交替出现，称为

A、陈-施呼吸

B、比奥呼吸

C、浮浅性呼吸

D、库斯莫呼吸

E、鼾声呼吸

正确答案：B

9、呕血病人的饮食应该是

A、普食

B、半量流质

C、暂禁食

D、软食

E、冷流质

正确答案：C

10、发生医院内尿路感染最常见的诱因是

A、长期卧床

B、膀胱冲洗

- C、留置导尿管
- D、膀胱内注药
- E、膀胱镜检查

正确答案：C

11、适于采用包扎疗法的烧伤创面是

- A、面颈部浅度烧伤
- B、Ⅲ度烧伤
- C、会阴部烧伤
- D、四肢高压电接触伤
- E、四肢浅Ⅱ度及深Ⅱ度烧伤

正确答案：E

12、过敏性紫癜与血小板减少性紫癜的主要区别是

- A、毛细血管脆性试验阳性
- B、有过敏史
- C、下肢皮肤有紫癜
- D、紫癜呈对称分
- E、血小板正常

正确答案：E

13、注射 TAT的作用是

- A、中和白喉外毒素
- B、中和破伤风外毒素
- C、中和所有的外毒素
- D、中和病毒
- E、刺激人体产生抗毒素

正确答案：B

14、最容易产生谷丙转氨酶增高是

- A、肝细胞再生
- B、结缔组织增生
- C、肝细胞变性坏死
- D、炎症细胞浸润
- E、肝实质细胞蛋白合成功能障碍

正确答案：C

15、对体温过低的老年人，下列护理措施哪项不妥

- A、增加病人活动量

- B、持续监测体温变化
- C、提高室温
- D、饮热饮料
- E、保暖

正确答案：A

16、铺备用床时下述哪项不需要

- A、按便于操作的原则折叠好各被单
- B、扫净床上渣屑
- C、核对床号、姓名
- D、按使用先后摆放好各单
- E、评估同室病友有无进餐、治疗或换药

正确答案：C

17、张某，妊娠 35 周，分娩一女婴，体重 2 200g，产妇平安，女婴一般情况稍差。此时女婴应给予

- A、接触性隔离
- B、保护性隔离
- C、呼吸道隔离
- D、消化道隔离
- E、昆虫隔离

正确答案：B

18、免疫系统包括

- A、胸腺、骨髓
- B、T细胞 B细胞
- C、免疫器官、免疫细胞
- D、免疫器官、免疫分子
- E、免疫组织、免疫器官、免疫细胞、免疫分子

正确答案：E

19、再生障碍性贫血引起贫血最主要的原因是什么

- A、失血
- B、骨髓造血功能低下
- C、造血原料缺乏
- D、无效性红细胞生成
- E、红细胞破坏过多

正确答案：B

20、病人,男,5岁,烧伤总面积为30%(II度),其烧伤严重程度为

- A、特重度
- B、轻度
- C、中度
- D、深度
- E、重度

正确答案：A

21、高血钾最常见的病因是

- A、急性肠梗阻
- B、急性肾衰竭多尿期
- C、长期应用糖皮质激素
- D、挤压伤(严重)
- E、长期应用利尿药

正确答案：D

22、开放式输液过程中添加药液错误的是

- A、认真查对药液名称与质量
- B、用注射器加药时应拧紧针栓
- C、加药时应距离输液瓶口约1cm
- D、加药后应轻轻摇匀药液
- E、添加溶液时溶液瓶勿触及溶液瓶口

正确答案：B

23、烧伤后病人出现休克症状时,最早的治疗措施中,下列哪项是错误的

- A、立即转往有条件的医院治疗
- B、保护创面,防止再损伤
- C、镇静止痛
- D、立即静脉输液
- E、注意合并伤的诊断及处理

正确答案：A

24、下列哪项是输液反应中急性肺水肿的特征性症状

- A、咳嗽、气促、呼吸困难
- B、发绀、躁动不安
- C、心悸、呕吐
- D、胸闷、心悸、气促
- E、咳嗽、咳粉红色泡沫痰、气促、胸闷

正确答案：E

25、大量饮清水后尿量增多，主要是由于

- A、抗利尿激素分泌降低
- B、肾小球滤过率增高
- C、血浆胶体渗透压降低
- D、囊内压降低
- E、醛固酮分泌降低

正确答案：A

26、诊断小儿重度脱水的主要依据是

- A、哭时少泪及尿量减少
- B、出现休克症状
- C、口唇黏膜干燥，皮肤苍白
- D、眼眶及前囟门凹陷
- E、精神萎靡，烦躁不安

正确答案：B

27、下列皮试液的剂量哪项不正确

- A、青霉素皮试剂量 20-50U/0.1mL
- B、链霉素皮试剂量 25 U/0.1mL
- C、TAT皮试剂量 15 U/0.1mL
- D、细胞色素 C 皮试剂量 0.075 U/0.1mL
- E、普鲁卡因皮试剂量 0.25 U/0.1mL

正确答案：B

28、血尿是指尿离心沉淀后镜检每高倍视野有多少个红细胞

- A、1-2 个
- B、2 个
- C、3 个以上
- D、5 个
- E、10 个以上

正确答案：C

29、急性心肌梗死病人第 1 周必须

- A、床上四肢活动
- B、由人搀扶室内行走
- C、开始功能锻炼
- D、日常生活自行料理

E、绝对卧床

正确答案：E

30、消化道出血应用三腔气囊管压迫止血,放气的时间是术后

A、72 小时

B、96 小时

C、48 小时

D、24 小时

E、12 小时

正确答案：D

31、心搏骤停复苏抢救的有效指征不包括

A、触到大动脉搏动

B、上肢收缩压在 8kPa 以上

C、自主呼吸恢复

D、瞳孔散大

E、颜面、口唇转红润

正确答案：D

32、药效发挥最快的给药途径是

A、皮下注射

B、口服给药

C、静脉注射

D、肌肉注射

E、吸入法

正确答案：C

33、呼吸道最狭窄处是

A、鼻后孔

B、声门裂

C、前庭裂

D、喉口

E、鼻前孔

正确答案：B

34、心室肌的前负荷是指

A、射血期心室内压

B、右心房压力

C、等容收缩期心室内压

D、心室舒张末期压

E、大动脉血压

正确答案：D

35、某失血性休克病人快速输入全血 1200mL 后出现手足抽搐、皮肤黏膜出血、血压下降、心率减慢，你认为可能是

A、溶血反应

B、血清病型反应

C、急性心力衰竭

D、超敏反应

E、枸橼酸中毒

正确答案：E

36、左心室的后负荷是指

A、收缩期心室内压

B、主动脉血压

C、等容收缩期心室内压

D、射血期心室内压

E、心室舒张末期压

正确答案：B

37、在无菌技术操作中启封的无菌溶液在未被污染的情况下限用

A、24 小时

B、2 小时

C、4 小时

D、12 小时

E、36 小时

正确答案：A

38、前列腺摘除术后，停止膀胱冲洗的最佳时间为

A、肉眼观察无血尿 5 日

B、肉眼观察无血尿 10 日

C、肉眼观察无血尿 7 日

D、肉眼观察无血尿 2 日

E、肉眼观察无血尿

正确答案：D

39、质粒是

A、染色体外的遗传物质，存在于胞浆中

- B、细菌生命活动所必需的物质
- C、细菌的一种特殊结构
- D、细菌的基本结构,存在于核质中
- E、染色体外的遗传物质,存在于核质中

正确答案: E

40、药液漏出血管外,可引起局部缺血坏死的药物是

- A、麻黄碱
- B、异丙肾上腺素
- C、普萘洛尔
- D、肾上腺素
- E、去甲肾上腺素

正确答案: E

41、传染性非典型肺炎最主要的传播途径是

- A、经呼吸道飞沫传播
- B、经粪-口传播
- C、虫媒传播
- D、接触传播
- E、经消化道传播

正确答案: A

42、下列哪一类水、电解质紊乱容易出现口渴、尿少

- A、高钾血症
- B、水中毒
- C、高渗性脱水
- D、低渗性脱水
- E、等渗性脱水

正确答案: C

43、溃疡病病人出现下列哪项病情提示有穿孔发生

- A、饮量突然减少
- B、上腹剧痛、腹肌紧张
- C、恶心腹胀明显
- D、嗝气反酸加重
- E、常发生“午夜痛”

正确答案: B

44、盆腔手术前留置导尿管的目的是

- 、防止尿失禁
- B、避免术中误伤膀胱
- C、促进膀胱功能
- D、保持外阴清洁干燥
- E、解除尿潴留

正确答案：B

45、关于灌肠的注意事项，下列哪项不正确

- A、为病人解除便秘时，液体应保留 5-10 分钟
- B、为病人降温时，液体的温度宜为 40℃
- C、保留灌肠宜保留 1 小时以上
- D、大量不保留灌肠的压力宜为 40-60cmH₂O
- E、肝性脑病病人不能用肥皂水灌肠

正确答案：B

46、大量保留灌肠灌管肠筒的液面应高于肛门

- A、40~60cm
- B、3~40cm
- C、65~80cm
- D、10~20cm
- E、20~30cm

正确答案：A

47、给婴儿用热水袋保暖时，水温不应超过

- A、70℃
- B、60℃
- C、50℃
- D、40℃
- E、30℃

正确答案：C

48、使用约束带时，错误的是

- A、带下应垫衬垫，固定时松紧适宜
- B、使用约束带前应向家属解释目的和意义，取得配合
- C、注意观察约束部位的血压循环
- D、为便于松解，宽绷带应打活结
- E、严格掌握约束带的适应症

正确答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/217114106133006161>