2024年广西壮族自治区田东县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题题库附参考答案（培优A卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.对G

A：第三代头孢菌素

B：第四代头孢菌素

C：第一代头孢菌素

D：第二代头孢菌素

答案：C

2.具有阿片样作用，长期大量服用可产生欣快感，并可能出现药物依赖性的止泻药是()

A：地芬诺酯

B：乳果糖

C：洛哌丁胺

D：蒙脱石散

答案：A

3.（2017年真题）眼部病毒感染宜选用（）

A：碘苷滴眼剂

B：托吡卡胺滴眼剂

C：拉坦前列素滴眼剂

D：氯霉素滴眼剂

答案：A

4.（2017年真题）可能引起中性粒细胞减少的药物（）

A：左甲状腺素

B：丙硫氧嘧啶

C：碘，碘化物

D：鲨肝醇

答案：B

5.β-内酰胺类抗生素的抗菌机制是

A：抑制蛋白质合成的全过程

B：抑制细菌细胞壁的合成

C：影响胞浆膜的通透性

D：影响叶酸代谢

答案：B

6.引起睫状肌麻痹，适用于青少年屈光检查，尤其适用于5岁以下儿童的药物是

A：20%甘露醇

B：阿托品

C：奥布卡因

D：羟苄唑

答案：B

7.适用于合并有肾功能损害的高血压患者的药物是

A：多巴酚丁胺

B：氯沙坦

C：卡维地洛

D：维拉帕米

答案：B

8.患者,男,60岁诊断为房性心律失常,医生给予胺碘酮治疗。近日,因胃溃疡开始用西咪替丁,出现窦性心动过缓症状。合用西咪替丁,出现窦性心动过缓,原因()

A：西咪替丁抑制CYP1A2,升高胺碘酮血浆药物浓度

B：西咪替丁诱导CYP2C9,升高胺碘酮血浆药物浓度

C：胺碘酮与西咪替丁竞争CYP2C19,减慢胺碘酮的代谢

D：西咪替丁抑制CYP3A4,升高胺碘酮血浆药物浓度

答案：D

9.临床口服最常用的、唯一经过安慰剂对照临床试验评估的强心苷药物是()

A：毒毛花苷K

B：地高辛

C：洋地黄毒苷

D：去乙酰毛花苷

答案：B

10.下列药物除哪项外都属于钙拮抗剂()

A：硝苯地平

B：地尔硫

C：维拉帕米

D：溴苄胺

答案：D

11.下列药物中，与雌二醇无相互作用的是

A：卡马西平

B：利福平

C：苯巴比妥

D：氢化可的松

答案：D

12.支原体、衣原体引起的肺炎宜选用()

A：阿奇霉素

B：克林霉素

C：万古霉素

D：氟康唑

答案：A

13.属于必需氨基酸，人体不能合成或合成速度不能满足人体需要()

A：复方氨基酸注射液(18AA)

B：赖氨酸

C：复方氨基酸注射液(3AA)

D：精氨酸

答案：B

14.大剂量对纯合子家族性高胆固醇血症有效的他汀类调血脂药是

A：氟伐他汀

B：阿伐他汀

C：普伐他汀

D：藻酸双酯钠

答案：B

15.（2018年真题）普通感冒患者,有单纯性咳嗽症状,宜选用的药物是（）

A：对乙酰氨基酚滴剂

B：氯苯那敏片

C：右美沙芬片

D：茶碱缓释片

答案：C

16.原发性失眠首选的镇静催眠药种类为

A：氟西泮

B：地西泮

C：苯二氮?类药物

D：非苯二氮?类药物

答案：D

17.吉非替尼、厄洛替尼、伊马替尼、舒尼替尼的主要代谢酶是

A：CYP1A1

B：CYP3A4

C：CYP1A2

D：CYP2C9

答案：B

18.仅用于绝经后妇女,不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是()

A：骨化三醇

B：阿仑磷酸钠

C：雷洛昔芬

D：阿法骨化醇

答案：C

19.止泻药()

A：硫酸镁

B：甘油

C：乳果糖

D：地芬诺酯

答案：D

20.局部抗炎作用较弱的长效糖皮质激素是

A：倍他米松

B：泼尼松

C：氢化可的松

D：地塞米松

答案：D

21.乙胺丁醇用于

A：10岁以上儿童及成人

B：6岁以上儿童及成人

C：8岁以上儿童及成人

D：13岁以上儿童及成人

答案：D

22.属于阴道杀精药的是

A：氯地孕酮

B：壬苯醇醚

C：米非司酮

D：左炔诺孕酮

答案：B

23.以上药物镇咳作用最弱的是

A：吗啡

B：可待因

C：喷托维林

D：右美沙芬

答案：C

24.（2020年真题）服药期间须大量饮水，防止发生结晶尿的药物是

A：克林霉素

B：左氧氟沙星

C：磺胺甲噁唑

D：头孢呋辛

答案：C

25.尼尔雌醇属于

A：糖皮质激素

B：雄激素

C：孕激素

D：雌激素

答案：D

26.患者，女，26岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺

A：利多卡因

B：特布他林

C：普萘洛尔

D：碘化钾

答案：C

27.属于DPP-4抑制剂的药物是

A：阿格列汀

B：伏格列波糖

C：利拉鲁肽

D：那格列奈

答案：A

28.可导致“类流感样”反应的药物是

A：糖皮质激素

B：骨化三醇

C：阿仑膦酸钠

D：降钙素

答案：C

29.（2021年真题）影响熊去氧胆酸的吸收，不宜同时服用的药物（）

A：氢氧化铝

B：利那洛肽

C：双歧杆菌三联活菌

D：昂丹司琼

答案：A

30.容易引起周围神经炎的抗结核药物是

A：利福平

B：链霉素

C：异烟肼

D：乙胺丁醇

答案：C

31.伐更昔洛韦口服后在肠道和肝脏中水解为

A：西多福韦

B：更昔洛韦

C：喷昔洛韦

D：阿昔洛韦

答案：B

32.已发生超敏反应，用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁加以预防的抗肿瘤药是

A：注射用柔红霉素

B：紫杉醇注射液

C：注射用硫酸长春新碱

D：注射用盐酸博来霉素

答案：B

33.耳底、耳塞、耳内流黄水等症可选用

A：曲伏前列素

B：四环素

C：1%碘甘油

D：9%硼酸冰片滴耳液

答案：D

34.主要阻滞电压依赖性的钠通道，属于二苯并氮

A：卡马西平

B：苯巴比妥

C：苯妥英钠

D：加巴喷丁

答案：A

35.对Ⅰ型和Ⅱ型单纯疱疹病毒作用最强的是

A：阿昔洛韦

B：奥司他韦

C：干扰素

D：阿糖腺苷

答案：A

36.典型失神性发作（小发作）首选()。

A：乙琥胺

B：苯妥英钠

C：氯巴占

D：奥卡西平

答案：A

37.适宜餐前嚼服的助消化药是()。

A：泮托拉唑

B：乳酸菌素

C：雷尼替丁

D：前列地尔

答案：B

38.小剂量就有抗焦虑作用的药物是

A：苯妥英钠

B：吗啡

C：地西泮

D：苯巴比妥

答案：C

39.通过与敏感需氧革兰阴性菌细胞膜上PBP3的高度亲合而发挥杀菌作用，仅对需氧革兰阴性菌包括铜绿假单胞菌具有良好抗菌活性，对革兰阳性菌和厌氧菌作用差的是

A：头孢他啶

B：头孢美唑

C：氨曲南

D：头孢噻肟

答案：C

40.患者，女，66岁，5天前无明显诱因出现发热，最高39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗4日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38．8℃，R21次，BP110／70mmHg，HR110次／分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞13．4×109／L，中性粒细胞82．1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁0．59，每6小时一次。

A：定期复查血常规、肝肾功能

B：出院后如发生过敏症状，可使用抗过敏药特非那定

C：侵袭性真菌感染疗程较长，患者出院后仍需口服氟康唑

D：如发生转氨酶升高，应考虑氟康唑的肝毒性

答案：B

41.易致血糖异常的药物是

A：氯霉素

B：加替沙星

C：青霉素

D：红霉素

答案：B

42.餐后1~2小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

A：枸橼酸铋钾

B：兰索拉唑

C：米索前列醇

D：铝碳酸镁

答案：D

43.体内缺乏维生素E会导致

A：孕育异常

B：脚气病

C：夜盲症

D：佝偻病

答案：A

44.水溶性他汀类药物能够选择性抑制肝脏胆固醇合成，而对肾上腺、性腺、心脏、大脑等部位的胆固醇合成影响极低，既有效降低了血清胆固醇水平，又减少了肝脏以外组织不良反应的发生。水溶性较强的他汀类药物是（）

A：普伐他汀

B：氟伐他汀

C：洛伐他汀

D：辛伐他汀

答案：A

45.丙戊酸钠的严重毒性是

A：抑制呼吸

B：肝功能损害

C：再生障碍性贫血

D：口干、皮肤干燥

答案：B

46.属于胃动力药的是

A：熊去氧胆酸

B：多潘立酮

C：山莨菪碱

D：胶体果胶铋

答案：B

47.选择性COX-2抑制剂引起心脑血管不良反应的机制是

A：促进TXA2的合成，促进血小板聚集

B：降低腺苷环化酶的活性，促进血小板聚集

C：抑制前列腺素的生成，使血栓素升高，促进血栓形成

D：负性肌力作用，造成心衰

答案：C

48.关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是

A：用药过量可导致出血并发症

B：用药期间需定期测定血红蛋白

C：对于不同的手术，选择疗程不同

D：如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药

答案：D

49.有类磺胺反应的NSAID是

A：吲哚美辛

B：对乙酰氨基酚

C：塞来昔布

D：阿司匹林

答案：C

50.治疗强心苷中毒所引起的窦性心动过缓和轻度房室传导阻滞应选用

A：阿托品

B：麻黄碱

C：去甲肾上腺素

D：维拉帕米

答案：A

51.下列说法正确的是

A：沙美特罗适用于缓解支气管痉挛的急性症状

B：长效β2受体激动剂不适合初始用于快速恶化的急性哮喘发作

C：异丙托溴铵口服可提高疗效

D：氨茶碱可与青霉素合用

答案：B

52.下列哪种维生素可用于慢性铁中毒的治疗

A：维生素B

B：维生素C

C：维生素B

D：维生素E

答案：B

53.（2021年真题）属于烷化剂，能破坏DNA的抗肿瘤药物是（）

A：厄洛替尼

B: 环磷酰胺

C: 长春新碱

D: 来曲唑

答案：B

54.替比夫定的作用靶点是

A: HIV-1反转录酶

B: 神经氨酸酶

C: 脱氧核糖核酸聚合酶

D: HIV-1和HIV-2蛋白酶

答案：C

55.硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

A: 直接作用于血管平滑肌

B: 释放一氧化氮

C: 阻断β受体

D: 促进前列环素的生成

答案：B

56.治疗侵袭性念珠菌病首选()

A: 伏立康唑

B: 灰黄霉素

C: 氟胞嘧啶

D: 氟康唑

答案：D

57.可使磷酰化胆碱酯酶复活的药物

A: 匹鲁卡品

B: 阿托品

C: 碘解磷定

D: 毒扁豆碱

答案：C

58.有关质子泵抑制剂说法错误的是

A: 局部止血作用

B: 可以中和胃酸

C: 主要是抑制H+,K+-ATP酶

D: 抑制胃酸分泌作用

答案：B

59.苯巴比妥与口服抗凝药合用()

A: 代谢加快而失效

B: 代谢加速而导致意外怀孕

C: 子宫内膜突破性出血

D: 抑制排酸作用

答案：A

60.连续应用易产生耐受性的是

A: 地尔硫

B: 硝苯地平

C: 普萘洛尔

D: 硝酸甘油

答案：D

61.对其他药物不能控制的顽固性癫痫仍有效的是

A: 卡马西平

B：丙戊酸钠

C：苯妥英钠

D：乙琥胺

答案：B

62.关于使用依折麦布的说法，错误的是

A：剂量超过10mg／d对降低LDL水平无增效作用

B：成人剂量一次10mg。一日1次

C：需空腹服用

D：可单独服用或与他汀类联合应用

答案：C

63.西地那非引起的不良反应有

A：视觉异常

B：嗜睡乏力

C：出血

D：低血糖

答案：A

64.应用硝普钠时的注意事项及用药监护不包括()

A：血硫氰酸盐水平

B：监测血压

C：避光使用

D：缓慢静脉注射

答案：D

65.（2015年真题）属于5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂的是（）。

A：吗氯贝胺

B：阿米替林

C：氟西汀

D：文拉法辛

答案：D

66.疗效高，生效快，主要用于

A：氯喹

B：伯氨喹

C：乙胺嘧啶

D：甲氟喹

答案：A

67.属于脂肪酸类抗癫痫药的代表药物是

A：丙戊酸钠

B：氯硝西泮

C：加巴喷丁

D：苯巴比妥

答案：A

68.患者，女，十二指肠溃疡，幽门螺杆菌(+)，可选用

A：苄星青霉素

B：万古霉素

C：双氯西林

D：阿莫西林

答案：D

69.（2020年真题）适用于干咳、咳嗽伴黏稠痰的患者,但不宜长期使用,用药7日症状未缓解应停药的恶心性祛痰药物是

A: 氨溴索

B: 溴己新

C: 乙酰半胱氨酸

D: 氯化铵

答案：D

70.以下给药途径不能使用氟尿嘧啶的是

A: 静脉滴注

B: 鞘内注射

C: 静脉注射

D: 动脉插管注药

答案：B

71.抑制蛋白质合成与功能的药物是()

A: 顺铂

B: 氟尿嘧啶

C: 多柔比星

D: 高三尖杉酯碱

答案：D

72.可与克拉霉素、兰索拉唑联合抗幽门螺杆菌治疗的药物是

A: 青霉素

B: 阿莫西林

C: 苄星青霉素

D: 头孢唑林

答案：B

73.出现流感样症候群，寒战、发热的药物是

A：链霉素

B：异烟肼

C：对氨基水杨酸

D：利福平

答案：D

74.兰索拉唑用于治疗胃及十二指肠溃疡的机制是

A：抑制H

B：阻断H

C：中和胃酸，升高胃内pH

D：保护胃黏膜

答案：A

75.属于电解质补充药，可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是

A：双环醇

B：门冬氨酸钾镁

C：异甘草酸镁

D：多烯磷脂酰胆碱

答案：B

76.（2017年真题）可杀灭疥虫的药物是（）

A：阿苯达唑

B：维A酸

C：甲苯达唑

D：林旦

答案：D

77.奥美拉唑主要用于治疗

A：胃溃疡

B：消化不良

C：慢性便秘

D：恶心、呕吐

答案：A

78.口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物是

A：磺胺甲

B：磺胺嘧啶

C：磺胺米隆

D：柳氮磺吡啶

答案：D

79.用于治疗黏液性水肿的是()

A：西地那非

B：小剂量碘制剂

C：甲状腺素

D：司坦唑醇

答案：C

80.毛果芸香碱的作用特点不包括()

A：开放前房角降低眼压

B：缩小瞳孔，拉紧虹膜

C：收缩睫状肌，使小梁网眼张开

D：减少房水生成

答案：D

81.碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时,适宜的服约时间是()

A: 清晨或睡前

B: 餐中

C: 餐前即刻

D: 餐后2h

答案：B

82.防止耐药现象的发生，持续用药须有12小时以上间歇期的药物是()

A: 哌唑嗪

B: 依那普利

C: 氨氯地平

D: 硝酸甘油

答案：D

83.阿司匹林预防血栓形成的机制是

A: 抑制TXA2的合成

B: 抑制GABA的合成

C: 促进PG的合成

D: 抑制PABA的合成

答案：A

84.患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。

A: 糖尿病胃轻瘫

B: 胃食管反流病

C: 功能性消化不良

D: 化疗所致的恶心、呕吐

答案：D

85.双膦酸盐类药物的作用机制不包括

A: 直接改变破骨细胞的形态学

B: 增加小肠和肾小管对钙的重吸收

C: 抑制骨吸收性

D: 与骨基质理化结合，干扰骨吸收

答案：B

86.对氨基水杨酸抗结核菌作用原理是()

A: 形成NAD的同系物，抑制结核菌生长

B: 干扰叶酸合成

C: 抑制DNA回旋酶

D: 抑制蛋白质合成

答案：A

87.抑制磷酸二酯酶，增加细胞内的cAMP含量，缓解慢性心力衰竭症状()

A: 地高辛

B：硝普钠

C：氨力农

D：多巴酚丁胺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/217116113052010024