

外科护理学（校内）-知到答案、智慧树答案

第一章单元测试

1、[选择题]: 评估及满足病人的基本需要是外科护士的全部工作

选项:

A:对

B:错

参考正确答案:【错】

2、[选择题]: 现代外科学奠基于19世纪40年代

选项:

A:对

B:错

参考正确答案:【对】

3、[选择题]: 外科疾病不是都需要手术

选项:

A:对

B:错

参考正确答案:【对】

第二章单元测试

1、[选择题]: 下列哪一种情况易引起高渗性脱水

选项:

A:上消化道梗阻

B:大面积烧伤早期

C:静脉大量等渗盐水

D:高热大汗

参考正确答案:【上消化道梗阻;

静脉大量等渗盐水;

高热大汗】

2、[选择题]: 高渗性脱水是指

选项:

A:混合性失水

B:以缺钠为主

C:以缺钾为主

D:以失水为主

参考正确答案:【以失水为主】

3、[选择题]: 一般等渗性脱水者宜输给何种液体

选项:

A:10%葡萄糖液

B:11.2%乳酸钠

C:右旋糖酐

D:等渗盐水和葡萄糖液

参考正确答案:【等渗盐水和葡萄糖液】

4、[选择题]: 等渗性脱水以急性脱水为特征

选项:

A:对

B:错

参考正确答案:【对】

5、[选择题]: 引发等渗性脱水的原因不包括

选项:

A:肠梗阻

B:大面积烧伤早期

C:经过长期胃肠减压的病人

D:大面积烧伤晚期

参考正确答案:【经过长期胃肠减压的病人】

6、[选择题]: 高渗性缺水早期主要的临床表现是

选项:

A:口渴

B:尿量减少

C:血压下降

D:烦躁不安

参考正确答案:【口渴】

7、[选择题]: 外科病人最常见的缺水的类型

选项:

A:高渗性脱水

B:等渗性脱水

C:低渗性脱水

D:原发性脱水

参考正确答案:【等渗性脱水】

8、[选择题]: 下列哪一种情况易引起低渗性脱水

选项:

A:长期应用排钠利尿剂

B:持续胃肠减压

C:大面积创伤慢性渗液

D:等渗性缺水治疗时未及时补钠

参考正确答案:【长期应用排钠利尿剂;

持续胃肠减压;

大面积创伤慢性渗液;

等渗性缺水治疗时未及时补钠】

9、[选择题]: 维持细胞外液渗透压主要离子是

选项:

A:钾离子

B:钙离子

C:镁离子

D:钠离子

参考正确答案:【钠离子】

10、[选择题]: 细胞内液最主要的阳离子是钠离子

选项:

A:对

B:错

参考正确答案:【错】

第三章单元测试

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/217130110003006054>