

# 2024年上海嘉定区牙病防治所招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、儿童临床上易发生的脑疝常见于（ ）。

- A. 脑肿瘤
- B. 脑梗塞
- C. 脑寄生虫
- D. 脑积水
- E. 脑脓肿

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2、关于医患关系，错误的是（ ）。

- A. 随着技术的进步，医患关系在很大程度上被物化了
- B. 医患关系的物化必然割裂了医生和患者的情感
- C. 医患关系已从传统的道德调整向道德调整和法律规范的过渡
- D. 医患关系的法制化趋势对医生的职业道德提出了越来越高的要求
- E. 医患之间的不协调的出现和增加在一定程度上说明了医患关系的民主化趋势

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

3、患儿，2岁，发热1天出现皮疹，为红色斑丘疹，由面部开始，一日遍及全身，伴枕部、耳后及颈部淋巴结肿大，诊断最可能为（ ）。

- A. 幼儿急疹
- B. 风疹
- C. 麻疹
- D. 猩红热
- E. 荨麻疹

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

4、下列不是血气胸开胸手术处理指征的是（ ）。

- A. 大的开放性胸壁伤的闭合修补
- B. 大咳血不止
- C. 胸腔活动性出血，血压下降
- D. 张力性气胸与支气管断裂；引流瓶中持续大量溢气，肺仍不复张者
- E. 胸腔闭式引流后呼吸系统症状缓解，血压稳定者

【正确答案】

E

【答案解析】

胸腔闭式引流后呼吸系统症状缓解，血压稳定者可继续观察，暂不需行开胸手术。

5、下列对于增强子的叙述错误的是（ ）。

- A. 增强子是远离启动子的顺式作用元件
- B. 增强子决定基因表达的组织特异性
- C. 增强子作用无方向性
- D. 增强子在基因的上游或下游均对基因的转录有增强作用
- E. 增强子只在个别真核生物中存在，无普遍性

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

6、阑尾切除术最常见的并发症是（ ）。

- A. 出血
- B. 粪瘘
- C. 腹腔脓肿
- D. 切口感染
- E. 粘连性肠梗阻

【正确答案】

D

【答案解析】

阑尾炎的并发症包括腹腔脓肿；内、外瘘形成；肝门静脉炎等。阑尾炎切除术后并发症包括：术后出血；切口感染，是最常见的术后并发症；粘连性肠梗阻，较常见；阑尾残株炎；粪瘘很少见。

7、胎心变化中，不能诊断胎儿窘迫的是（ ）。

- A. 胎心率 $<120$ 次/分
- B. 胎心率 $>160$ 次/分
- C. 胎心早期减速
- D. 胎心晚期减速
- E. 胎心变异减速

【正确答案】

C

【答案解析】

早期减速与宫缩时胎头受压有关，变异减速与宫缩时脐带受压有关，晚期减速一般为胎盘功能不良、胎儿缺氧的表现。胎儿瞬时胎心率 $>160$ 次/分是胎儿良好的表现，但选项中未明确指出，应为基线胎心率。基线胎心率 $>160$ 次/分与胎儿窘迫有关。

8、关于感染性休克患者应用糖皮质激素的依据与方法，不正确的是（ ）。

- A. 糖皮质激素可以稳定细胞及溶酶体膜，免受内毒素破坏
- B. 大剂量糖皮质激素对心脏发挥正性肌力作用
- C. 适当应用糖皮质激素可以减少并发症
- D. 糖皮质激素应从大剂量开始使用
- E. 要取得疗效至少要使用5天

【正确答案】

E

【答案解析】

糖皮质激素能抑制多种炎症介质的释放和稳定溶酶体膜，缓解SIRS（全身炎症反应综合征）。但应用限于早期、用量宜大，可达正常用量的10~20倍，维持不宜超过48小时。

9、对左侧特发性面神经麻痹的叙述无误的是（ ）。

- A. 左咬肌无力
- B. 左侧舌后2/3味觉减退或消失

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/218035006137006040>