

内科护理练习题与答案

1、患者女, 44 岁。心肌梗死住院治疗。首次静脉泵入硝酸甘油时, 在 30 分钟内应特别注意的是

- A、尿量
- B、中心静脉压
- C、血氧饱和度
- D、心率
- E、血压
- F、尿量
- G、中心静脉压
- H、血氧饱和度

答案: E

2、下列不属于心房颤动临床特点的是

- A、房颤病人症状不受心室率快慢的影响
- B、房颤可突然发生突然终止
- C、第一心音强弱不等
- D、心律绝对不规则
- E、有短绌脉

答案: A

3、不属于十二指肠溃疡疼痛特点的是

- A、上腹正中或偏右
- B、进食后 30~60 分钟, 至下次进餐缓解
- C、饥饿感或烧灼感
- D、常有午夜疼痛
- E、常伴返酸暖气

答案: B

4、高血压患者的心电图常见表现有

- A、室性期前收缩
- B、室上性心动过速
- C、心房颤动
- D、右室劳损
- E、左室肥大

答案: E

5、护士指导梗阻性肥厚型心肌病病人避免屏气的主要目的是

- A、避免心衰

- B、避免出血
- C、防止晕厥
- D、防止栓塞
- E、防止抽搐

答案：C

6、某慢性肺源性心脏病病人，喘憋明显，略有烦躁，在治疗过程中，应慎用镇静药，以避免

- A、洋地黄中毒
- B、双重感染
- C、脱水、低血钾
- D、诱发肺性脑病
- E、加重心力衰竭

答案：D

7、张某，30岁，溃疡病，今并发大出血，此时不可能出现

- A、黑粪
- B、休克
- C、呕吐
- D、疼痛加剧
- E、昏厥

答案：D

8、病人在治疗过程中，判断结核化疗效果，最重要的指标是

- A、PPD 试验阴性
- B、体温恢复正常，体重增加
- C、盗汗停止
- D、痰结核菌转阴
- E、病灶吸收好转

答案：D

9、患者男性，38岁。诊断缩窄性心包炎收入院，其临床特征不包括

- A、劳力性呼吸困难
- B、食欲缺乏，上腹部胀满或疼痛
- C、乏力，运动耐量下降
- D、脉压增大
- E、心包叩击音

答案：D

10、下列疾病的心脏叩诊中，可听到心包叩击音的是

- A、心包积液
- B、病毒性心肌炎
- C、急性心包炎
- D、缩窄性心包炎
- E、肥厚性心肌病

答案：D

11、针对心源性呼吸困难应采取的护理措施是

- A、保持半卧位
- B、加强心电监护
- C、监测体重变化
- D、做好口腔护理
- E、做好皮肤护理

答案：A

12、下列哪项属于肺源性心脏病失代偿期的表现

- A、A 肺动脉瓣区第二心音亢进
- B、心室肥大
- C、吸音减弱
- D、睡、神志恍惚
- E、底干湿罗音

答案：D

13、患者女，32岁。因反复喘息发作20年，加重3天入院。查体：双肺散在哮鸣音。诊断支气管哮喘。则下列对其预防哮喘复发的指导措施中，正确的是

- A、循序渐进地参加跑步等大运动强度的运动，增强体质
- B、避免进食鱼肉和鸡蛋等可能诱发哮喘的食物
- C、根据个人喜好在室内摆放少量花草，保持心情舒适
- D、使用哮喘菌苗，有效时应坚持半年以上
- E、应避免使用色甘酸钠等抗炎药物

答案：B

14、未曾接种卡介苗的3岁以下儿童结核菌素试验阳性，提示

- A、机体反应性差
- B、需接种卡介苗
- C、患有活动性结核病
- D、曾有结核菌感染
- E、严重营养不良

答案：C

15、患者男, 31 岁。因梗阻性肥厚型心肌病入院治疗, 患者常有胸痛症出现, 护士须告知其避免胸痛发作的诱因, 其中不包括

- A、突然屏气
- B、持举重物
- C、情绪激动
- D、饱餐
- E、长时间卧床

答案：E

16、急性心梗患者突然出现明显呼吸困难, 两肺满布湿啰音, HR100 次/分, 律齐, 此时首先应考虑的诊断是

- A、肺部感染
- B、肺梗塞
- C、急性左心衰
- D、心脏破裂
- E、室壁瘤形成

答案：C

17、支气管肺癌最常见的早期症状是

- A、发热
- B、刺激性呛咳
- C、胸痛
- D、喘鸣
- E、血痰

答案：B

18、使左心室前负荷加重的是

- A、冠心病
- B、高血压心脏病
- C、主动脉瓣关闭不全
- D、二尖瓣狭窄
- E、慢性肺源性心脏病

答案：C

19、关于肺炎球菌肺炎的临床表现, 下列哪项不正确

- A、A
- B、有畏寒、高热及咳嗽、脓痰
- C、临床症状典型者可咳砖红色胶冻状痰

- D、病变累及胸膜时，患侧有胸膜性胸痛
- E、严重感染者可发生神志模糊，烦躁不安，昏迷等

答案：C

20、病人, 女性, 41 岁。患有肥厚型心肌病, 因胸痛 1 小时急诊入院。该病人首要的护理措施是

- A、预防呼吸道感染
- B、建立静脉通路
- C、给予高热量饮食
- D、给予 1~2L/min
- E、绝对卧床

答案：E

21、下列哪项不是急性心肌梗死的先兆表现

- A、心绞痛变得剧烈而频繁
- B、诱因变得更加明显
- C、发作时间延长
- D、发作时伴恶心呕吐
- E、心电图见 S-T 段一过性抬高

答案：B

22、急性心肌梗死的心电图特征不包括

- A、ST 段呈弓背状向上明显抬高
- B、异常深而宽的 Q 波
- C、ST 段下移
- D、T 波倒置
- E、Q 波大多永久存在

答案：C

23、患者男性，50 岁，因肝硬化腹水入院。住院期间患者突然出现淡漠少言，神情恍惚，衣冠不整，吐词不清。下列护理措施中不正确的是

- A、乳果糖口服
- B、肥皂水清洁灌肠
- C、硫酸镁导泻
- D、白醋加生理盐水灌肠
- E、番泻叶液口服

答案：B

24、患者，女性，48 岁，心电图提示 II、III、aVF 导联有典型的心肌梗死波形伴偶发室性早搏。护理上述病人，不宜采取哪项护理措施

- A、病情平稳后搀扶病人入院
- B、持续给氧
- C、吗啡止痛
- D、静脉滴注利多卡因
- E、给镇静药

答案：A

25、患者男性，25岁。急性心包炎入院。行X线检查，心影多呈

- A、梨形
- B、向左侧增大
- C、向两侧增大，立位时呈烧瓶样
- D、向两侧增大，立位时呈球形
- E、靴形

答案：C

26、关于体位引流，下列哪项描述不妥

- A、引流时使病变部位支气管开口向下
- B、引流应在餐后进行
- C、为加强引流效果，可同时辅以胸部叩击
- D、每次引流时间不超过30分钟
- E、引流后帮助患者采取舒适体位

答案：B

27、张先生，45岁，上消化道出血，烦躁、尿少、面然苍白、四肢湿冷，血压10.6/8.0kPa，出血量约在700ml。上消化道出血多的病人应先用“生理盐水”快速静脉输入，其作用为

- A、维持胶体渗透压
- B、扩充血容量
- C、纠正酸中毒
- D、补充热量
- E、为输血做准备

答案：B

28、成人结核病最常见的类型是

- A、原发型肺结核
- B、血行播散型肺结核
- C、发型肺结核
- D、核型胸膜炎
- E、外结核

答案：C

29、II型呼吸衰竭不出现的是

- A、头痛
- B、上消化道出血
- C、蛋白尿
- D、精神、神经症状
- E、PaCO₂降低

答案：E

30、男性，35岁，1月前出现腹痛、上腹部饱胀、暖气，幽门螺杆菌检查结果阳性，给予抗生素最适宜的是

- A、四环素
- B、红霉素
- C、庆大霉素
- D、头孢霉素
- E、阿莫西林

答案：E

31、慢性肺源性心脏病伴急性呼吸道感染时，易诱发心力衰竭。其主要的
作用因素是

- A、病原体对心肌的毒性刺激
- B、病原体增加肺毛细血管的通透性
- C、缺氧、二氧化碳潴留致肺小动脉痉挛
- D、继发性红细胞增多，血液黏稠度增加
- E、发热引起低血容量，造成心排血量减少

答案：C

32、患者男，49岁。溃疡性结肠炎病史11年余，近1周求腹痛加剧，每天排便20余次，呈血水样。下列饮食指导正确的是

- A、多喝牛奶
- B、多吃新鲜水果
- C、多吃含纤维素蔬菜
- D、暂禁食
- E、多喝果汁

答案：D

33、缺氧的典型表现是

- A、呼吸困难
- B、发绀

- C、意识障碍
- D、肺功能下降
- E、球结膜水肿

答案：B

34、患者，女性，65岁，支气管哮喘患者。每次呼吸道感染后就会有哮喘发作。对其健康教育最重要的是

- A、避免接触花粉
- B、预防上呼吸道感染
- C、少吃鱼虾
- D、保持乐观情绪
- E、避免接触尘螨

答案：B

35、患者男，40岁。因劳累近2周自感头晕、头痛，连续3次测血压值为21.3/13.3kPa(160/100mmHg)，休息后血压可自行恢复正常，诊断首先考虑

- A、急进性高血压
- B、慢性肾炎
- C、甲状腺功能亢进症
- D、原发性高血压
- E、SL

答案：D

36、关于对心律失常患者的健康指导，不妥的叙述是

- A、注意休息，劳逸结合
- B、防治原发病，避免诱因
- C、遵医嘱服用抗心律失常药物
- D、可选择辛辣食物以促进食欲
- E、定期门诊复查

答案：D

37、溃疡并发幽门梗阻时的护理措施是

- A、流质饮食
- B、每餐前洗胃
- C、减少补液
- D、忌胃肠减压
- E、记出入液量

答案：E

38、患者女性，50岁，以突然寒战，高热、咳嗽咳痰入院，诊断为肺炎球菌肺炎，请问肺炎球菌肺炎实变期患者的痰液呈

- A、粉红色乳状痰
- B、脓性泡沫痰
- C、脓臭痰
- D、红棕色黏稠胶冻状痰
- E、铁锈色

答案：E

39、急性心肌梗死患者发生左心衰竭的主要原因是

- A、肺部感染
- B、心脏负荷加重
- C、房室传导阻滞
- D、情绪激动
- E、心肌收缩力减弱和不协调

答案：E

40、护士为社区的慢性阻塞性肺疾病患者进行呼吸训练的指导时，应指导患者吸气与呼气时间比最好控制在

- A、吸气：呼气=2:1
- B、吸气：呼气=1.5:1
- C、吸气：呼气=1:1.5
- D、吸气：呼气=1:2
- E、吸气：呼气=1:2.5

答案：D

41、患者女性，20岁，因昨天淋雨夜里突然发生寒战，高热，咳嗽而急诊入院，X线检查：上肺有大片炎症阴影，诊断肺炎球菌肺炎，治疗肺炎球菌性肺炎，停用抗生素的指标一般是

- A、体温降至正常后3天
- B、体温降至正常后1周
- C、体温降至正常后2周
- D、症状体征完全消失
- E、X线示炎症阴影完全消失

答案：A

42、患者男性，38岁，心悸、气短，伴双下肢水肿6个月，胸部体检双肺底可闻及细小湿啰音，心脏向左下扩大，心音低钝，心尖区可闻及3/6级收缩期吹风样杂音，肝大，否认发热和游走性关节肿痛史。首先应考虑的诊断是

- A、风湿性心脏病
- B、先天性心脏病
- C、扩张型心肌病
- D、急性病毒性心肌炎
- E、冠状动脉粥样硬化性心脏病

答案：C

43、肺炎球菌肺炎时产生的铁锈色痰最主要的原因是

- A、痰内有大量红细胞
- B、痰内含大量脓细胞
- C、WBC 破坏时所产生的溶蛋白酶
- D、RBC 破坏释放含铁血黄素
- E、红细胞碎屑被巨噬细胞吞噬

答案：D

44、风湿性二尖瓣关闭不全最主要的特征是

- A、心脏向左下扩大
- B、胸骨左缘第 3、4 肋间有舒张期杂音
- C、周围血管征
- D、心尖部收缩期吹风样杂音
- E、胸骨右缘第 2 肋间收缩期喷射性杂音

答案：D

45、正确的结核菌素试验结果判断方法正确的是：

- A、A
- B、注射后 24 小时测量皮肤局部硬块直径
- C、注射后 72 小时测量皮肤局部红晕直径
- D、注射后 72 小时测量皮肤局部硬块直径
- E、注射后 72 小时测量皮肤局部硬块或红晕直径

答案：D

46、判断 I 型呼吸衰竭的血气分析标准应是

- A、A
- B、仅有 PaO₂ 低于 60mmHg
- C、pH<7.35
- D、仅有 PaCO₂ 高于 50mmHg
- E、动脉血氧饱和度低于 90%

答案：B

47、患者女,62 岁。患 2 级高血压,下列不宜向她建议的是

- A、增加饮食中的镁
- B、戒烟
- C、长期卧床
- D、少饮酒
- E、低钠盐饮食

答案：C

48、关于肺癌的综合治疗，下列说法正确的是

- A、A
- B、小细胞肺癌以化疗为主
- C、非小细胞肺癌都考虑手术治疗
- D、有远处转移的晚期病人不宜行放疗
- E、有远处转移的晚期病人宜先做手术切除再行化疗

答案：B

49、可使人体产生对结核菌获得性免疫力的预防措施是

- A、进行卡介苗接种
- B、普及结核病防治知识
- C、及时发现并治疗病人
- D、隔离病人、消毒衣物
- E、加强锻炼，增强体质

答案：A

50、最常用于确诊心瓣膜病的检查是

- A、心电图
- B、超声心动图
- C、心脏CT
- D、心脏X线
- E、动态心动图

答案：B

51、患者女性，36岁，间断发作下腹部疼痛伴腹泻2年，每天排便3~4次，为脓血便，常有里急后重，排便后疼痛缓解。该患者最可能的诊断是

- A、慢性腹泻
- B、阿米巴脓肿
- C、肠结核
- D、肠易激综合征
- E、溃疡性结肠炎

答案：E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/218052051022006036>