专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年河北省固安县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背200题真题带答案（新）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.对痉挛性和功能性便秘者，可选用

A：酪酸菌

B：地芬诺酯

C：双歧杆菌

D：双歧三联活菌胶囊

答案：C

2.大剂量对纯合子家族性高胆固醇血症有效的他汀类调血脂药是

A：普伐他汀

B：阿伐他汀

C：氟伐他汀

D：藻酸双酯钠

答案：B

3.长期大量应用头孢菌素类抗菌药物的患者，须注意适当补充

A：维生素C和烟酸

B：维生素A和维生素D

C：维生素E和叶酸

D：复合维生素B和维生素K

答案：D

4.依诺沙星与华法林合用

A：药理作用拮抗

B：后者血药浓度升高，不良反应增加

C：不良反应叠加

D：后者血药浓度下降，药效降低

答案：B

5.抗酸作用较强、较快，有导泻作用

A：氢氧化镁

B：氢氧化铝

C：碳酸钙

D：三硅酸镁

答案：A

6.为阳离子表面活性剂，有广谱杀菌、抑菌作用，吸附在细菌胞壁后，改变其表面结构和渗透平衡，使胞浆内成分渗漏，高浓度时可使胞浆凝固，抑制细胞壁修复而呈杀菌作用，且不易产生耐药性的消毒防腐药是

A：依沙吖啶

B：聚维酮碘

C：氯己定

D：过氧乙酸

答案：C

7.（2015年真题）单纯饮食控制及体育锻炼无效的2型糖尿病肥胖者首选的降糖药是（）。

A：格列美脲

B：普萘洛尔

C：二甲双胍

D：瑞格列奈

答案：C

8.不可用于降低眼压的药物是

A：卡替洛尔滴眼剂

B：拉坦前列素滴眼剂

C：毛果芸香碱滴眼剂

D：利福平滴眼剂

答案：D

9.血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)应避免与其联合应用的是()

A：噻嗪类利尿药

B：β 受体阻断药

C：人促红素

D：留钾利尿药

答案：D

10.可使吲达帕胺利尿作用增强的是

A：拟交感药

B：多巴胺

C：考来烯胺

D：胺碘酮

答案：B

11.患者，男，50岁。旅游登山时突发头晕，症状持续不缓解。查体：148/90mmHg，心率80次/分，医嘱卡托普利、氢氯噻嗪治疗。

A：阻断AT1受体

B：作用于RAAS初始环节，从源头减少血管紧张素Ⅱ的生成

C：抑制循环系统的转换酶，减少血管紧张素Ⅱ的生成

D：促进缓激肽水解

答案：C

12.喷托维林与水合氯醛合用会出现

A：反射亢进，异常发热、昏睡

B：支气管平滑肌痉挛

C：中枢神经系统和呼吸系统抑制作用增强

D：精神症状

答案：C

13.（2016年真题）具有成瘾性的中枢性镇咳药是

A：右美沙芬

B：可待因

C：苯丙哌林

D：氯化铵

答案：B

14.可引起尖端扭转型室性心律失常的药物是

A：异烟肼

B：吡嗪酰胺

C：乙胺丁醇

D：红霉素

答案：D

15.四环素联用抗凝药需要

A：增加麦角中毒的风险

B: 口服吸收减少

C: 肝毒性增加

D: 调整抗凝血药的剂量

答案：D

16.属于短效苯二氮类的药物是

A: 劳拉西泮地收育

B: 三唑仑

C: 艾司唑仑

D: 替马西泮

答案：B

17.（2020年真题）属于高效利尿剂，耳毒性低，适用于有听力缺陷及急性肾衰竭患者的药物是

A: 布美他尼

B: 托拉塞米

C: 呋塞米

D: 依他尼酸

答案：A

18.特比萘芬临床上作为()的首选药

A: 孢子丝菌病

B: 皮肤癣菌病

C: 着色芽生菌病

D: 曲霉病

答案：B

19.属于合成的麻醉性镇痛药的是

A：吗啡

B：可待因

C：布洛芬

D：美沙酮

答案：D

20.对M3受体选择性高，可避免心脏及中枢神经系统的严重不良反应，用于治疗膀胱过度活动症用药的是

A：托特罗定

B：奥昔布宁

C：黄酮哌酯

D：索利那新

答案：D

21.不易发生“双硫仑样”反应的药物是()

A：头孢曲松

B：头孢替安

C：头孢他啶

D：头孢哌酮

答案：C

22.属于维生素K类抗出血药的是

A：氨甲环酸

B：艾曲泊帕乙醇胺

C：酚磺乙胺

D：甲萘氢醌

答案：D

23.治疗钙缺乏症()

A：葡萄糖酸钙

B：依降钙素

C：阿仑膦酸钠

D：阿法骨化醇

答案：A

24.睾酮治疗原发性和继发性男性性功能低下最有效的给药方法是

A：口服给药

B：透皮给药

C：肠道外给药

D：注射给药

答案：D

25.选择性舒张脑血管的药物是

A：地尔硫革

B：维拉帕米

C：硝苯地平

D：氟桂利嗪

答案：D

26.治疗间日疟和三日疟首选的联合方案是

A：咯萘啶或甲氟喹

B：乙胺嘧啶+磺胺药

C：氯喹+伯氨喹

D：静脉滴注奎宁

答案：C

27.与其他抗真菌药无交叉耐药性的棘白霉素类抗真菌药是

A：阿糖胞苷

B：氟胞嘧啶

C：两性霉素

D：卡泊芬净

答案：D

28.（2017年真题）对需氧革兰阴性菌具有抗菌活性，属于单酰胺类的抗菌药物是（）

A：拉氧头孢

B：头孢西丁

C：氨曲南

D：头孢吡肟

答案：C

29.通过影响疟原虫红内期的超微结构，阻断了疟原虫营养摄取的药物是

A：奎宁

B：青蒿素

C：乙胺嘧啶

D：吡喹酮

答案：B

30.属于 β 受体阻断剂的降低眼压药是()。

A：乙酰唑胺

B：噻吗洛尔

C：毛果芸香碱

D：甘露醇

答案：B

31.对G

A：第二代头孢菌素

B：第一代头孢菌素

C：第三代头孢菌素

D：第四代头孢菌素

答案：B

32.铵属于M胆碱受体阻断剂的是

A：福莫特罗

B：异丙托溴

C：乙酰胆碱

D：孟鲁司特

答案：B

33.噻唑烷二酮类药物可降低

A：血红蛋白

B：体重

C：女性骨折的风险

D：血容量

答案：A

34.（2015年真题）属于超强效的外用糖皮质激素是（）。

A：地塞米松

B：氢化可的松

C：曲安奈德

D：卤米松

答案：D

35.（2020年真题）关于维A酸软膏治疗痤疮的说法，错误的是

A：为了加强疗效，可以一日多次给药

B：不宜用于皮肤皱褶部位

C：有明确的致畸性，妊娠期妇女禁用

D：使用初期可能出现皮肤干燥或脱屑，对紫外光敏感性增强，宜在睡前使用

答案：A

36.导致胃肠道溃疡及出血风险较其他传统非甾体抗炎药低的是

A：布洛芬

B：塞来昔布

C：吲哚美辛

D：对乙酰氨基酚

答案：B

37.通过抑制血管紧张素转化酶产生作用，长期应用有可能导致血钾升高的降压药是

A：维拉帕米

B：卡托普利

C：硝酸甘油

D：哌唑嗪

答案：B

38.四环素联用钙剂使

A：调整抗凝血药的剂量

B：增加麦角中毒的风险

C：肝毒性增加

D：口服吸收减少

答案：D

39.中枢性或肾性尿崩症可选用

A：呋塞米

B：氢氯噻嗪

C：螺内酯

D：乙酰唑胺

答案：B

40.通过监测国际标准化比值（INR）调整给药剂量的药物是（）

A：地高辛

B：茶碱

C：华法林

D：丙戊酸钠

答案：C

41.属于孕激素类的是

A：己烯雌酚

B：甲地孕酮

C：他莫昔芬

D：睾酮

答案：B

42.治疗厌氧菌引起的严重感染的药物是

A：万古霉素

B：克拉霉素

C：克林霉素

D：红霉素

答案：C

43.不属于普罗帕酮作用特点的是

A：属于Ⅰc类抗心律失常药

B：适用于室上性和室性心律失常

C：在胃肠道中吸收良好，血浆蛋白结合率高

D：无肝首过效应

答案：D

44.常规剂量应用多潘立酮不易导致的不良反应是

A：室性心律失常

B：女性月经不调

C：男子乳房女性化

D：锥体外系反应

答案：D

45.使用氢化可的松大剂量冲击治疗时，用药时间一般不超过

A：7日

B：1日

C：5日

D：3日

答案：D

46.右美沙芬与吗氯贝胺合用会出现

A：支气管平滑肌痉挛

B：中枢神经系统和呼吸系统抑制作用增强

C：精神症状

D：反射亢进，异常发热、昏睡

答案：D

47.锥体外系疾病、亨廷顿病者禁用的药物是

A：氟西汀

B：吗氯贝胺

C：文拉法辛

D：吡拉西坦

答案：D

48.属于多巴胺受体阻断剂的止吐药物是

A：甲地孕酮

B：甲氧氯普胺

C：阿瑞吡坦

D：格雷司琼

答案：B

49.具有抗炎作用,可用于各型肝炎治疗的药物是()

A：双环醇

B：门冬氨酸钾镁

C：异甘草酸镁

D：多烯磷脂酰距

答案：C

50.偶发失眠和暂时失眠可使用

A：苯巴比妥

B：地西泮

C：唑吡坦

D：卡马西平

答案：C

51.下述不属于抗血小板类药物的是

A：整合素受体阻断剂

B：环氧酶抑制剂

C：二磷酸腺苷P2Y12受体激动剂

D：磷酸二酯酶抑制剂

答案：C

52.下列属于 β 受体阻断剂的是

A：卡托普利

B：美托洛尔

C：螺内酯

D：阿利吉仑

答案：B

53.适用于哺乳期妇女治疗甲亢的药物是

A：卡比马唑

B：丙硫氧嘧啶

C：碘剂

D：甲巯咪唑

答案：B

54.大剂量应用甲氨蝶呤后，可用()进行解救

A：别嘌醇

B：苯溴马隆

C：亚叶酸钙

D：丙磺舒

答案：C

55.关于聚乙二醇4000治疗便秘的说法，错误的是

A：疗程不宜过长

B：肠梗阻患者禁用

C：作用机制为刺激肠道分泌，增加粪便含水量以软化粪便

D：适用人群为成人及8岁以上儿童

答案：C

56.有癫痫或精神病史的患者应慎用哪种药

A：异烟肼

B：乙胺丁醇

C：吡嗪酰胺

D：利福平

答案：A

57.与鲑降钙素合用，有可能急速降血钙，出现严重低钙血症的是

A：铁剂

B：双膦酸盐类骨吸收抑制剂

C：钙剂

D：维生素D

答案：B

58.用于治疗疥疮的药物有()

A：硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比泰芬软膏

B：克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维A酸软膏

C：克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏

D：林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏

答案：D

59.与醛固酮受体竞争性结合，拮抗醛固酮作用的保钾排钠药物是

A：氨苯蝶啶

B：乙酰唑胺

C：螺内酯

D：甘露醇

答案：C

60.与第二代溶栓酶相比，瑞替普酶的作用优势不包括()

A：全身纤溶活性大于链激酶、阿替普酶

B：血浆半衰期长，栓塞开通率高，给药方便

C：给药较方便，可以为抢救患者赢得时间

D：具有较强的、特异的纤维蛋白选择性

答案：A

61.考来替泊的降脂作用机制主要是

A：增加脂蛋白酶活性

B：抑制脂肪分解

C：阻滞胆汁酸在肠道的重吸收

D：抑制细胞对LDL的修饰

答案：C

62.（2020年真题）口服后在肝脏水解为阿昔洛韦而发挥抗疱疹病毒作用的药物是

A：泛昔洛韦

B：伐昔洛韦

C：昔多福韦

D：喷昔洛韦

答案：B

63.下列不属于凝血因子X抑制剂的是

A：阿哌沙班

B：利伐沙班

C：华法林

D：磺达肝癸钠

答案：C

64.丙硫氧嘧啶最严重的不良反应是

A：粒细胞缺乏症

B：关节痛

C：头痛

D：胃肠道反应

答案：A

65.患者，女，56岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食，增强运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片治疗。

A：Hcy

B：CK

C：Cr

D：BUN

答案：B

66.对地高辛中毒出现心动过缓者可静脉注射

A：苯妥英钠

B：氯化钾、葡萄糖注射液

C：利尿剂

D：阿托品

答案：D

67.急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔前可使用()

A：2%酚甘油滴耳液

B：2%过氧化氮溶液

C：3%过氧化氢溶液

D：3%酚甘油滴耳液

答案：A

68.化学结构与醛固酮相似

A：氢氯噻嗪

B：乙酰唑胺

C：螺内酯

D：呋塞米

答案：C

69.肾上腺糖皮质激素类药物的共同药理作用不包括

A：免疫抑制

B：抗病毒

C：抗休克

D：抗炎

答案：B

70.由我国学者发现并用于抗疟的是

A：链霉素

B：二氯沙奈

C：青蒿素

D：甲硝唑

答案：C

71.属于钙通道阻滞剂，静脉注射用于终止阵发性室上性心动过速的是()

A：苯妥英钠

B：利多卡因

C：维拉帕米

D：普鲁卡因胺

答案：C

72.服用伊马替尼的时间是

A：睡前

B：餐前1小时

C：进餐时

D：餐后2小时

答案：C

73.四环素联用红霉素使

A：增加麦角中毒的风险

B：肝毒性增加

C：调整抗凝血药的剂量

D：口服吸收减少

答案：B

74.关于 α 葡萄糖苷酶抑制剂的作用特点描述，不正确的是

A: 口服吸收很少

B: 临床用于各型糖尿病

C: 可单用于老年患者或餐后高血糖患者

D: 易导致低血糖

答案：D

75.（2018年真题）配制静脉输液时;应先用灭菌注射用水溶解,然后用5%葡萄糖注射液稀释,不可用氯化钠注射液稀释的抗真菌药是（）

A: 卡泊芬净

B: 两性霉素B

C: 氟康唑

D: 伏立康唑

答案：B

76.服药后尿、唾液、汗液、痰液、泪液等排泄物均可显橘红色的药物是（）

A: 吡嗪酰胺

B: 链霉素

C: 利福平

D: 乙胺丁醇

答案：C

77.婴儿尿布皮炎外用激素制剂应限于

A: 5～7天

B: 3天

C: 3～5天

D: 2周

答案：A

78.繁殖期杀菌药是

A: 氯霉素

B: 异烟肼

C: 磺胺嘧啶

D: 头孢菌素

答案：D

79.制成脂质体以降低药物肾毒性的抗真菌药是

A: 阿糖胞苷

B: 氟胞嘧啶

C: 两性霉素

D: 卡泊芬净

答案：C

80.有关可乐定的叙述，错误的是

A: 可乐定可用于治疗重度高血压

B: 可乐定可用于治疗高血压危象

C: 可乐定是中枢性降压药

D: 可乐定可用于治疗中度高血压

答案：A

81.变异型心绞痛不宜选用的药物是()

A: 普萘洛尔

B: 硝苯地平

C: 胍乙啶

D: 硝酸甘油

答案：A

82.可使血小板内环磷腺苷(cAMP)浓度增高而产生抗血小板作用的药品是()。

A: 双嘧达莫

B: 替罗非班

C: 阿司匹林

D: 氯吡格雷

答案：A

83.口服后在肝脏水解为阿昔洛韦而发挥抗疱疹病毒作用的药物是

A: 昔多福韦

B: 泛昔洛韦

C: 喷昔洛韦

D: 伐昔洛韦

答案：D

84.下列药物使用期间需要缓慢停药的是

A: 氨氯地平

B: 依那普利

C: 地尔硫?

D: 比索洛尔

答案：D

85.糖尿病选用

A: 丙硫氧嘧啶

B: 放射性碘

C：大剂量碘剂

D：格列齐特

答案：D

86.与避孕药同时服用，不会导致避孕失败的药物是

A：苯巴比妥

B：四环素

C：利福平

D：环孢素

答案：D

87.糖皮质激素的免疫抑制作用是

A：提高机体对细菌内毒素的耐受力

B：抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理

C：抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶

D：提高中枢神经系统的兴奋性

答案：B

88.弥散性血管内凝血早期可选用()

A：肝素

B：尿激酶

C：叶酸

D：维生素K

答案：A

89.氯霉素类

A：禁用于8岁以下儿童

B：禁用于18岁以下儿童及青少年

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/218056057045007022