专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024甘肃省天祝藏族自治县《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题真题【精选题】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.恶性贫血可选用

A：维生素B

B：维生素K

C：肝素

D：香豆素类

答案：A

2.青光眼患者应慎用

A：沙美特罗

B：沙丁胺醇

C：噻托溴铵

D：孟鲁司特

答案：C

3.帕罗西汀用于治疗抑郁症、社交恐怖障碍，成人的起始剂量为每日

A：50mg

B：60mg

C：20mg

D：100mg

答案：C

4.可引起前庭功能失调（眩晕）的抗菌药物是

A: 左氧氟沙星

B: 哌拉西林

C: 米诺环素

D: 甲硝唑

答案：C

5.噻嗪类利尿药发挥利尿作用的主要作用靶点是

A: Na+-Cl-共转运子

B: Na+-K+-2Cl-同向转运子

C: 磷酸二酯酶

D: 远曲小管近端

答案：A

6.属于第四代头孢菌素常用药物的是()。

A: 头孢拉定

B: 头孢吡肟

C: 头孢克洛

D: 头孢克肟

答案：B

7.患者，女，40岁。癫痫病史3年，近来常觉头痛，测量血压为170／110mmHg。

A: 氢氯噻嗪

B: 普萘洛尔

C: 利血平

D: 硝苯地平

答案：C

8.特比萘芬临床上作为()的首选药

A: 曲霉病

B: 着色芽生菌病

C: 皮肤癣菌病

D: 孢子丝菌病

答案：C

9.患者，女，十二指肠溃疡，幽门螺杆菌(+)，可选用

A: 阿莫西林

B: 双氯西林

C: 万古霉素

D: 苄星青霉素

答案：A

10.长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是（）

A: 链霉素

B: 吡嗪酰胺

C: 利福平

D: 乙胺丁醇

答案：A

11.可导致神经毒性(手指、足趾麻木、腱反射消失)的抗肿瘤药是

A: 柔红霉素

B: 长春新碱

C: 紫杉醇

D: 博来霉素

答案：B

12.周某，男，31岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

A: 选择适宜的病期、疗程和监测

B: 尽量选择三价铁

C: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离

D: 注意预防铁负荷过重

答案：B

13.口服索他洛尔作为抗心律失常药，其疗效和不良反应发生率均呈剂量依赖性，具有最佳获益风险比的用法是一天两次，一次

A: 120mg

B: 160mg

C: 80mg

D: 40mg

答案：A

14.可降低极低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油，主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是

A: 瑞舒伐他汀

B: 阿昔莫司

C: 依折麦布

D: 利血平

答案：B

15.糖皮质激素的适应证，不包括

A: 风湿性关节炎

B: 再生障碍性贫血

C：系统性红斑狼疮

D：活动性肺结核

答案：D

16.（2017年真题）应用维生素B12治疗巨幼红细胞性贫血48小时内，应监测的电解质是（）

A：钠

B：钙

C：锂

D：钾

答案：D

17.对红霉素的描述，下列不正确的是

A：具有肝脏毒性

B：抗菌谱与青霉素相似但略广

C：属繁殖期杀菌剂

D：对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效

答案：C

18.ACEI与其联用，除可增强降压效果外，还可减少后者引起的高肾素血症以及对血尿酸和血糖的不良影响的是()

A：人促红素

B：噻嗪类利尿药

C：β受体阻断药

D：留钾利尿药

答案：B

19.呋塞米的利尿作用机制主要是

A: 特异性阻滞Na+通道

B: 抑制Na+-H+交换

C: 抑制碳酸酐酶

D: 抑制Na+-K+-2Cl-同向转运子

答案：D

20.以上属于成瘾产妇的新生儿戒断症状的是

A: 哈欠、打喷嚏、流涕、出汗

B: 胃痉挛、心动过速、极度疲乏

C: 神经过敏、失眠、恶心、呕吐

D: 惊厥、震颤、反射加速、发热

答案：D

21.格列本脲的作用特点是

A: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性

B: 刺激胰岛细胞分泌胰岛素，增加体内的胰岛素水平

C: 抑制胰高血糖素的分泌

D: 增强胰岛素的作用

答案：B

22.（2016年真题）华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是

A: 维生素B12

B: 维生素B2

C: 维生素B1

D: 依诺肝素

答案：D

23.抗血栓形成、保护动脉内皮的调血脂药是

A：藻酸双酯钠

B：阿伐他汀

C：普伐他汀

D：氟伐他汀

答案：A

24.可用于烧伤及伤后感染的是()

A：磺胺米隆

B：磺胺甲噁唑

C：磺胺嘧啶

D：柳氮磺吡啶

答案：C

25.丙硫氧嘧啶起效慢的主要原因是

A：待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效

B：口服后吸收不完全

C：肾脏排泄速度快

D：肝内代谢转化快

答案：A

26.属于二氢叶酸还原酶抑制剂的抗肿瘤药是

A：甲氨蝶呤

B：卡莫氟

C：羟喜树碱

D：来曲唑

答案：A

27.患者，男，24岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素

A: 心肝肾功能严重障碍者

B: 骨髓功能抑制者

C: 慢性胃炎

D: 妊娠期妇女

答案：C

28.仅对浅表真菌感染有效的药物()

A: 氟康唑

B: 灰黄霉素

C: 两性霉素B

D: 伊曲康唑

答案：B

29.甲氧苄啶的抗菌机制是

A: 抑制二氢蝶酸合成酶

B: 抑制DNA螺旋酶

C: 抑制二氢叶酸还原酶

D: 破坏细菌细胞壁

答案：C

30.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

A: 选择长期口服给药

B: 选择注射与口服并用

C: 选择短期口服给药

D: 选择注射给药

答案：C

31.育龄女性在无防护的性生活或避孕失败72小时内,宜使用的口服紧急避孕药物是（）

A: 左炔诺孕酮（1

B: 十一酸睾酮（40mg）

C: 炔雌醇去氧孕烯（30g/150g）

D: 复方醋酸环丙孕酮（35μg/2mg）

答案：A

32.主要用于疟疾预防的药物是

A: 乙胺嘧啶

B: 氯喹

C: 甲硝唑

D: 吡喹酮

答案：A

33.顺铂所致的肾损害会延缓药物的排泄而导致肾毒性增加，该药物是

A: 甲氨蝶呤

B: 丙磺舒

C: 苯海拉明

D: 呋塞米

答案：A

34.糖尿病酮症酸中毒患者选用()

A: 胰岛素

B: 丙硫氧嘧啶

C：格列本脲

D：二甲双胍

答案：A

35.硝酸酯类药物扩张血管是通过

A：促进前列环素的生成

B：阻滞Ca2+通道

C：产生一氧化氮，使细胞内环磷酸鸟苷升高

D：直接作用于血管平滑肌

答案：C

36.关于地西泮的作用特点，叙述错误的是

A：小于镇静剂量时即有抗焦虑作用

B：有良好的抗癫痫作用

C：可增强其他中枢抑制药的作用

D：剂量加大可引起麻醉

答案：D

37.属于III类抗心律失常药

A：普萘洛尔

B：利多卡因

C：奎尼丁

D：胺碘酮

答案：D

38.关于中枢性镇咳药的使用，叙述错误的是

A：特别适用于无痰、干咳患者

B: 中枢性镇咳药属于对症治疗药物，用药7日如症状未缓解，宜停药就诊

C: 高龄患者、肝功能不全患者、肾功能不全患者宜从小剂量开始

D: 痰多黏稠患者亦可使用该类药物单药治疗

答案：D

39.属于润滑性泻药的是

A: 欧车前

B: 多库酯钠

C: 利那洛肽

D: 番泻叶

答案：B

40.以下关于去羟肌苷使用的叙述，错误的是

A: 用药过量无已知的解毒药，但可以通过腹膜透析排出

B: 酮康唑和伊曲康唑需至少在服用本品前两小时服用

C: 同时服用含镁和铝的抗酸药物会加重不良反应

D: 注意外周神经病变，待神经中毒症状消退后患者仍能耐受减量的本品治疗

答案：A

41.强心苷对以下哪种心功能不全疗效最好

A: 高度二尖瓣狭窄引起的心功能不全

B: 伴有心房扑动、颤动的心功能不全

C: 严重贫血引起的心功能不全

D: 甲状腺功能亢进引起的心功能不全

答案：B

42.用药期间可引起眼泪、尿、粪、痰等呈橘红色的药物是

A：乙胺丁醇

B：异烟肼

C：利福平

D：链霉素

答案：C

43.厌氧菌引起的肺炎宜选用()

A：万古霉素

B：克林霉素

C：氟康唑

D：阿奇霉素

答案：B

44.（2019年真题）患者，男，8岁，静脉滴注美洛西林后立即出现胸闷、气短、呼吸困难，喉头水肿，考虑为青霉素类抗生素的过敏反应，按照其发生机制，该患者发生的过敏反应，在分型上属于（）

A：Ⅳ型变态反应

B：Ⅰ型变态反应

C：Ⅲ型变态反应

D：Ⅱ型变态反应

答案：B

45.患者，女，56岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食，增强运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片治疗。

A：BUN

B：Hcy

C：CK

D：Cr

答案：C

46.抗菌谱广，对厌氧菌也有强大抗菌活性，对 β-内酰胺酶高度稳定的药物是()

A：美罗培南

B：氨曲南

C：他唑巴坦

D：克拉维酸

答案：A

47.甲氧苄啶与磺胺甲噁唑合用的原因是

A：抗菌谱不相似

B：双重阻断敏感菌的叶酸代谢

C：促进分布

D：促进吸收

答案：B

48.能治疗强心苷中毒引起的异位心律的是

A：利血平

B：苯妥英钠

C：哌替啶

D：阿托品

答案：B

49.对非磺酰脲类胰岛素促泌剂的描述正确的是

A：此类药物需在餐前即刻服用

B: 格列美脲属于本类药物

C: 此类药物可降低2型糖尿病者的餐前血糖

D: 此类药物不能单独服用

答案：A

50.下列属于长效和强效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂的药物是

A: 黄体酮

B: 奥利司他

C: 米非司酮

D: 环孢素

答案：B

51.可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

A: 维生素C

B: 他莫昔芬

C: 氯丙嗪

D: 红霉素

答案：B

52.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

A: 促进血栓形成

B: 肾结石

C: 胃肠道反应

D: 尿道刺激

答案：D

53.下列不属于肽类抗生素的是

A：万古霉素

B：多黏菌素B

C：去甲万古霉素

D：利奈唑胺

答案：D

54.对其他药物不能控制的顽固性癫痫仍有效的是

A：卡马西平

B：苯妥英钠

C：丙戊酸钠

D：乙琥胺

答案：C

55.硫脲类药物的基本作用是

A：抑制甲状腺蛋白水解酶

B：抑制Na+-K+泵

C：抑制甲状腺素的生物合成

D：抑制碘泵

答案：C

56.（2018年真题）属于贝丁酸类的调节血脂药是（）

A：依折麦布

B：烟酸

C：非诺贝特

D：辛伐他汀

答案：C

57.（2015年真题）可抑制骨髓造血功能，或引起“灰婴综合征”，新生儿禁用的抗菌药物是（）。

A: 酰胺醇类（氯霉素）

B: 四环素类

C: 林可霉素类

D: 氨基糖苷类

答案：A

58.对阿司匹林过敏或不耐受的患者可选用

A: 替格雷洛

B: 噻氯匹定

C: 氯吡格雷

D: 替罗非班

答案：C

59.使用多塞平治疗无效时可换用的抗抑郁药是

A: 丙米嗪

B: 氯米帕明

C: 阿米替林

D: 吗氯贝胺

答案：D

60.作用于DNA拓扑异构酶Ⅱ的抗肿瘤药物是

A: 顺铂

B: 依托泊苷

C: 来曲唑

D: 紫杉醇

答案：B

61.对 α 和 β 受体均有阻断作用的药物是

A: 普萘洛尔

B: 酚妥拉明

C: 拉贝洛尔

D: 去甲肾上腺素

答案：C

62.属于靶向抗肿瘤药物的是

A: 吉非替尼

B: 紫杉醇

C: 昂丹司琼

D: 多柔比星

答案：A

63.患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。

A: 可作为术后预防呕吐的常规用药

B: 对泌乳素的分泌无影响

C: 无心脏不良反应

D: 对化疗所致的呕吐有效

答案：B

64.阿糖胞苷、吉西他滨属于()

A: 二氢叶酸还原酶抑制剂

B：胸腺核苷合成酶抑制剂

C：DNA多聚酶抑制剂

D：核苷酸还原酶抑制剂

答案：C

65.可抑制粒细胞浸润和白细胞趋化,用痛风急性发作的药物是()

A：苯溴马隆

B：秋水仙碱

C：非布索坦

D：别嘌醇

答案：B

66.（2018年真题）可抑制粒细胞浸润和白细胞趋化,用于痛风急性发作的药物是（）

A：秋水仙碱

B：苯溴马隆

C：非布索坦

D：别嘌醇

答案：A

67.目前治疗哮喘夜间发作和哮喘维持治疗的理想方案是：糖皮质激素联合应用

A：沙丁胺醇

B：沙美特罗

C：氨茶碱

D：特布他林

答案：B

68.患儿，男，7岁。长期偏食。近1个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下4cm，脾肋下1cm。血常规：Hb70g/L，RBC3.0×1012/L，Ret2.0%，WBC、P1t均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

A: 口服型铁剂服用时间还根据个体反应而定

B: 服用铁剂时可以喝果汁，但不能喝牛奶

C: 维生素C与本品同服，有利于吸收

D: 进食促进铁剂的吸收

答案：D

69.关于NSAIDS类药物所致不良反应的说法，正确的是()

A: NSAIDs类药物所致的胃肠道不良反应中，以萎缩性胃炎最为常见

B: 非选择性NSAIDS类药物可导致胃及十二指肠溃疡和出血等风险

C: 选择性COX-2抑制剂导致胃及十二指肠溃疡和出血的风险高于非选择性NSAIDS类药物

D: 非选择性NSAIDS类药物导致的心血管风险高于选择性COX-2抑制剂

答案：B

70.福莫特罗的平喘作用维持时间是

A: 10~12小时

B: 4~6小时

C: 3~5分钟

D: 10~20分钟

答案：A

71.甲氧苄啶联用环孢素使

A: 抗凝作用增强

B：肾毒性增加

C：半衰期缩短

D：白细胞减少风险增加

答案：B

72.用于黑热病病因治疗的药物是

A：三苯双脒

B：葡萄糖酸锑钠

C：氯硝柳胺

D：伯氨喹

答案：B

73.西咪替丁的禁忌证是

A：卓-艾综合征

B：应激性溃疡

C：急性胰腺炎

D：胃食管反流病

答案：C

74.以上药物镇咳作用与可待因相当且没有镇痛作用的是

A：吗啡

B：喷托维林

C：可待因

D：右美沙芬

答案：D

75.能与胰岛素竞争血浆蛋白，升高胰岛素血浆浓度的是

A：甲状腺素

B：磺胺甲唑

C：格列喹酮

D：普萘洛尔

答案：B

76.对a受体和β受体均有强大的激动作用的是

A：肾上腺素

B：去甲肾上腺素

C：多巴胺

D：可乐定

答案：A

77.（2017年真题）属于GLP-1受体激动剂的药物是（）

A：那格列奈

B：伏格列波糖

C：利拉鲁肽

D：阿格列汀

答案：C

78.扁平疣可选用

A：林旦霜

B：阿达帕林

C：维A酸

D：酮康唑

答案：C

79.长期频繁使用可致眼部真菌感染的药物是

A：四环素可的松

B：氯霉素

C：更昔洛韦

D：利巴韦林

答案：A

80.患者，女，30岁。近期出现乏力、心动过速，考虑为“甲亢”，遵医嘱服用药物后出现皮疹或皮肤瘙痒及白细胞减少的是

A：左甲状腺素

B：甲巯咪唑

C：地塞米松

D：丙硫氧嘧啶

答案：B

81.可导致坏死性结肠炎的是

A：利福平

B：β 受体阻断剂

C：阿糖胞苷

D：甲氨蝶呤

答案：C

82.大剂量应用甲氨蝶呤后，可用()进行解救

A：丙磺舒

B：亚叶酸钙

C：苯溴马隆

D：别嘌醇

答案：B

83.患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。

A: 多潘立酮

B: 甲氧氯普胺

C: 莫沙必利

D: 胰酶

答案：D

84.可以与雌激素受体结合，但不具有雌激素对生殖系统的影响，能增加雌激素的活性对骨代谢产生激动效应，产生抗骨质疏松作用的药物是

A: 雷洛昔芬

B: 降钙素

C: 骨化三醇

D: 阿仑膦酸钠

答案：A

85.在应用螺内酯后应用哪种氨基酸可出现严重并可致命的高钾血症

A: 苯丙氨酸

B: 色氨酸

C: 谷氨酸

D: 精氨酸

答案：D

86.用1%麻黄碱液滴鼻的主要目的是()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/218057142042007022