
药物临床应用与药理作用知识试卷

1. 对由冠脉痉挛所引起的心绞痛效果最佳的是 ()

- A、普萘洛尔
- B、维拉帕米
- C、硝苯地平
- D、美托洛尔
- E、尼群地平

【正确答案】：C

2. 对浅表癣菌感染和深部念珠菌感染均有效的广谱抗真菌药是 ()

- A、灰黄霉素
- B、酮康唑
- C、两性霉素 B
- D、制霉菌素
- E、氟胞嘧啶

【正确答案】：B

3. 喹诺酮类药物抗菌作用机制是 ()

- A、抑制细菌二氢叶酸合成酶
- B、抑制细菌二氢叶酸还原酶
- C、抑制细菌蛋白质合成
- D、抑制细菌 DNA 回旋酶
- E、抑制细菌转肽酶

【正确答案】：D

4. 妊娠及哺乳期妇女可选用的抗菌药是 ()

- A、磺胺类药
- B、四环素类药
- C、氯霉素
- D、青霉素 G
- E、氨基糖苷类

【正确答案】：D

5. 接受治疗的胰岛素依赖型糖尿病人突然出汗心跳加快、焦虑等可能是由于 ()

- A、过敏反应
- B、低血糖反应
- C、胰岛素急性耐受
- D、胰岛素慢性耐受
- E、变态反应

【正确答案】： B

6. 氯丙嗪的临床用途不包括 ()

- A、治疗精神病
- B、止吐
- C、人工冬眠疗法
- D、麻醉前给药
- E、抗惊厥

【正确答案】： E

7. 下面哪个局麻药的水解产物能降低磺胺药药效的 ()

- A、丁卡因
- B、普鲁卡因
- C、利多卡因
- D、布比卡因
- E、以上均不是

【正确答案】： B

8. 药物不良反应和药源性疾病的差别在于 ()

- A、病种不同
- B、药品不同
- C、剂量不同
- D、用药方式不同
- E、后果和危害程度不同

【正确答案】： E

9. 可产生成瘾性的止泻药是 ()

- A、地芬诺酯
- B、次碳酸铋
- C、药用炭
- D、蒙脱石
- E、鞣酸蛋白

【正确答案】： A

10. 吗啡的镇痛作用机制是 ()

- A、阻断中枢多巴胺受体
- B、兴奋中枢 GABA 受体
- C、阻断中枢 M 受体
- D、抑制去甲肾上腺素再摄取
- E、兴奋中枢阿片受体

【正确答案】： E

11. 去甲肾上腺素能神经递质消除主要是

- A、在多巴脱羧酶作用下被代谢
- B、被神经末梢重摄取, 重新贮存到囊泡内
- C、在酪氨酸羟化酶作用下被代谢
- D、在单胺氧化酶作用下被代谢
- E、被磷酸二酯酶灭活

【正确答案】： B

12. 某患者, 男, 55 岁, 高血脂伴有 2 型糖尿病多年, 临床禁用下列哪种药物 ()

- A、烟酸
- B、洛伐他汀
- C、考来烯胺
- D、普罗布考
- E、苯扎贝特

【正确答案】： A

13. 可引起刺激性干咳的抗高血压药是 ()

- A、氢氯噻嗪
- B、卡托普利
- C、肼屈嗪
- D、硝苯地平
- E、普萘洛尔

【正确答案】： B

14. 强心苷和利尿药合用治疗心衰注意补充 ()

- A、钾盐
- B、镁盐
- C、钙盐
- D、钠盐
- E、高渗葡萄糖

【正确答案】： A

15. 妨碍铁剂在肠道吸收的物质是 ()

- A、维生素 C
- B、果糖
- C、食物中高钙、高磷酸盐、鞣酸等
- D、稀盐酸
- E、半胱氨酸

【正确答案】： C

16. 酚妥拉明没有以下哪个作用()

- A、扩张血管
- B、心率加快
- C、抗组胺作用
- D、使胃液分泌增加
- E、兴奋胃肠平滑肌

【正确答案】： C

17. 下列哪种效应是通过阻断 β 受体实现的()

- A、骨骼肌收缩
- B、瞳孔开大肌收缩
- C、汗腺分泌
- D、睫状肌收缩
- E、心脏抑制

【正确答案】： E

18. 阿托品治疗感染性休克的主要原因是()

- A、抗菌、抗毒素作用, 消除休克的原因
- B、抗迷走神经, 兴奋心脏, 升高血压
- C、解除血管痉挛, 改善微循环, 增加重要脏器的血流量
- D、扩张支气管, 缓解呼吸困难
- E、改善肾功能, 增加尿量

【正确答案】： C

19. 药物镇痛作用与阿片受体无关的是()

- A、哌替啶
- B、纳洛酮
- C、可待因
- D、吗啡
- E、罗通定

【正确答案】： E

20. 抗结核治疗中 PAS 常与异烟肼、利福平、吡嗪酰胺或乙胺丁醇合用, 联合用药的目的是()

- A、减少异烟肼的神经毒性
- B、增强吡嗪酰胺的抗菌作用
- C、使结核杆菌对其他药物敏感

-
- D、延缓结核菌耐药性产生
E、减轻乙胺丁醇对视神经的毒害

【正确答案】：D

21. 对下列心力衰竭，地高辛疗效最佳的是（ ）

- A、心脏瓣膜病引起的心力衰竭
B、先天性心脏病引起的心力衰竭
C、伴有心房扑动、颤动的心力衰竭
D、甲状腺功能亢进引起的心力衰竭
E、肺源性心脏病引起的心力衰竭

【正确答案】：C

22. 关于卡比多巴，下列叙述错误的是（ ）

- A、卡比多巴是 α -甲基多巴肼的左旋体
B、仅能抑制外周多巴脱羧酶，减少 DA 在外周之生成
C、单用亦有较强的抗震颤麻痹作用
D、与左旋多巴(1：10)合用，可使后者有效剂量减少 75%
E、与左旋多巴合用，减少不良反应

【正确答案】：C

23. 下列不属于异烟肼的不良反应的是（ ）

- A、外周神经系统毒性
B、中枢神经系统毒性反应
C、肝毒性
D、骨髓抑制
E、过敏反应

【正确答案】：D

24. 糖皮质激素和抗生素合用治疗严重感染的目的是（ ）

- A、增强抗生素的抗菌作用
B、增强机体防御能力
C、拮抗抗生素的某些不良反应
D、增强机体应激性
E、用激素缓解症状，度过危险期，用抗生素控制感染

【正确答案】：E

25. 治疗过量阿托品中毒的药物是（ ）

- A、山莨菪碱
B、东莨菪碱
C、后马托品
D、琥珀胆碱

E、毛果芸香碱

【正确答案】：E

26. 促进胰腺释放胰岛素的药物是（ ）

- A、格列本脲
- B、二甲双胍
- C、阿卡波糖
- D、罗格列酮
- E、胰岛素

【正确答案】：A

27. 下列有关氨基糖苷类抗生素描述不正确的是（ ）

- A、对需氧 G-菌有强大抗菌作用
- B、主要分布于细胞外液中
- C、口服吸收率较低
- D、在血液中浓度为肾皮质中的 10 倍以上
- E、在体内不被代谢

【正确答案】：D

28. 以下哪项是 β 受体阻断药的用途（ ）

- A、支气管哮喘
- B、重度心力衰竭
- C、糖尿病
- D、高血压
- E、心动过缓

【正确答案】：D

29. 磺胺类的不良反应不包括（ ）

- A、泌尿系统损害
- B、血液系统反应
- C、呼吸系统反应
- D、过敏反应
- E、神经系统反应

【正确答案】：C

30. 联合应用抗菌药物的措施不正确的是（ ）

- A、病原菌未明的严重感染
- B、减少药物不良反应
- C、病毒和细菌混合感染所致的上呼吸道感染

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/218076026033007040>