

2024 吉林省《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题大全【B 卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 小剂量时有抑制血栓形成作用的是

- A: 阿司匹林
- B: 塞来昔布
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 吲哚美辛

答案：A

2. （2015 年真题）属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是（ ）。

- A: 吗氯贝胺
- B: 阿米替林
- C: 氟西汀
- D: 文拉法辛

答案：C

3. （2017 年真题）药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 5mg/kg
- B: 40mg/kg
- C: 15mg/kg
- D: 60mg/kg

答案：B

4. 患者，女，45 岁，因强直性脊柱炎住院，同时伴有胃溃疡、高血压及糖尿病，药师审核医嘱，发现应当禁用的药品是

- A: 格列齐特
- B: 双氯芬酸
- C: 雷尼替丁
- D: 硝苯地平

答案：B

5. 可引起心脏 Q-T 间期延长的药物是

- A: 头孢呋辛
- B: 左氧氟沙星
- C: 克林霉素
- D: 磺胺甲恶唑

答案：B

6. 延长动作电位时程的广谱抗心律失常药物是()

- A: 维拉帕米
- B: 奎尼丁
- C: 胺碘酮
- D: 美西律

答案：C

7. 噻嗪类利尿药发挥抗利尿作用，是因为其可以抑制

- A: 磷酸二酯酶
- B: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子
- C: 碳酸酐酶
- D: Na^+-Cl^- 共转运子

答案：A

8. 司坦唑醇不具有的适应证为()

- A: 骨质疏松症
- B: 遗传性血管神经性水肿
- C: 痤疮
- D: 慢性消耗性疾病

答案：C

9. (2018 年真题) 属于电解质补充药, 可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是 ()

- A: 双环醇
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 异甘草酸镁
- D: 门冬氨酸钾镁

答案：D

10. 糖皮质激素用于结缔组织病、肾病综合征、顽固性支气管哮喘宜选择的给药方法是

- A: 小剂量替代疗法
- B: 大剂量冲击疗法
- C: 一般剂量长期疗法
- D: 隔日一次给药法

答案：C

11. 铂类化合物治疗期间, 需要每周检查的项目是

- A: 肾功能
- B: 肝功能

C: 血钙

D: 全血计数

答案: D

12. 日晒时有光敏现象的药品是

A: 庆大霉素

B: 多西环素

C: 加替沙星

D: 头孢哌酮

答案: B

13. 红霉素的作用机制是

A: 抑制细菌蛋白质的合成的全过程

B: 与核蛋白 50s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

C: 与核蛋白 30s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

D: 与核蛋白 70s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

答案: B

14. 可调节表皮细胞有丝分裂和更新()

A: 阿达帕林

B: 维 A 酸

C: 过氧苯甲酰

D: 异维 A 酸

答案: B

15. (2019 年真题) 长期大量使用可致泌尿系统尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石的维生素是 ()

A: 维生素

B: 维生素 B6

C: 维生素 B2

D: 维生素 A

答案：A

16. (2017 年真题) 急性缺血性脑卒中发作，应用溶栓药阿替普酶治疗时间窗是在发病后 ()

A: 12 小时内

B: 3 小时内

C: 24 小时内

D: 8 小时内

答案：B

17. 下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是

A: 克罗米通具有局部麻醉作用

B: 林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵

C: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及杀虫的作用

D: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫

答案：B

18. 仅对蛔虫、蛲虫混合感染有效的是 ()

A: 甲苯咪唑

B: 哌嗪

C: 氯硝柳胺

D: 噻嘧啶

答案：B

19. (2019 年真题) 患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适宜使用的药物是 ()

- A: 氨氯地平
- B: 硝普钠
- C: 贝那普利
- D: 美托洛尔

答案：D

20. 下列哪种药物能抑制尿酸生成的是

- A: 丙磺舒
- B: 秋水仙碱
- C: 别嘌醇
- D: 呋塞米

答案：C

21. (2018 年真题) 属于贝丁酸类的调节血脂药是 ()

- A: 辛伐他汀
- B: 烟酸
- C: 非诺贝特
- D: 依折麦布

答案：C

22. 对多种氨基糖苷类钝化酶稳定的药物是

- A: 妥布霉素
- B: 链霉素
- C: 奈替米星
- D: 庆大霉素

答案：C

23. 主要用于糖尿病，特别是 1 型糖尿病的治疗的药物是()

A: A 和 B 均无效

B: 二甲双胍

C: 胰岛素

D: 磺酰脲类

答案：C

24. 有关痤疮治疗用药注意事项，描述不正确的是()

A: 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用在同一时间、同一部位有物理性配伍禁忌

B: 对林可霉素磷酸酯凝胶过敏者禁用

C: 维 A 酸的用药部位要避免强烈的日光照射，宜在晚间睡前应用

D: 过氧苯甲酰凝胶合用维 A 酸乳膏可加强疗效

答案：D

25. 主要用于复发转移乳腺癌、乳腺癌术后转移的辅助治疗和子宫内膜癌的治疗的药物是

A: 氟维司群

B: 来曲唑

C: 依西美坦

D: 他莫昔芬

答案：D

26. 半合成青霉素类中，属于广谱青霉素类的是()

A: 替莫西林

B: 羧苄西林

C: 氨苄西林

D: 甲氧西林

答案: C

27. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

A: 惊厥

B: 支气管痉挛

C: 血压下降

D: 心律失常

答案: D

28. 可引起乳房肿大的药物是()

A: 苯海拉明

B: 阿司咪唑

C: 西咪替丁

D: 组胺

答案: C

29. 服用伊马替尼的时间是

A: 餐后 2 小时

B: 餐前 1 小时

C: 睡前

D: 进餐时

答案: D

30. 下列说法中错误的是

A: 芳香氨酶抑制剂主要包括来曲唑和阿那曲唑

B: 芳香氨酶抑制剂可用于绝经前乳腺癌患者

C: ER 阳性者，绝经前、后均可使用他莫昔芬

D: 他莫昔芬是目前临床上最常用的乳腺癌内分泌治疗药

答案：B

31. 以下患者中可以使用血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)的是()

A: 孕妇

B: 高血压患者和心力衰竭患者

C: 双侧肾动脉狭窄患者

D: 高钾血症患者

答案：B

32. 与脊髓上水平的中枢镇痛、欣快感和依赖性有关的受体

A: $\mu 1$ 受体

B: δ 受体

C: K 受体

D: $\mu 2$ 受体

答案：A

33. 缓解轻、中度急性哮喘症状的首选药是

A: 特布他林

B: 丙卡特罗

C: 福莫特罗

D: 沙美特罗

答案：A

34. (2016 年真题) 组胺 H₂ 受体阻断的抑酸作用强度比较，正确的是

A: 西咪替丁>雷尼替丁>法莫替丁

B: 雷尼替丁>法莫替丁>西咪替丁

C: 法莫替丁>雷尼替丁>西咪替丁

D: 雷尼替丁>西咪替丁>法莫替丁

答案：C

35. 下述药物中不属于助消化药的是

A: 乳酸菌素

B: 乳酶生

C: 兰索拉唑

D: 胰酶

答案：C

36. 促胃肠动力药是()

A: 肾上腺素

B: 熊去氧胆酸

C: 阿托品

D: 甲氧氯普胺

答案：D

37. 抑制过敏介质释放，主要用于预防哮喘发作的药物是

A: 异丙肾上腺素

B: 特布他林

C: 色甘酸钠

D: 倍氯米松

答案：C

38. 心律失常发生的机制是

A: 心肌兴奋过度导致窦房结搏动异常

B: 心肌兴奋冲动形成异常或传导异常

C: 潜在起搏点搏动频率加快

D: 心肌兴奋过度导致异常

答案：B

39. 属于促凝血因子合成药的是

A: 酚磺乙胺

B: 甲萘氢醌

C: 氨甲环酸

D: 鱼精蛋白

答案：B

40. 下列抗结核药物中也可以用于治疗麻风病的是()

A: 利福平

B: 链霉素

C: 异烟肼

D: 吡嗪酰胺

答案：A

41. 可用于配合防治肝性脑病的泻药为

A: 硫酸镁

B: 酚酞

C: 乳果糖

D: 甘油

答案：C

42. 膦甲酸钠不能与静脉滴注喷他咪联合使用，以免发生

A: 低钙血症

B: 高钙血症

C: 高钾血症

D: 低钾血症

答案：A

43. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

A: 餐时

B: 餐后 1 小时

C: 餐前半小时

D: 餐后半小时

答案：A

44. 甲氧苄啶与磺胺合用是因为

A: 双重阻断细菌的叶酸代谢

B: 减少泌尿道损害

C: 抗菌谱相似

D: 相互对抗不良反应

答案：A

45. 大环内酯类的主要清除途径是

A: 主要经肾脏排泄

B: 主要经肝脏清除

C: 经肝、肾双途径清除

D: 主要经呼吸道排泄

答案：B

46. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用氨溴索的同时，不宜联合应用的药品是

- A: 右美沙芬
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 感冒颗粒
- D: 利巴韦林

答案：A

47. 属于促凝血因子活性药的是

- A: 甲萘氢醌
- B: 氨甲环酸
- C: 鱼精蛋白
- D: 酚磺乙胺

答案：D

48. 皮肤寄生虫感染治疗药的禁忌证，叙述错误的是()

- A: 18 岁以下儿童禁用林旦
- B: 中枢神经系统器质性病变者禁用苯甲酸苄酯
- C: 有癫痫病史患者禁用苯甲酸苄酯
- D: 妊娠及哺乳期妇女禁用林旦

答案：A

49. 常作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌作用的药物是()

- A: 美罗培南
- B: 氨曲南
- C: 他唑巴坦
- D: 克拉维酸

答案：B

50. 严重肝病患者应减量慎用、肾功能减退患者应避免使用的是

- A: 红霉素
- B: 青霉素
- C: 氟胞嘧啶
- D: 异烟肼

答案：C

51. 长期用药易发生低镁血症的药物是（）

- A: 奥美拉唑
- B: 替普瑞酮
- C: 复方碳酸钙
- D: 胶体果胶铋

答案：A

52. 患儿，男，7岁。长期偏食。近1个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下4cm，脾肋下1cm。血常规：Hb70g/L，RBC3.

$0 \times 10^{12} / L$ ，Ret2.0%，WBC、Plt均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

- A: 血清铁蛋白
- B: 网织红细胞计数
- C: 血红蛋白测定
- D: 血小板数量

答案：D

53. 熊去氧胆酸的禁忌证不包括

- A: 高血压患者

- B: 胆道完全梗阻
- C: 哺乳期妇女
- D: 严重肝功能不全者

答案：A

54. 阿卡波糖降血糖作用的机制是

- A: 拮抗胰岛高血糖素的作用
- B: 竞争性抑制 α -葡萄糖苷酶，减少碳水化合物的水解
- C: 增强胰岛素的作用
- D: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性

答案：B

55. 配制静脉输液时；应先用灭菌注射用水溶解，然后用 5%葡萄糖注射液稀释，不可用氯化钠注射液稀释的抗真菌药是()

- A: 氟康唑
- B: 卡泊芬净
- C: 两性霉素 B
- D: 伏立康唑

答案：C

56. 作用机制是抗代谢的是

- A: 枸橼酸他莫昔芬
- B: 吉非替尼
- C: 巯嘌呤
- D: 紫杉醇

答案：C

57. 属于III类抗心律失常药的是

- A: 胺碘酮
- B: 普罗帕酮
- C: 奎尼丁
- D: 利多卡因

答案：A

58.（2015 年真题）治疗单纯疱疹性角膜炎不宜选用的药品是（）。

- A: 碘苷滴眼液
- B: 四环素可的松滴眼液
- C: 更昔洛韦滴眼液
- D: 利巴韦林滴眼液

答案：B

59. 两性霉素 B 属于（）

- A: 唑类抗真菌药
- B: 丙烯胺类抗真菌药
- C: 多烯类抗真菌药
- D: 棘白菌素类抗真菌药

答案：C

60. 纳洛酮治疗的疾病或症状有

- A: 剧烈疼痛
- B: 惊厥
- C: 失眠
- D: 阿片中毒

答案：D

61. 主要不良反应为踝部关节水肿，晨轻午重的药物是

- A: 氨氯地平
- B: 卡托普利
- C: 硝酸甘油
- D: 地高辛

答案：A

62. 青霉素在体内的主要消除方式是

- A: 肝脏代谢
- B: 被血浆酶破坏
- C: 肾小管分泌排泄
- D: 肾小球滤过

答案：C

63. 被称为餐时血糖调节剂，无需餐前 0.5h 服用的是

- A: 利拉鲁肽
- B: 艾塞那肽
- C: 格列齐特
- D: 瑞格列奈

答案：D

64. 可作为气道痉挛的应急缓解药物的长效 β 受体激动剂是

- A: 沙美特罗
- B: 丙卡特罗
- C: 福莫特罗
- D: 沙丁胺醇

答案：C

65. 控制癫痫持续状态，可静脉注射

- A: 地西泮
- B: 硫喷妥钠
- C: 氯丙嗪
- D: 阿司匹林

答案：A

66. 最易引起严重二重感染的药物是()

- A: 庆大霉素
- B: 四环素
- C: 诺氟沙星
- D: 青霉素

答案：B

67. 全身性红斑狼疮宜用

- A: 氢化可的松
- B: 地塞米松
- C: 泼尼松
- D: 倍他米松

答案：C

68. 腺苷蛋氨酸作为保护肝细胞药的作用机制是

- A: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞
- B: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平
- C: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用
- D: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

答案：A

69. 作用于前列腺平滑肌，减轻膀胱出口梗阻的是()

- A: 吡达帕胺
- B: 普适泰
- C: 西地那非
- D: 坦洛新

答案：D

70. 下列关于低镁血症的描述，错误的是

- A: 长期应用胰岛素，可引起镁向细胞内转移而导致低镁血症
- B: 质子泵抑制剂可使镁的排泄减少
- C: 质子泵抑制剂可使镁的排泄增加
- D: 抗菌药物可增加镁的排泄

答案：B

71. (2019 年真题) 服用阿司匹林可增加患者消化道黏膜损伤和胃溃疡的风险，为降低此风险，应采取的措施是()

- A: 不推荐 65 岁以上老年患者使用阿司匹林进行冠心病二级预防
- B: 阿司匹林不应与其他抗血小板药物合用
- C: 使用阿司匹林前宜先根治幽门螺杆菌感染
- D: 应长期合用质子泵抑制剂

答案：C

72. 与 α_1 受体阻断药无相互作用的药物是()

- A: 地尔硫
- B: 卡马西平
- C: 西咪替丁
- D: 第三代头孢菌素

答案：D

73. 治疗侵袭性念珠菌病首选()

- A: 灰黄霉素
- B: 氟胞嘧啶
- C: 氟康唑
- D: 伏立康唑

答案：C

74. 容易引起视神经炎的抗结核药物是

- A: 链霉素
- B: 异烟肼
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

答案：C

75. 茶碱类主要用于

- A: 气管炎
- B: 肺不张
- C: 支气管哮喘
- D: 支气管扩张

答案：C

76. 滴药过频易致反跳性鼻充血，久用可致药物性鼻炎

- A: 羟甲唑啉
- B: 硼酸
- C: 过氧化氢
- D: 克罗米通

答案：A

77. 促进复极 4 相 K

A: 普萘洛尔

B: 利多卡因

C: 奎尼丁

D: 维拉帕米

答案：B

78. 不属于抗乙型肝炎病毒的药品是

A: 拉米夫定

B: 干扰素- α

C: 恩替卡韦

D: 泛昔洛韦

答案：D

79. 对 G

A: 第三代头孢菌素

B: 第四代头孢菌素

C: 第一代头孢菌素

D: 第二代头孢菌素

答案：B

80. 下列对孕激素作用的描述，哪一项是不正确的()

A: 抑制子宫平滑肌的收缩

B: 促进乳腺腺泡发育，为哺乳做准备

C: 促进女性性器官的发育成熟

D: 大剂量抑制卵巢排卵

答案：C

81. 铂类化合物

A: 环磷酰胺

B: 顺铂

C: 喜树碱类

D: 丝裂霉素

答案：B

82. 与胆汁酸结合而降血脂的药物是

A: 洛伐他汀

B: 氯贝丁酯

C: 考来烯胺

D: 烟酸

答案：C

83. 下列关于肝素类药物的抗凝血作用描述正确的是

A: 仅在体外有效

B: 仅在体内有效

C: 用药 2 个月后需检测血小板计数

D: 体内、体外均有强大的抗凝作用

答案：D

84. 对抗杆菌属等厌氧菌具有抗菌活性，属于头霉素类的抗菌药物是()

。

A: 氨曲南

B: 亚胺培南

C: 头孢美唑

D: 头孢吡肟

答案：C

85. 下列关于直接凝血酶抑制剂的优势描述，错误的是

A: 不能灭活纤维蛋白结合的凝血酶

B: 可预测抗凝效果，无需监测 INR

C: 选择性高

D: 治疗剂量下不会引起血小板减少

答案：A

86. 患者，男，15 岁，因咳嗽、咳痰，发热 3 天入院，确诊为社区获得性肺炎，给予静滴青霉素钠 10 分钟后出现头昏，面色苍白，呼吸困难，血压下降等症状，对该患者首选的抢救药物是（）

A: 地塞米松

B: 肾上腺素

C: 多巴胺

D: 去甲肾上腺素

答案：B

87. 壬二酸的作用特点不包括

A: 局部使用能显著减少滤泡内丙酸杆菌的生长

B: 对厌氧菌无抑制和杀灭作用

C: 可竞争性抑制产生二氢睾酮的酶过程

D: 可直接抑制皮肤表面的细菌

答案：B

88. 引起妇女面部和躯体的多毛症，男性若长期应用，可表现为男子女性乳房的是（）

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/218113066047007022>