

2024 河北省邯郸市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题附参考答案（预热题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，30 岁，情感低落、反应迟钝半年余，晨重夜轻，临床诊断为抑郁症。

- A: 2 周
- B: 3 周
- C: 4 周
- D: 1 周

答案：A

2. 美国心脏病学院与美国心脏协会 2014 年颁布成人降胆固醇治疗降低动脉粥样硬化性心血管疾病风险指南，强调他汀类药物在降低急性冠脉综合征风险方面的获益表明

- A: 列为行政决策的依据
- B: 有利诊断特殊疾患
- C: 改变降脂治疗观念
- D: 有助个体化给药

答案：C

3. 由药师审核监测

- A: 护士执行医嘱差错
- B: 患者执行医嘱差错
- C: 药师调配处方差错

D: 医师处方差错

答案: D

4. 患者，男，48 岁。十二指肠溃疡病史 2 年，近感头痛、眩晕而就诊。查体：血压 160/100mmHg。经一段时间观察及定期检查后，医师诊断为高血压病。

A: 利血平

B: 氢氯噻嗪

C: 可乐定

D: 胍屈嗪

答案: A

5. 复方铝酸铋

A: 宜清晨服用

B: 宜餐后服用

C: 宜餐前服用

D: 宜睡前服用

答案: C

6. 患儿，男，50 天，体重 5kg，时值夏季，体温 37.9℃，出现烦躁，哭闹不安，无其他症状。其家人到药店询购买退热药，药师应推荐（）

A: 阿司匹林泡腾片（500mg）1/10 片，溶于少量温开水服用

B: 减少衣被，可物理降温或必要时就诊

C: 对乙酰基酚片（500mg）1/10 片，溶于少量温开水服用

D: 阿苯片，半片，研碎后溶于少量温开水服务

答案: B

7. 抗肿瘤药物中，影响核酸合成的药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 顺铂
- C: 依托泊苷
- D: 放线菌素

答案：A

8. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg。1 天前开始发热，体温 39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，每间隔 2~3 小时排 1 次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次 / 分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9 / L$ ，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用
- B: 腹泻可致电解质丢失，故需特别注意补充
- C: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用
- D: 首选口服补液，必要时静脉补液

答案：C

9. 可引起嗜睡的是

- A: 抗过敏药
- B: 右美沙芬
- C: 阿米洛利
- D: 东莨菪碱

答案：A

10. 紫外线加速一些药品的氧化、分解，归属于

- A: 空气
- B: 湿度

C: 日光

D: 温度

答案: C

11. 治疗艾滋病的非核苷类逆转录酶抑制剂是 ()

A: 阿昔洛韦

B: 利巴韦林

C: 拉米夫定

D: 依非韦伦

答案: D

12. 抗癫痫药应从小剂量起始给药，滴定增量，长期规律用药。成年癫痫患者药物治疗时

A: 丙戊酸钠

B: 卡马西平

C: 苯妥英钠

D: 拉莫三嗪

答案: D

13. 发热的程度按体温状况分级。"低热"者的体温是

A: 37℃ 以上

B: 41℃ 以上

C: 38.1℃ ~ 39℃

D: 37.4℃ ~ 38℃

答案: D

14. 属于选择性 GABAA 复合受体拮抗剂

A: 艾司唑仑

- B: 米氮平
- C: 唑吡坦
- D: 阿戈美拉汀

答案: C

15. 患者，男，48 岁，近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状，就诊后测定血压 160 / 100mmHg。

- A: 刺激性干咳
- B: 二重感染
- C: 水电解质失衡
- D: 心律失常

答案: A

16. 患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用 4 小时后，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，排除其他疾病的可能。该病例用药与不良反应的因果关系评价结果是

- A: 可能
- B: 肯定
- C: 很可能
- D: 可能无关

答案: C

17. 最容易受湿度影响而变质的药品是

- A: 滴眼剂
- B: 水溶性基质栓
- C: 胰岛素制剂
- D: 肝素等生物制品

答案: B

18. 李女士，40 多岁，来药店咨询皮肤瘙痒用药。经询问和查看后得知：李女士手心皮肤干燥、脱皮，没有破裂，没有水疱和渗出（无感染征象），瘙痒严重，尤其是夜间。自述症状在逐渐加重，之前有过类似症状，但都很轻微。进一步询问得知，她最近开始在餐厅厨房工作，每天需要清洗大量碗筷。

- A: 唑吡坦
- B: 地西泮
- C: 文拉法辛
- D: 氯苯那敏

答案：D

19. 患者，女，30 岁，因感冒所致发热（体温 38.5℃）并伴有头痛、全身酸痛到药店购药，药师应推存的药品是（）

- A: 对乙酰氨基酚片
- B: 氯苯那敏片
- C: 酚麻美敏片
- D: 萘甲唑啉滴鼻液

答案：A

20. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强
- B: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病
- C: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停
- D: 慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至 2~4.5h

答案：B

21. 属于胆酸螯合剂的调节血脂药是

- A: 依折麦布
- B: 考来替泊
- C: 阿昔莫司
- D: 氯贝丁酯

答案：B

22. 需要在凉暗处贮存的药品是

- A: 阿卡波糖片
- B: 头孢曲松钠
- C: 复方甘草合剂
- D: 硝酸甘油

答案：C

23. 患者，女，20 岁，长期服用对乙酰氨基酚缓解痛经，为降低药物的肝毒性，可联合使用

- A: 亚甲蓝
- B: N-乙酰半胱氨酸
- C: 青霉胺
- D: 纳洛酮

答案：B

24. 保钾利尿剂

- A: 依普利酮
- B: 阿利吉仑
- C: 阿米洛利

D: 雷米普利

答案：C

25. (2018 年真题) 可引起嗜酸性粒细胞增多的药物是 ()

A: 氯苯那敏

B: 碳酸氢钠

C: 坎地沙坦

D: 头孢氨苄

答案：D

26. 滥用抗菌药物、糖皮质激素、人血白蛋白、二磷酸果糖及肿瘤辅助治疗药物

A: 超适应证用药

B: 无适应证用药

C: 过度治疗用药

D: 有禁忌证用药

答案：C

27. 孕妇服用过量可诱发新生儿产生坏血病的药品是

A: 维生素 C 片

B: 维生素 AD 复方制剂

C: 维生素 A 片

D: 复合维生素 B 片

答案：A

28. 老年性骨质疏松的"三联药物"治疗

A: 长期口服维生素 D

B: 钙制剂+维生素 D+双膦酸盐

C: 单独用双膦酸盐

D: 用甲状旁腺激素

答案: B

29. (2018 年真题) 患者, 女, 68 岁, 体重 45kg, 因发热、咳嗽咳痰入院治疗, 临床诊断为社区获得性肺炎。化验结果: 白细胞计数

$11.76 \times 10^9/L$, 肌酐清除率 18ml/min 。该患者使用下列抗菌药物治疗时不需要减量的是 ()

A: 莫西沙星

B: 头孢噻肟钠

C: 阿莫西林

D: 左氧氟沙星

答案: A

30. 对服用抗蠕虫药后出现腹痛或口吐蛔虫的严重感染患者, 应加服

A: 甲苯咪唑

B: 伊维菌素

C: 噻嘧啶

D: 枸橼酸哌嗪

答案: C

31. 可卡因属于

A: 精神刺激剂

B: 利尿剂

C: β 受体阻断剂

D: 麻醉药品

答案: A

32. 患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 右美沙芬
- C: 氯苯那敏
- D: 伪麻黄碱

答案：A

33. 慢性阻塞性肺病急性加重期伴脓痰者宜选用的治疗方案是()

- A: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂
- B: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素
- C: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素
- D: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药

答案：B

34. po. 表示

- A: 每日
- B: 双眼
- C: 饭后
- D: 口服

答案：D

35. 患者平日佩戴隐形眼镜，使用抗结核药后，导致患者隐形眼镜染色的药物是()

- A: 利福平
- B: 乙胺丁醇

C: 异烟肼

D: 吡嗪酰胺

答案: A

36. 服药时进食高脂肪食物可促进药物吸收的是

A: 维生素 A

B: 硫酸亚铁

C: 格列本脲

D: 西咪替丁

答案: A

37. 白天咳嗽宜选用的药品是

A: 羧甲司坦

B: 苯丙哌林

C: 右美沙芬

D: 可待因

答案: B

38. 口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

A: 妥布霉素

B: 庆大霉素

C: 新霉素

D: 异烟肼

答案: B

39. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

- A: 双嘧达莫片
- B: 氯吡格雷片
- C: 华法林片
- D: 对乙酰氨基酚片

答案：B

40. 关于现代药学的发展,临床药学阶段的特征是

- A: 以药品工业化生产为中心
- B: 药师的工作局限于药品调配、供应等基础工作
- C: 以促进合理用药为主
- D: 以新药研制为中心

答案：C

41. 视疲劳所呈现的显著的临床特征是

- A: 泪液减少
- B: 复视
- C: 眼睑沉重、痉挛
- D: 视物时症状加重

答案：D

42. 患者术后，给予肠外营养液 10%GS500ml、50%GS250ml、20%脂肪乳 250ml、8.5%复方氨基酸 750ml、水溶性维生素 10ml、脂溶性维生素 10ml、微量元素 10ml、10%氯化钠注射液 40ml、10%氯化钾注射液 30ml

- A: 450kcal
- B: 700kcal
- C: 1150kcal
- D: 200kcal

答案：B

43. 红霉素

- A: 与氯霉素合用因竞争药物的结合位点而产生拮抗作用
- B: 与呋塞米合用可加重肾功能损害
- C: 与丙戊酸钠合用可导致血药浓度过低而引发癫痫
- D: 与多种药物存在配伍禁忌，一般应单独给药

答案：A

44. 肾上腺皮质激素可能引起

- A: 尿胆红素
- B: 尿蛋白
- C: 尿液隐血
- D: 尿葡萄糖

答案：D

45. 治疗口腔溃疡时，贴敷于溃疡处，每处 1 片，一日不得超过 3 片的药物是()

- A: 冰硼咽喉散
- B: 甲硝唑口腔粘贴片
- C: 地塞米松粘贴片
- D: 西地碘含片

答案：C

46. 可用于有机磷农药重度中毒，缓慢静脉注射 1~1.2g, 30 分钟后如不显效，可重复给药，好转后逐渐停药的药物是

- A: 维生素 K1
- B: 乙酰胺

C: 碘解磷定

D: 亚硝酸钠

答案: C

47. 患者，女，61 岁，有痛风病史。间歇期服用别嘌醇、丙磺舒治疗时，又出现一次急性发作，此时应采取的治疗方法是

A: 减少别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱

B: 停用别嘌醇、丙磺舒，改用秋水仙碱

C: 加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服对乙酰氨基酚

D: 加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱

答案: A

48. 关于透析患者使用磷结合剂的下列叙述错误的是

A: 透析患者服用钙剂的量大时易出现高钙血症

B: 高磷血症会导致心脏、血管的钙化

C: 透析患者服用钙剂必须在进食的同时服用

D: 透析患者服用磷结合剂的钙剂目的是为了补钙

答案: D

49. 中毒时可采用催吐处理方法的患者

A: 昏迷状态病人

B: 孕妇患者

C: 患有严重心脏病的患者

D: 中毒引起抽搐，惊厥被控制之后的清醒病人

答案: D

50. 在中国，具有"规范处方行为和指导合理用药的法规性和专业性文件"属性的药物专著是

- A: 中国国家处方集
- B: 国家基本药物处方集
- C: 新编药物学
- D: 中国药学文摘

答案：A

51. 下列属于二级文献的是

- A: 《中国药学杂志》
- B: 《化学名词》
- C: 《中国药学文摘》
- D: 《中国药学年鉴》

答案：C

52. 患者，女，62 岁，医师处方如下：患者：××X，性别：女，年龄：62 岁。临床诊断：2 型糖尿病高血压 2 级高脂血症 PCI 术后。

- A: 阿卡波糖
- B: 氨氯地平
- C: 二甲双胍
- D: 氯吡格雷

答案：B

53. 患者女，56 岁，既往有高血压、高脂血症病史，长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周，伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛，服用布洛芬，疼痛未缓解，自行加用萘普生。胃镜检查显示：胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡，幽门螺杆菌（Hp）阳性。肾功能未见异常

- A: 阿莫西林、克拉霉素
- B: 枸橼酸铋钾、左氧氟沙星

C: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）、枸橼酸铋钾

D: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）、克拉霉素

答案：C

54. 以下所列项目中，不属于评价二级文献的标准的是

A: 提供的信息内容是否有参考文献的支持

B: 索引的完备程度

C: 出版或更新的频率

D: 检索路径多少及费用

答案：A

55. 服药后饮水可能会引起水潴留的药物是

A: 抗利尿药

B: 抗尿结石药

C: 利胆药

D: 苦味健胃药

答案：A

56. 患者，男，58 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 停用二甲双胍肠溶片

B: 停用阿托伐他汀钙片

C: 停用瑞格列奈片

D: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

答案：A

57. 应在睡前服用，疗效较好的是

A: 维生素 B1

B: 沙丁醇胺

C: 硫酸镁

D: 噻氯匹定

答案：B

58. 对一般药品而言，安全贮存的环境可以是

A: 室温 (20~30℃)

B: 室温 20℃

C: 室温 25℃

D: 室温 (10~30℃)

答案：D

59. 《中国药典》规定可在室温干燥并于避光处保存的药品是

A: 金双歧（双歧杆菌-乳杆菌三联活菌）

B: 聚克（复方乳酸菌）

C: 培菲康（双歧杆菌三联活菌）

D: 美常安（枯草杆菌二联活菌）

答案：D

60. 用于治疗痴呆的胆碱酯酶抑制剂不包括

A: 美金刚

B: 加兰他敏

C: 卡巴拉汀

D: 多奈哌齐

答案：A

61. 张先生，30 岁，来药店咨询湿疹治疗药物。经询问后得知：他有多年的湿疹病史，经常购买氢化可的松软膏治疗湿疹。这次湿疹加重，足踝、小腿部、双手都有皮损分布，手部皮肤破裂并有渗出。药师应给予的正确建议是

- A: 建议口服氢化泼尼松
- B: 建议改用强效外用糖皮质激素哈西奈德
- C: 建议患者就医
- D: 建议使用炉甘石洗剂

答案：C

62. 下列为二级信息源的药学文献

- A: 中国国家处方集
- B: 药学杂志
- C: 药物信息手册
- D: 中国药学文摘

答案：D

63. 具有留钾作用的利尿药是

- A: 乙酰唑胺
- B: 阿米洛利
- C: 坦洛新
- D: 非那雄胺

答案：B

64. 长期应用需要监测患者的凝血功能和出血风险，必要时应联合维生素 K、维生素 B 治疗的药物是

- A: 肝素钠注射剂
- B: 口服避孕药

C: 头孢哌酮-舒巴坦注射剂

D: 阿司匹林肠溶片

答案：C

65. (2016 年真题) 患者，女，1 岁 6 个月，因感冒发热到医院就诊，医生处方对乙酰氨基酚滴剂，药师误发成对乙酰氨基酚片，患者家属拿到药品后不知如何使用，故询问药师，此时药师发现发错了药。针对该类型差错，有效的防范措施是 ()。

A: 双人核对

B: 使用药片通用名

C: 采用电子处方系统

D: 采用两种方式核对患者身份

答案：A

66. 因耐药率高而很少单独使用的肺炎治疗药物是

A: 青霉素

B: 左氧氟沙星

C: 克拉霉素

D: 亚胺培南

答案：C

67. 铅中毒

A: 药用炭混悬液

B: 1%氯化钠溶液

C: 1%硫酸镁溶液

D: 5%碳酸氢钠溶液

答案：C

68. 患者，男，70 岁，2 周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 氯吡格雷
- C: 肝素
- D: 利伐沙班

答案：A

69. 严重肝功能减退者服用经肝、肾两种途径清除的药物时

- A: 必须减量应用
- B: 一般无需调整剂量
- C: 避免使用
- D: 须谨慎使用，必要时减量给药

答案：A

70. （2017 年真题）缺铁性贫血患者常表现为（）

- A: 血红蛋白减少
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 红细胞增多

答案：A

71. 能诱发真菌或病毒感染、延缓创伤愈合、升高眼压和导致晶状体浑浊等风险，因此不应随意使用，除非患者是在眼病专科医师的密切监护下使用的结膜炎治疗药物是

- A: 酞丁安滴眼液
- B: 利福平滴眼液

C: 碘苷滴眼液

D: 醋酸氢化可的松滴眼液

答案：D

72. 婴幼儿腹泻,服用地衣芽孢杆菌活菌制剂,正确的使用方法是()

A: 用温水调服

B: 舌下含服

C: 应同时碱化尿液

D: 清晨服用

答案：A

73. 患者,女,5岁,体重25kg。两天前受凉后发热,最高体温38.9℃,并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚,应避免重复用药

B: 酚麻美敏口服液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分,应避免重复用药

C: 酚麻美敏口服液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚,应避免重复用药

D: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏,应避免重复用药

答案：B

74. 对严重药品滥用和用药失误的处方,处置的方式是

A: 经改正并签字确认后,方可调配

B: 拒绝调配

C: 准予调配

D: 应拒绝调配，并按有关规定报告

答案：D

75. 溃疡性结肠炎患者应限制摄入的食品是

A: 流质饮食

B: 低渣食品

C: 维生素类食品

D: 乳制品

答案：D

76. 药物不良反应多潘立酮（）

A: 黑便

B: 睡眠障碍

C: 性功能障碍

D: 溢乳现象

答案：D

77. 患者，男，65 岁，诊断为持续性心房纤颤，医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症，目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况，药师提出的合理化药物治疗建议，不包括（）

A: 胺碘酮能增加华法林的抗凝活性，在逐渐降低胺碘酮剂量的时候，注意随时根据 INR 值调整华法林的剂量

B: 患者在复律成功后，尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗

C: 因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用，建议换成氨氯地平或 CCB 降压药

D: 胺碘酮可以显著抑制 CYP2D6, 减慢美托洛尔的代谢, 应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量

答案: C

78. 静滴、静注不良反应发生率较高

A: 药物制剂因素

B: 生理因素

C: 生活和饮食习惯

D: 药物的使用

答案: D

79. 是目前治疗 ED 的首选疗法的药物为

A: AR

B: 克罗米芬

C: RAAS 拮抗剂

D: PDE-5 抑制剂

答案: D

80. 服后不宜立刻饮水, 以免冲淡药物

A: 包衣片

B: 胶囊剂

C: 糖浆剂

D: 粉剂

答案: C

81. (2016 年真题) 治疗过敏性结膜炎可选用的药物是 ()。

A: 色甘酸钠滴眼液

B: 氧氟沙星滴眼液

C: 酞丁安滴眼液

D: 羟甲基纤维素钠滴眼液

答案：A

82. 氟马西尼用于解救的是（）

A: 汞中毒

B: 氰化物中毒

C: 三唑仑中毒

D: 有机磷中毒

答案：C

83. 可出现锥体外系反应的是

A: 甲氧氯普胺

B: 苯二氮

C: 双嘧达莫

D: 哌替啶

答案：A

84. 依据药物临床评价的对象和内容判断，对目标适应证患者的治疗作用的初步评价是指

A: III期临床试验

B: I 期临床试验

C: II 期临床试验

D: IV期临床试验

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/218114112042007022>