







SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

医学测试试题及答案

1、下列药物属于镇痛三阶梯原则中的弱阿片类药物的是 ()

- A、芬太尼
- B、可待因
- C、高乌甲素
- D、哌朵美辛

答案: B

2、原发性骨肿瘤中最多见的是 ()

- A、骨软骨瘤
- B、骨巨细胞瘤
- C、尤文肉瘤
- D、骨肉瘤
- E、骨纤维细胞瘤

答案: D

3、胰腺的解剖位置是 ()

- A、位于腹膜后, 相当于第 3~4 腰椎水平
- B、位于腹膜后, 相当于第 1~2 腰椎水平
- C、位于小网膜囊内, 相当于第 1 腰椎水平
- D、位于十二指肠横部的上方, 平第 3 腰椎水平
- E、位于胃后方, 后腹膜前方, 相当于第 2 腰椎水平

答案: B

4、男性, 20 岁, 因火焰烧伤面、颈、双上臂、前躯干, 伤后出现红斑, 轻度肿胀, 痛觉明显, 请问该患者属于几度烧伤 ()

- A、I 度烧伤
- B、浅 II 度烧伤
- C、深 II 度烧伤
- D、III 度烧伤
- E、以上都不是

答案: A

5、某男跌倒时会阴部撞击于硬物上, 欲尿不能, 不久出现阴茎阴囊和下腹壁肿胀, 其原因为 ()

- A、血肿
- B、水肿
- C、尿外渗
- D、腹水漏出

答案: C

6、重症颅脑损伤患者如果没有休克, 应取的卧位是 ()

- A、去枕仰卧
- B、斜坡卧位
- C、平卧
- D、仰卧
- E、头低脚高位

答案: B

7、伤员医疗后送请求 9 项中, 哪 5 项最为重要 ()

- A、伤员的位置、通信方式、伤员的国籍、需要的特殊装备、伤员数量和类型
- B、伤员的位置、通信方式、伤员的分类、需要的特殊装备、伤员所在地的安全性
- C、伤员的位置、通信方式、伤员的分类、伤员所在地的标志、伤员数量和类型
- D、伤员的位置、伤员的核化生污染情况、伤员的分类、伤员的国籍、伤员数量和类型
- E、伤员的位置、通信方式、伤员的分类、需要的特殊装备、伤员数量和类型

答案: E

8、伤口包扎的目的不包括哪项 ()

- A、止血
- B、止痛
- C、固定夹板
- D、避免再次污染
- E、固定敷料

答案: C

9、和窒息、大出血、重要脏器严重损伤和以下哪种伤情是伤员早期死亡的主要原因, 各级救治机构必须优先抢救这些伤员 ()

- A、骨折
- B、休克
- C、皮肤擦伤
- D、脑震荡

答案: B

10、下列哪种表现可反映外周微循环的灌流状态并为诊断休克的主要依据之一()

- A、皮肤颜色和肢体末梢温度
- B、皮肤冷汗
- C、意识状态
- D、口渴

答案: A

11、胎盘组织包括()

- A、滑泽绒毛膜+真蜕膜+底蜕膜
- B、叶状绒毛膜+包蜕膜+真蜕膜
- C、滑泽绒毛膜+包蜕膜+羊膜
- D、羊膜+叶状绒毛膜+底蜕膜
- E、包蜕膜+真蜕膜+底蜕膜

答案: D

12、对蛛网膜下腔出血病因诊断最具意义的检查是()

- A、CT
- B、MRI
- C、DSA
- D、脑脊液检查
- E、TCD

答案: C

13、患儿男, 2 岁半。PPD 试验硬结直径 13mm, 未接种过卡介苗, 考虑可能是()

- A、免疫低下
- B、活动性结核
- C、非典型结核杆菌感染
- D、原发综合征
- E、既往感染

答案: B

14、有关颌面部软组织火器伤后, 连营一级急救措施哪项须除外()

- A、下颌骨颏部双骨折、舌肌失去支持, 须牵舌固定
- B、口、鼻、咽伤后血肿或水肿, 引起窒息者需行环甲膜切开术
- C、口腔如有凝血块, 碎骨片或异物须及时清除
- D、舌部伤应仔细严密缝合

答案: D

15、凡疑是糖尿病患者均应作如下化验:尿糖定性、空腹血糖定量、餐后 2 小时血糖定量、糖耐量试验、糖化血红蛋白、糖化血清蛋白等,但能确诊糖尿病的化验是()

- A、餐后 2 小时血糖 $>11.1\text{mmol/L}$
- B、尿糖+
- C、空腹血糖 $>6.3\text{mmol/L}$
- D、血浆糖化血红蛋白 $>5.6\% \sim 7.6\%$
- E、糖化血清蛋白 $>1.6 \sim 2.6\text{mmol/L}$

答案: A

16、胸部创伤造成呼吸困难的原因为()

- A、血气胸所致肺萎缩
- B、分泌物所致肺不张
- C、疼痛所致胸廓活动受限
- D、以上都是

答案: D

17、常用的液体推进剂中属于高毒性的是()

- A、甲基肼
- B、偏三甲基肼
- C、混肼-50
- D、发烟硝酸
- E、四氧化二氮

答案: A

18、磷烧伤紧急救治时下列那种方法不宜采用()

- A、保持伤口敞开干燥
- B、用 1% ~2%硫酸铜处理
- C、0.5~1%硝酸银处理
- D、1%碳酸氢钠处理
- E、大量清水冲洗

答案: A

19、规范化治疗控制疼痛的标准是:数字评估法的疼痛强度小于 或达到()分;24 小时内突发性疼痛次数小于()次。()

- A、 2, 2
- B、 3, 3
- C、 2, 3
- D、 3, 2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/218137004014006070>