

安徽省花山区整理《执业药师之西药学专业二》资格考试内部题库及参考答案（最新）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2016 年真题）患者，女，26 岁，妊娠 3 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是

- A: 阿莫西林
- B: 左氧氟沙星
- C: 青霉素 G
- D: 头孢氨苄

答案：B

2. 没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是（）。

- A: 可待因
- B: 右美沙芬
- C: 苯丙哌林
- D: 氯化铵

答案：C

3. 柳氮磺吡啶的活性形式是

- A: 亚磺酰胺
- B: 巴柳氮
- C: 美沙拉嗪
- D: 奥沙拉嗪

答案：C

4. 颅内压增高和颅脑损伤、支气管哮喘、肺源性心脏病代偿失调患者禁用()。

- A: 曲马多
- B: 哌替啶
- C: 芬太尼
- D: 吗啡

答案: D

5. 属于必需氨基酸，人体不能合成或合成速度不能满足人体需要的是

- A: 精氨酸
- B: 复方氨基酸注射液(18AA)
- C: 赖氨酸
- D: 复方氨基酸注射液(3AA)

答案: C

6. (2018 年真题) 属于 M 胆碱受体阻断剂的平喘药是 ()

- A: 噻托溴铵
- B: 孟鲁司特
- C: 茶碱
- D: 沙美特罗

答案: A

7. 促使脓性痰中 DNA 分解，使脓痰黏度下降的药物是

- A: 表面活性剂
- B: 乙酰半胱氨酸
- C: 糜蛋白酶
- D: 氨溴索

答案: C

8. 体内、外均有抗凝血作用的药物是

- A: 维生素 K
- B: 肝素
- C: 香豆素类
- D: 维生素 B12

答案：B

9. 常规剂量应用多潘立酮不易导致的不良反应是

- A: 锥体外系反应
- B: 男子乳房女性化
- C: 室性心律失常
- D: 女性月经不调

答案：A

10. 作用于 DNA 拓扑异构酶 I 的生物碱是

- A: 来曲唑
- B: 卡莫氟
- C: 甲氨蝶呤
- D: 喜树碱

答案：D

11. 多种抗眼部细菌感染制剂中常加入糖皮质激素，不能随意使用，应该在眼科医生、药师的密切监护下使用。如使用此类制剂，不应当超过

- A: 3 日
- B: 5 日
- C: 10 日

D: 7 日

答案: C

12. 属于短效苯二氮类的药物是

A: 三唑仑

B: 替马西泮

C: 艾司唑仑

D: 劳拉西泮地收育

答案: A

13. 艾司奥美拉唑的活性形式是

A: 美沙拉嗪

B: 亚磺酰胺

C: 奥沙拉嗪

D: 巴柳氮

答案: B

14. 糖尿病患者低血糖时，可导致患者不适甚至生命危险，也是血糖达标的主要障碍。为了预防低血糖事件的发生，应用胰岛素或促胰岛素分泌剂时，需要注意的事项不包括

A: 个体化给药，直接给予所需治疗剂量

B: 有可能误餐时应提前做好准备

C: 患者应定时定量进餐

D: 谨慎地调整剂量

答案: A

15. 可引起女性男性化、男性乳房胀痛的是

A: 十一酸睾酮

- B: 普适泰
- C: 哌唑嗪
- D: 非那雄胺

答案：A

16. 糖尿病合并轻度肾功能不全患者宜选用

- A: 珠蛋白锌胰岛素
- B: 格列喹酮
- C: 二甲双胍
- D: 正规胰岛素

答案：B

17. 整合素受体阻断剂的机制

- A: 抑制血小板表面的 ADP 受体
- B: 抑制葡萄糖脱氢酶
- C: 抑制纤维蛋白原与血小板膜表面糖蛋白受体的结合
- D: 使血小板内 cAMP 浓度增高而产生抗血小板作用

答案：C

18. 局部抗炎作用较弱的长效糖皮质激素是

- A: 泼尼松
- B: 倍他米松
- C: 氢化可的松
- D: 地塞米松

答案：D

19. 属于破坏 DNA 的铂类化合物的抗肿瘤药物是

- A: 紫杉醇

- B: 顺铂
- C: 依托泊苷
- D: 来曲唑

答案：B

20. 口服存在首关效应的药物是

- A: 氨溴索
- B: 溴己新
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 羧甲司坦

答案：C

21. 使用二磷酸果糖时需要监测血磷水平的是()

- A: 肌酐清除率低于 60%的患者
- B: 肌酐清除率低于 50%的患者
- C: 肌酐清除率低于 40%的患者
- D: 肌酐清除率低于 30%的患者

答案：B

22. 奎尼丁对心肌细胞膜的作用主要是()

- A: 促进 K
- B: 促进 Ca
- C: 抑制 Ca
- D: 抑制 Na

答案：D

23. 对耐氯喹的恶性疟虫株，首选

- A: 氯喹+伯氨喹

- B: 咯萘啶或甲氟喹
- C: 乙胺嘧啶+磺胺药
- D: 静脉滴注奎宁

答案：B

24. 作用于外周多巴胺受体，神经系统副作用罕见的是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 多潘立酮
- C: 莫沙必利
- D: 西沙必利

答案：B

25. 阿奇霉素()

- A: 用于非典型致病原感染
- B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎
- C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注
- D: 肾毒性较大

答案：A

26. 庚酸炔诺酮()

- A: 减少精子数目
- B: 抗着床
- C: 促进蛋白质合成
- D: 抑制排卵作用

答案：D

27. 2~3 分钟起效，5 分钟达最大效应的硝酸酯类药物是

- A: 硝酸甘油

B: 普萘洛尔

C: 硝苯地平

D: 哌唑嗪

答案: A

28. 对地高辛轻度中毒者可及时停药及使用

A: 利尿剂

B: 苯妥英钠

C: 氯化钾、葡萄糖注射液

D: 阿托品

答案: A

29. (2021 年真题) 用于验光配镜屈光度检查前散瞳的药物是 ()

A: 雷珠单抗注射液

B: 聚乙二醇滴眼液

C: 毛果芸香碱滴眼液

D: 硫酸阿托品眼用凝胶

答案: D

30. 患者，女，26 岁，妊娠 3 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是 ()。

A: 左氧氟沙星

B: 阿莫西林

C: 青霉素 G

D: 头孢氨苄

答案: A

31. 多库酯钠作为泻药的作用机制是

- A: 选择性、高亲和力的 5-HT₄ 受体激动剂，可通过 5-HT₄ 受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性
- B: 一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便
- C: 通过激活 CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内 cGMP 可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快
- D: 在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用

答案：B

32. 连续使用应间隔 4h 以上

- A: 麻黄碱
- B: 酚甘油滴耳液
- C: 羟甲唑啉
- D: 赛洛唑啉

答案：C

33. 属于时间依赖性且短 PAE 的大环内酯类药是

- A: 阿奇霉素
- B: 克拉霉素
- C: 红霉素
- D: 氨曲南

答案：C

34. 下述药物不属于消毒防腐药的是()

- A: 硼酸溶剂

B: 过氧化氢溶剂

C: 盐酸麻黄碱溶剂

D: 酚甘油

答案：C

35. 氟喹诺酮类

A: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

B: 禁用于早产儿、新生儿

C: 禁用于胆道阻塞患者

D: 禁用于 8 岁以下儿童

答案：A

36. 属于头孢三代的是

A: 头孢曲松

B: 拉氧头孢

C: 头孢呋辛

D: 头孢唑林

答案：A

37. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 老年人

B: 推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在 $15 \sim 20 \mu g/ml$ 并且长疗程的患者

C: 肝功能不全者

D: 肾功能不全者

答案：C

38. 单纯性下尿路感染可选择的药物是

- A: 利奈唑胺+哌替啶
- B: 磷霉素钠+万古霉素
- C: 利奈唑胺+苯丙醇胺
- D: 磷霉素氨丁三醇

答案：D

39. 不易导致便秘和腹泻不良反应的抗酸药是

- A: 碳酸钙
- B: 铝碳酸镁
- C: 三硅酸镁
- D: 氢氧化铝

答案：B

40. 影响血脂和血糖的药物是

- A: 螺内酯
- B: 呋塞米
- C: 氢氯噻嗪
- D: 乙酰唑胺

答案：C

41. 属于 I b 类抗心律失常药且具有抗癫痫作用的是()

- A: 普鲁卡因胺
- B: 利多卡因
- C: 苯妥英钠
- D: 维拉帕米

答案：C

42. 淋巴细胞白血病采用

- A: 糖皮质激素小剂量代替疗法
- B: 抗结核病药与糖皮质激素合用
- C: 糖皮质激素一般剂量长期疗法
- D: 糖皮质激素大剂量冲击疗法

答案：C

43. 肥胖型 2 型糖尿病患者控制血糖的一线药物是()

- A: 格列吡嗪
- B: 格列本脲
- C: 二甲双胍
- D: 格列齐特

答案：C

44. 作用于近曲小管前段的利尿剂是

- A: 醛固酮受体阻断剂
- B: 碳酸酐酶抑制剂
- C: 袢利尿剂
- D: 噻嗪类和类噻嗪类利尿剂

答案：B

45. (2015 年真题) 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 M 胆碱受体阻断剂是()。

- A: 噻托溴铵
- B: 沙美特罗
- C: 多索茶碱

D: 孟鲁司特

答案: A

46. 下列对皮肤真菌感染治疗药叙述错误的是()

A: 酮康唑为咪唑类抗真菌药

B: 奈替芬是丙烯胺类抗真菌药

C: 环吡酮胺为吡啶酮类抗真菌药

D: 阿莫罗芬为唑类的局部抗真菌药

答案: D

47. 短效糖皮质激素是

A: 地塞米松

B: 甲泼尼龙

C: 氢化可的松

D: 氟氢可的松

答案: C

48. (2016 年真题) 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是

A: 阿昔莫司

B: 阿托伐他汀

C: 非诺贝特

D: 依折麦布

答案: B

49. 属于 NK-1 受体阻断剂的止吐药物是

A: 甲地孕酮

B: 阿瑞吡坦

C: 格雷司琼

D: 甲氧氯普胺

答案: B

50. 脓疱型痤疮可选用()

A: 维 A 酸

B: 林旦霜

C: 阿达帕林

D: 酮康唑

答案: C

51. 治疗各种人类血吸虫病的首选药物是

A: 乙胺嗪

B: 左旋咪唑

C: 酒石酸锑钾

D: 吡喹酮

答案: D

52. 甲氨蝶呤主要用于

A: 儿童急性白血病

B: 神经母细胞瘤

C: 室管膜瘤

D: 慢性粒细胞性白血病

答案: A

53. 扎那米韦的作用靶点是

A: 脱氧核糖核酸聚合酶

B: 神经氨酸酶

C: HIV-1 反转录酶

D: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

答案：B

54. 促进微管的装配，抑制其解聚，从而使纺锤体失去正常功能，细胞有丝分裂停止的药物是

A: 长春碱类

B: 吲哚美辛

C: 紫杉醇

D: 他莫昔芬

答案：C

55. 高血压合并痛风者不宜使用

A: 硝苯地平

B: 依那普利

C: 氢氯噻嗪

D: 阿替洛尔

答案：C

56. 患者，女，12 岁，身高 140cm，体重 32kg，因"脊柱侧弯"入院。入院后完善相关检查，拟行"脊柱侧弯截骨矫形檀骨融合内固定术"。既往有头孢类过敏史。

A: 替考拉宁

B: 克林霉素

C: 左氧氟沙星

D: 万古霉素

答案：D

57. 用于组织脱水的治疗方案是

A: 应用高渗透压的 25%~50%葡萄糖注射液滴注，常与 20%甘露醇注射液联合应用

B: 一般采用 50%葡萄糖注射液 20~40ml，快速静脉注射

C: 一般可给予 10%~25%葡萄糖注射液静脉滴注，并同时补充体液

D: 可予 10%~25%葡萄糖注射液滴注，每日 100g 葡萄糖即可控制病情

答案：A

58. 常用的外用痤疮治疗药不包括

A: 特比萘芬

B: 维 A 酸

C: 阿达帕林

D: 过氧苯甲酰

答案：A

59. 可以防治夜盲症的是

A: 维生素 C

B: 维生素 A

C: 维生素 D

D: 维生素 B

答案：B

60. 退乳药溴隐亭的临床应用注意不包括

A: 口服后个体差异较大

B: 用于治疗闭经或乳溢，可产生短期疗效，但不宜久用

C: 治疗期间禁止妊娠

D: 消化道溃疡患者慎用

答案：C

61. 下列治疗恶性肿瘤的药物中，对骨髓造血功能几乎没有抑制作用的是

- A: 泼尼松
- B: 长春碱
- C: 顺铂
- D: 表柔比星

答案：A

62. 肾上腺皮质功能不全采用

- A: 抗结核药与糖皮质激素合用
- B: 早期、大剂量、短期应用糖皮质激素
- C: 抗菌药物与糖皮质激素合用
- D: 糖皮质激素替代疗法

答案：D

63. 12%复方氨基酸注射液（18AA）的静脉滴速为

- A: 不超过 15 滴 / 分
- B: 滴速 80~100 滴 / 分
- C: 滴速 20~30 滴 / 分
- D: 不超过 40 滴 / 分

答案：C

64. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药是

- A: 维生素 B6
- B: 托烷司琼
- C: 甲氧氯普胺
- D: 阿瑞吡坦

答案：C

65. 用于治疗焦虑、镇静、催眠、惊厥症、肌紧张性头痛的药物是

- A: 地西泮
- B: 苯巴比妥
- C: 唑吡坦
- D: 卡马西平

答案：A

66. 能竞争 DNA 聚合酶的抗病毒药是

- A: 碘苷
- B: 拉米夫定
- C: 阿昔洛韦
- D: 利巴韦林

答案：C

67. 应用最广泛的口服抗凝血药是

- A: 达比加群酯
- B: 肝素
- C: 华法林
- D: 维生素 K

答案：C

68. 诱导肝微粒体酶、是皮质激素和雌激素药效降低的是()

- A: 链霉素
- B: 异烟肼
- C: 利福平
- D: 乙胺丁醇

答案：C

69. 不宜与三环类抗抑郁药合用的药物是

- A: 赛洛唑啉滴鼻液
- B: 羟甲唑啉滴鼻液
- C: 酚甘油滴耳液
- D: 麻黄碱滴鼻液

答案：D

70. 作用于微管的抗肿瘤药物是

- A: 顺铂
- B: 紫杉醇
- C: 依托泊苷
- D: 来曲唑

答案：B

71. 长期、单一应用 β

- A: 暂时性低血糖
- B: 头痛
- C: 耐药性
- D: 支气管痉挛

答案：C

72. 毒性大，不能注射用的抗真菌药是

- A: 咪康唑
- B: 灰黄霉素
- C: 克霉唑
- D: 制霉菌素

答案：D

73. 关于孟鲁司特钠临床使用注意事项的说法, 正确的是()

- A: 12 岁以下儿童禁用孟鲁司特钠
- B: 孟鲁司特钠起效快, 适用于哮喘急性发作
- C: 孟鲁司特钠使用后可能会导致嗜酸性粒细胞增多
- D: 孟鲁司特钠可单独用于哮喘治疗

答案：C

74. 伏格列波糖的降糖作用机制是

- A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- B: 直接补充胰岛素
- C: 提高靶组织对胰岛素的敏感性
- D: 竞争性抑制 α 葡萄糖苷酶

答案：D

75. 在体内可与含羟基或羧基的毒物结合形成低毒或无毒结合物排出体外, 起到解毒和保护肝脏的作用, 用于急、慢性肝炎治疗的药物是 ()

- A: 葡醛内酯
- B: 异甘草酸镁
- C: 硫普罗宁
- D: 腺苷蛋氨酸

答案：A

76. 患者, 女, 54 岁, 诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后, 病理示: 右乳浸润行导管癌 II 级, 同侧腋下淋巴结 1/18, 免疫组化: ER(-), PR(-), Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多西他赛的描述, 错误的是()

- A: 作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成
- B: 在相当剂量下，抗肿瘤作用比紫杉醇高 1 倍
- C: 多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同
- D: 属于半合成紫杉类抗肿瘤药物

答案：C

77. 主要用于复发转移乳腺癌、乳腺癌术后转移的辅助治疗和子宫内膜癌的治疗的药物是

- A: 依西美坦
- B: 来曲唑
- C: 他莫昔芬
- D: 氟维司群

答案：C

78. 服用磺胺多辛的方式不正确的是

- A: 每次服药时饮水约 240ml
- B: 餐前 1 小时服用
- C: 餐中服用
- D: 餐后 2 小时服用

答案：C

79. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食，增强运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片治疗。

- A: Hcy
- B: BUN
- C: CK
- D: Cr

答案：C

80. 属于广谱Ⅲ类抗心律失常药的是

- A: 维拉帕米
- B: 利多卡因
- C: 苯妥英钠
- D: 胺碘酮

答案：D

81. 不属于糖皮质激素对代谢的影响的是

- A: 升高血糖
- B: 增强钙离子的吸收
- C: 提高蛋白质的分解代谢
- D: 增高肝糖原

答案：B

82. （2015 年真题）利尿作用极弱，具有降低眼内压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是（）。

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 呋塞米
- D: 螺内酯

答案：A

83. 属于抑酸药的是（）

- A: 奥美拉唑
- B: 莫沙必利
- C: 胃蛋白酶

D: 胶体果胶铋

答案：A

84. 人体所需要的热量主要来源于()

A: 氨基酸

B: 果糖

C: 脂肪乳

D: 葡萄糖

答案：D

85. 用于治疗黏液性水肿的是()

A: 甲状腺素

B: 西地那非

C: 小剂量碘制剂

D: 司坦唑醇

答案：A

86. 下列药物中，属于非二氢吡啶类钙通道阻滞药的是()

A: 维拉帕米

B: 氨氯地平

C: 尼莫地平

D: 硝苯地平

答案：A

87. 关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

A: 能降低血清前列腺特异性抗原(PS)水平

B: 易引起直立性低血压

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 小剂量可促进头发生长，用于治疗源性脱发

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/225110210010012040>