

护理实习生出科理论考试

一、选择题

- 1、原发性下肢静脉曲张的典型表现为（）[单选题] *
 - A、久立后有酸胀感
 - B、足背部水肿、色素沉着
 - C、皮肤脱屑、瘙痒
 - D、游走性浅静脉炎
 - E、下肢浅静脉曲张、蜿蜒扩张、迂曲 ✓
- 2、下肢静脉曲张病人术后早期活动主要是为了预防（）[单选题] *
 - A、关节僵直
 - B、患肢水肿
 - C、血管痉挛
 - D、肌肉萎缩
 - E、深静脉血栓 ✓
- 3、下列有关伦理义务的理解不正确的是（）[单选题] *
 - A、伦理义务是自觉履行的
 - B、护理人员应对社会尽义务
 - C、伦理义务可以增强护理人员的责任感
 - D、伦理义务是个人对社会或他人所负的道德责任
 - E、履行伦理义务是与行使一定的权利联系在一起的 ✓

4、所谓有效循环血量是指（） [单选题] *

A、全身总血量

B、在动脉内的总血量

C、在静脉内的总血量

D、在微循环内的总血量

E、单位时间内通过心血管系统进行循环的血量 ✓

5、对于骨盆骨折合并尿道损伤及失血性休克患者的处理，顺序是（） [单选题] *

A、骨盆骨折—尿道损伤—休克

B、休克—尿道损伤—骨盆骨折 ✓

C、休克—骨盆骨折—尿道损伤

D、尿道损伤—休克—骨盆骨折

E、同时处理休克和尿道损伤—骨盆骨折

6、导致产褥病发生的主要原因是（） [单选题] *

A、手术切口感染

B、乳腺炎

C、上呼吸道感染

D、泌尿系统感染

E、产褥感染 ✓

7、肠结核的好发部位是（） [单选题] *

A、直肠、乙状结肠

B、降结肠

C、横结肠

D、升结肠

E、回盲部 ✓

8、新生儿 Apgar 评分的五项依据是 () [单选题] *

A、心率、呼吸、体重、哭声、皮肤颜色

B、心率、呼吸、脐血管充盈度、羊水性状、皮肤颜色

C、心率、呼吸、肌张力、皮肤颜色、喉反射 ✓

D、心率、呼吸、喉反射、哭声、脐血管充盈度

E、心率、呼吸、喉反射、皮肤颜色、哭声

9、弥散性血管内凝血患者的治疗和护理应除外 () [单选题] *

A、DIC 后期不必使用抗纤维蛋白溶解药 ✓

B、肝素使用过量时可用鱼精蛋白拮抗

C、对 DIC 患者的出血不可贸然使用一般止血药

D、一旦病因消除，DIC 被控制，应及早停用肝素治疗

E、在低凝血期，肝素与补充凝血因子需同时进行

10、蛋白尿是指 24 小时尿液蛋白含量超过 () [单选题] *

A、180mg

B、100mg

C、85mg

D、60mg

E、150mg ✓

11、下列静脉补钾的要点中，先决条件是 () [单选题] *

A、尿量须在 30 ml/h 以上 ✓

B、氯化钾浓度 0.3%

C、滴速 60 滴/min

D、生理需要成人一般为 3 g/d

E、严重病人补钾不超过 8 g/d

12、护士进行臀大肌注射的定位，正确的是（）[单选题] *

A、髂前上棘与尾骨连线内下 1/3 处

B、髂前上棘与尾骨连线外上 1/3 处 ✓

C、髂前上棘与臀裂顶点连线内上 1/2 处

D、髂前上棘与臀裂顶点连线外上 1/2 处

E、髂前上棘与尾骨连线内上 1/3 处

13、长期静脉给药者，为保护及合理使用静脉，选择血管时应（）[单选题] *

A、先上后下

B、先粗大后细小

C、由远心端到近心端 ✓

D、由近心端到远心端

E、先细直后弯曲

14、护士在指导肝硬化腹水患者的饮食，其中氯化钠的摄入量宜控制在每天（）[单选题] *

A、5.0~6.0g

B、3.5~4.0g

C、2.5~3.0g

D、1.2~2.0g ✓

E、4.0~5.0g

15、高血压患者长期服用硝苯地平，可能出现的不良反应是（）[单选题] *

A、胫前水肿 ✓

B、低血压

C、肺纤维化

D、口腔溃疡

E、心律失常

16、心搏停止后，必须建立有效人工循环的时限为（）[单选题] *

A、10 分钟

B、5~6 分钟

C、4~6 分钟 ✓

D、3~4 分钟

E、8~10 分钟

17、休克早期的临床表现是（）[单选题] *

A、表情淡漠

B、紫绀，四肢厥冷

C、血压下降，脉速

D、脉压小，尿量减少 ✓

E、抽血时血液粘稠易凝

18、患儿，3岁。不慎溺水，检查发现面部发绀，意识丧失，自主呼吸停止，颈动脉搏动消失。护士实施抢救时首先采取的措施是（）[单选题] *

A、口对口人工呼吸

B、高流量吸氧

C、准备开口器撑开口腔

D、清除口鼻分泌物和异物 ✓

E、放清洁纱布于男童口部

19、为高热患者降温进行大量不保留灌肠时，液体的温度为（） [单选题] *

A、42~45 °C

B、36~38 °C

C、33~35 °C

D、28~32 °C ✓

E、39~41 °C

20、判断肾功能最简便的方法是（） [单选题] *

A、内生肌酐清除率

B、血尿素氮测定

C、尿比重测定 ✓

D、血肌酐测定

E、尿细胞学检查

21、禁忌使用鼻饲的患者是（） [单选题] *

A、食管-胃底静脉曲张 ✓

B、脑出血

C、口腔手术

D、昏迷

E、婴幼儿

22、在消化性溃疡的治疗中，抑制胃酸分泌作用最强的药物是（）[单选题] *

A、奥美拉唑 ✓

B、碳酸氢钠

C、西咪替丁

D、铝碳酸镁

E、枸橼酸铋钾

23、不属于“三查七对”内容的是（）[单选题] *

A、床号、姓名

B、药名、浓度、剂量

C、时间、方法

D、操作前、中、后查

E、用药后反应 ✓

24、以下石膏绷带固定前准备哪项不妥（）[单选题] *

A、测量患肢长度

B、局部伤口换药

C、常规用止痛剂 ✓

D、包裹棉垫

E、维持患肢功能位或需要的固定体位

25、静脉注射 10% 葡萄糖酸钙时，应注意监测（）[单选题] *

A、体温

B、呼吸

C、心率 ✓

D、血压

E、意识改变

26、关于使用无菌手套的方法正确的是（） [单选题] *

A、戴手套前需洗手、剪指甲 ✓

B、无菌手套污染后用无菌生理盐水冲洗后可继续使用

C、未戴手套的手可触及另一手套的外面

D、已戴手套的手可触及另一手套的内面

E、戴好手套后两手应置于胸部以上水平

27、诊断急性胰腺炎最有意义的指标是（） [单选题] *

A、血心肌酶

B、血淀粉酶 ✓

C、血肌酐

D、血钠

E、尿淀粉酶

28、做尿糖定性检查时，应留取的尿液是（） [单选题] *

A、餐前半小时尿

B、24 小时尿

C、任意时间尿

D、晨尿 ✓

E、中段尿

29、急性心肌梗死患者最早、最突出的症状是（） [单选题] *

A、腹痛、腹泻

B、心前区压榨样疼痛 ✓

C、室性期前收缩（期前收缩）

D、心源性休克

E、呼吸困难

30、腹部的缝合伤口，出现红肿、压痛、有波动，最主要的处理是（） [单选题] *

A、拆除缝线，引流 ✓

B、应用抗生素

C、局部热敷

D、半卧位

E、局部理疗

31、有机磷农药中毒时，阿托品对下列症状治疗无效的是（） [单选题] *

A、平滑肌痉挛

B、肌纤维颤动 ✓

C、恶心、呕吐、腹泻、流涎

D、瞳孔缩小

E、心动过缓

32、关于剧毒药、麻醉药的保管，下列说法不妥的是（） [单选题] *

A、登记本由医生签名 ✓

B、专本登记

C、加锁保管

D、专人负责

E、凭空瓶领取

33、破伤风阵发性痉挛最先累及的肌肉是（）[单选题] *

A、咀嚼肌 ✓

B、肋间肌

C、四肢肌

D、背腹肌

E、颈项肌

34、家庭输氧疗法不正确的是（）[单选题] *

A、采用鼻导管给氧

B、流量 1~2 L/min

C、每天氧疗时间不少于 12 小时

D、睡眠时间不可间断

E、睡眠时间可停止吸氧 ✓

35、急性肾小球肾炎最常见的并发症是（）[单选题] *

A、严重循环充血、高血压脑病、急性肾衰竭 ✓

B、高血压脑病、营养不良、急性肾衰竭

C、营养不良、高血压脑病、慢性肾衰竭

D、慢性肾衰竭、严重循环充血

E、严重循环充血、营养不良、急性肾衰竭

36、对阻塞性肺气肿的诊断，最有价值的检查结果是（）[单选题] *

A、残气量占肺总量百分比增加 ✓

B、PaO₂ 下降

C、中性粒细胞增高

D、肺活量低于正常

E、PaCO₂ 升高

37、有助于肝癌早期诊断的实验室检查是（）[单选题] *

A、血清脂类测定

B、甲胎蛋白测定 ✓

C、肝功能检测

D、癌胚抗原测定

E、胆红素代谢试验

38、弥散性血管内凝血在消耗性低凝期的病理变化不包括（）[单选题] *

A、纤维蛋白原减少

B、血中凝血酶增加 ✓

C、出凝血时间延长

D、凝血酶原时间延长

E、血小板减少

39、输液时，液体不滴，局部无肿胀，挤压输液管感有阻力，无回血，应（）[单选题]

*

A、提高输液瓶的位置

B、调整针头位置

C、局部热敷

D、用肝素冲管

E、更换针头，重新穿刺 ✓

40、全身化脓性感染做血细胞细菌培养，护士采用的最佳采血时间是（）[单选题] *

A、输入抗生素后 2 小时

B、寒战、高热时 ✓

C、高热间歇时

D、退热后

E、输入抗生素后 1 小时

41、大量输库血时要防止出现（） [单选题] *

A、低血钾与高血钙

B、碱中毒与高钾血症

C、酸中毒与低钾血症

D、酸中毒与高钾血症 ✓

E、碱中毒与低钾血症

42、病员王某某，左上肢因输液引起索条状红线，红肿热痛，伴畏寒。发热，下述处理错误的是（） [单选题] *

A、用抗生素

B、95% 乙醇湿敷

C、超短波理疗

D、抬高患肢

E、增加患肢活动 ✓

43、观察休克患者的组织灌流情况，下列哪项最为可靠（） [单选题] *

A、脉率

B、血压

C、呼吸

D、神志

E、尿量 ✓

44、提示上消化道出血已停止的指标是（） [单选题] *

A、自觉口渴

B、脉搏正常

C、尿素氮恢复正常 ✓

D、柏油样便变稀

E、肠鸣音恢复

45、干燥法存放无菌持物钳的有效期一般为（） [单选题] *

A、7天

B、1天

C、6小时

D、4小时 ✓

E、3天

46、选择抗菌药物最理想的根据是（） [单选题] *

A、细菌的种类

B、细菌药物敏感试验 ✓

C、脓液的性状

D、药物的抗菌谱

E、感染的严重程度

47、当患者发生脑疝时，下列对其瞳孔变化的描述，正确的是（） [单选题] *

A、瞳孔边缘不齐

- B、双侧瞳孔直径<3mm
- C、双侧瞳孔直径>5mm
- D、单侧瞳孔直径>6mm ，固定 ✓
- E、双侧瞳孔直径大小不定

48、防病员坠床，最佳措施是（） [单选题] *

- A、约束带固定肩部
- B、约束带固定膝部
- C、床档 ✓
- D、约束带固定踝部
- E、约束带固定腕部

49、给病人鼻饲，胃管插入长度相当于病人的（） [单选题] *

- A、眉心至胸骨柄长
- B、眉心至剑突长
- C、发际至剑突长 ✓
- D、发际至胸骨柄长
- E、鼻尖至剑突长

50、以下给药途径中，吸收最快的途径是（） [单选题] *

- A、皮下注射
- B、直肠
- C、皮肤外用
- D、口服
- E、肌肉注射 ✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/22511112200011342>