

## 2023-24 年广西壮族自治区资源县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库（名校卷）

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 化学结构与醛固酮相似

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 螺内酯
- D: 呋塞米

答案：C

2. 主要用于肺炎支原体、衣原体、立克次体及螺旋体（四体）感染的药物是

- A: 红霉素
- B: 阿奇霉素
- C: 四环素
- D: 头孢米诺

答案：C

3. 属于非麻醉性镇痛药的是

- A: 美沙酮
- B: 吗啡
- C: 布洛芬
- D: 可待因

答案：C

4. 异烟肼抗结核杆菌的作用原理是

- A: 抑制分枝菌酸合成
- B: 抑制蛋白质合成
- C: 与锌离子络合、影响戊糖代谢
- D: 抑制 RNA 多聚酶

**答案：A**

5. 伏格列波糖的降糖作用机制是

- A: 提高靶组织对胰岛素的敏感性
- B: 竞争性抑制  $\alpha$  葡萄糖苷酶
- C: 刺激胰岛  $\beta$  细胞释放胰岛素
- D: 直接补充胰岛素

**答案：B**

6. 下列哪种氨基酸与螺内酯合用时可导致血钾升高

- A: 门冬氨酸
- B: 精氨酸
- C: 谷氨酸
- D: 赖氨酸

**答案：B**

7. 下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

- A: 美西律
- B: 普萘洛尔
- C: 胺碘酮
- D: 地尔硫革

**答案：B**

8. 对磺胺类药物有严重过敏史的患者应避免使用的药物是

- A: 坦洛新
- B: 特拉唑嗪
- C: 西地那非
- D: 十一酸睾酮

**答案：A**

9. 可导致新生儿的戒断症状和呼吸抑制的是

- A: 布地奈德
- B: 氨茶碱
- C: 沙丁胺醇
- D: 可待因

**答案：D**

10. 辛伐他汀用于心血管事件高危人群的初始剂量是

- A: 10mg
- B: 5mg
- C: 15mg
- D: 20~40mg

**答案：D**

11. 维生素 B12 的适应证为

- A: 纤溶亢进所致的出血
- B: 恶性贫血和巨幼细胞贫血
- C: 拮抗华法林过量导致的出血
- D: 拮抗肝素过量导致的出血

**答案：B**

12. 维持心肌和神经肌肉的正常应激性，须静脉滴注给药的电解质是

- A: 氯化钾
- B: 硫酸镁
- C: 氯化钠
- D: 氯化钙

**答案：A**

13. 通过干扰真菌细胞膜麦角固醇的合成导致真菌死亡的是

- A: 制霉菌素
- B: 阿莫罗芬
- C: 环吡酮胺
- D: 特比萘芬

**答案：B**

14. 属于多烯类的是

- A: 特比萘芬
- B: 卡泊芬净
- C: 制霉菌素
- D: 氟胞嘧啶

**答案：C**

15. 属于贝丁酸类调节血脂药的是

- A: 阿昔莫司
- B: 依折麦布
- C: 阿托伐他汀
- D: 非诺贝特

**答案：D**

16. 甲氨蝶呤抗肿瘤作用机制是抑制

- A: 二氢叶酸还原酶
- B: 四氢叶酸合成酶
- C: 四氢叶酸还原酶
- D: 二氢叶酸合成酶

**答案：A**

17. 可用维生素 B6 防治的异烟肼的不良反应是

- A: 肝损伤
- B: 过敏反应
- C: 胃肠道反应
- D: 周围神经炎

**答案：D**

18. 硝酸酯类药发挥抗心绞痛作用时，体内参与的物质不包括

- A:  $\beta$  受体
- B: 谷胱甘肽转移酶
- C: 钙离子
- D: cGMP 依赖性蛋白激酶

**答案：A**

19. (2018 年真题) 可用于治疗厌氧菌及产 ESBL 的革兰阴性杆菌感染的药物是 ( )

- A: 头孢米诺
- B: 头孢唑林
- C: 头孢他啶

D: 头孢呋辛

**答案：A**

20. 口服可用于肠道感染的药物是

A: 链霉素

B: 妥布霉素

C: 庆大霉素

D: 奈替米星

**答案：C**

21. 整合素受体阻断剂的机制

A: 抑制葡萄糖脱氢酶

B: 使血小板内 cAMP 浓度增高而产生抗血小板作用

C: 抑制纤维蛋白原与血小板膜表面糖蛋白受体的结合

D: 抑制血小板表面的 ADP 受体

**答案：C**

22. 重度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

A: 5-HT<sub>3</sub> 受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦

B: 奥美拉唑+口服地塞米松

C: 5-HT<sub>3</sub> 受体阻断剂+口服地塞米松

D: 每日化疗前，应用 5-HT<sub>3</sub> 受体阻断剂或口服地塞米松

**答案：A**

23. 维生素 A 缺乏时可引起

A: 坏血病

B: 角膜软化

C: 成人佝偻病

D: 脚气病

**答案: B**

24. 早产儿、新生儿禁用()

A: 夫西地酸

B: 利福平

C: 氯霉素

D: 四环素可的松

**答案: C**

25. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食，增强运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片治疗。

A: 20~40mg

B: 2~4mg

C: 5~10mg

D: 10~15mg

**答案: A**

26. (2019 年真题) 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

A: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦

B: 从 ACEI 转换为沙库巴曲缬沙坦时，应停用 ACEI 36 小时后方可转换

C: 轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦

D: 沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用

**答案: D**

27. 属于孕激素类的是

- A: 己烯雌酚
- B: 他莫昔芬
- C: 甲地孕酮
- D: 睾酮

**答案：C**

28. (2019 年真题) 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化、利尿的同时，还应给予的药物是 ( )

- A: 二甲双胍
- B: 美司钠
- C: 氯化钾
- D: 螺内酯

**答案：B**

29. 用于缺血性心脏病、血栓栓塞性疾病、心肌缺血的诊断试验的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 双嘧达莫
- C: 硝酸甘油
- D: 硝苯地平

**答案：B**

30. (2019 年真题) 长期用药易发生低镁血症的药物是 ( )

- A: 替普瑞酮
- B: 奥美拉唑
- C: 胶体果胶铋
- D: 复方碳酸钙

**答案：B**

31. 强心苷类中毒的症状不包括

- A: 心肌强力收缩
- B: 红-绿、蓝-黄辨认异常
- C: 心律失常
- D: 嗜睡

**答案：A**

32. 为克服服药初期的类早孕反应，双炔失碳酯肠溶片中含有

- A: 雌二醇
- B: 炔雌醇
- C: 维生素 B6
- D: 去氧孕烯

**答案：C**

33. 抑制蛋白质合成与功能的药物是()

- A: 顺铂
- B: 高三尖杉酯碱
- C: 氟尿嘧啶
- D: 多柔比星

**答案：B**

34. 非麻醉性镇痛药中属于中枢性镇痛药的是

- A: 吗啡
- B: 秋水仙碱
- C: 曲马多
- D: 布洛芬

**答案：C**

35. 属于硝基呋喃类的是

- A: 甲硝唑
- B: 磺胺甲
- C: 夫西地酸
- D: 呋喃妥因

**答案：D**

36. 主要用于治疗皮肤真菌感染，可抑制角鲨烯环氧酶活性，属于丙烯胺类的抗真菌药物是

- A: 联苯苄唑
- B: 阿莫罗芬
- C: 特比萘芬
- D: 制霉菌素

**答案：C**

37. 可致色觉异常的药物是

- A: 硝酸甘油
- B: 地高辛
- C: 卡托普利
- D: 氨氯地平

**答案：B**

38. 治疗立克次体感染所致斑疹伤寒应首选

- A: 链霉素
- B: 青霉素
- C: 四环素
- D: 庆大霉素

**答案：C**

39. 下列强心苷类药物中，主要经肝脏代谢的是()

- A: 毒毛花苷 K
- B: 毛花苷丙
- C: 地高辛
- D: 洋地黄毒苷

**答案：D**

40. 对 I 型和 II 型单纯疱疹病毒作用最强的是

- A: 干扰素
- B: 奥司他韦
- C: 阿昔洛韦
- D: 阿糖腺苷

**答案：C**

41. 患者。女,43 岁,左乳浸润性导管癌术后放、化疗 3 年后复发左肺门、左锁骨上、左腋窝淋巴结转移现采用卡培他滨+多西他赛行复发后第一周期化疗化疗后第 2 日,患者出现重度恶心、呕吐,根据化疗药物致吐分级,宜选用的对症治疗药物是 ( )

- A: 甲氧氯普胺
- B: 奥美拉唑
- C: 地塞米松
- D: 昂丹司琼

**答案：D**

42. 肥胖型 2 型糖尿病患者控制血糖的一线药物是()

- A: 二甲双胍

- B: 格列本脲
- C: 格列吡嗪
- D: 格列齐特

**答案：A**

43. 对于急性红斑、水疱可选择的剂型不包括

- A: 洗剂
- B: 乳膏剂
- C: 油剂
- D: 粉剂

**答案：B**

44. 关于唑吡坦作用特点的说法,错误的是()

- A: 唑吡坦属于  $\gamma$ -氨基丁酸 A 型受体激动剂
- B: 唑吡坦血浆蛋白结合率高
- C: 口服唑吡坦后消化道吸收迅速
- D: 唑吡坦具有镇静催眠作用, 抗焦虑作用

**答案：D**

45. 需要内因子辅助吸收的维生素是

- A: 维生素 B6
- B: 维生素 B12
- C: 烟酸
- D: 叶酸

**答案：B**

46. 起效缓慢,可增加心力衰竭和女性骨折风险的口服抗糖尿病药物是  
( )

- A: 利拉鲁肽
- B: 瑞格列奈
- C: 罗格列酮
- D: 艾塞那肽

**答案：C**

47. 痛风首选

- A: 非药物治疗
- B: 别嘌醇
- C: 丙磺舒
- D: 外源性拉布立酶

**答案：A**

48. 治疗敏感菌所致成人伤寒、副伤寒的应选药物是()

- A: 磺胺嘧啶
- B: 呋喃妥因
- C: 氯霉素
- D: 左氧氟沙星

**答案：D**

49. 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下,请结合问题作答。

- A: 患者,男,47岁,慢性心力衰竭,LVEF=35%,血压 120/65mmHg
- B: 患者,男,47岁,诊断为难治性高血压,使用依那普利、氯氯噻嗪、氨氯地平治疗仍未达标
- C: 患者,男,47岁,慢性心力衰竭伴高钾血症(血 K<sup>+</sup>5
- D: 患者,男,47岁,诊断为高血压,生活方式干预无效,随机血压 155/95mmHg

**答案：A**

50. 患者男性，29 岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压 85/60mmHg，脉率 110 次/分。

- A: 特异质反应
- B: 吉海反应
- C: 反跳现象
- D: 过敏反应

**答案：D**

51. 阻断脑内多巴胺受体，小剂量抑制延脑催吐化学感受区的多巴胺受体，大剂量时直接抑制呕吐中枢，兼有镇静作用的是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 劳拉西泮
- C: 帕洛诺司琼
- D: 氯丙嗪

**答案：D**

52. 硫脲类药物的基本作用是

- A: 抑制  $\text{Na}^+-\text{K}^+$  泵
- B: 抑制甲状腺蛋白水解酶
- C: 抑制碘泵
- D: 抑制甲状腺过氧化酶

**答案：D**

53. 司坦唑醇不具有的适应证为 ()

- A: 痤疮

- B: 骨质疏松症
- C: 慢性消耗性疾病
- D: 遗传性血管神经性水肿

**答案：A**

54. 与多柔比星合用或配伍与多柔比星合用或配伍

- A: 甲氨蝶呤
- B:  $\beta$  受体阻断剂
- C: 利福平
- D: 阿糖胞苷

**答案：D**

55. (2015 年真题) 阿片类镇痛药与硫酸镁合用，可增强中枢抑制，导致的不良反应是 ( )。

- A: 低血压
- B: 躁狂
- C: 便秘
- D: 胆绞痛

**答案：A**

56. 下列药物使用期间需要缓慢停药的是

- A: 地尔硫?
- B: 比索洛尔
- C: 依那普利
- D: 氨氯地平

**答案：B**

57. 不属于茶碱适应证的是

- A: 支气管哮喘
- B: 阻塞性肺气肿
- C: 过敏性鼻炎
- D: 喘息型支气管炎

**答案：C**

58. 长期、单一应用  $\beta$

- A: 支气管痉挛
- B: 暂时性低血糖
- C: 耐药性
- D: 头痛

**答案：C**

59. 克罗米通乳膏用于治疗

- A: 寻常痤疮
- B: 疥疮
- C: 蛲虫感染
- D: 体、股癣

**答案：B**

60. 使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是

- A: 氯化钾
- B: 果糖
- C: 硫酸镁
- D: 氯化钙

**答案：D**

61. 不可用于降低眼压的药物是

- A: 卡替洛尔滴眼剂
- B: 拉坦前列素滴眼剂
- C: 毛果芸香碱滴眼剂
- D: 利福平滴眼剂

**答案：D**

62. 属于 I b 类抗心律失常药且具有抗癫痫作用的是()

- A: 利多卡因
- B: 普鲁卡因胺
- C: 维拉帕米
- D: 苯妥英钠

**答案：D**

63. 下列选项中，属于四环素禁用的人群有()

- A: 妊娠期妇女
- B: 中、老年人
- C: 月经期妇女
- D: 精神病患者

**答案：A**

64. 与氯吡格雷合用，竞争 CYP2C19，使用氯吡格雷患者血栓不良反应事件增多的药物是

- A: 西咪替丁
- B: 泮托拉唑
- C: 雷贝拉唑
- D: 奥美拉唑

**答案：D**

65. 治疗斑疹伤寒的首选药是

- A: 四环素
- B: 氯霉素
- C: 诺氟沙星
- D: 青霉素

**答案：A**

66. 属于抗甲状腺药的是

- A: 醋酸去氨加压素
- B: 甲巯咪唑
- C: 生长抑素
- D: 左甲状腺素

**答案：B**

67. (2021 年真题) 适用于膀胱过度兴奋引起的尿频、尿急或紧迫性尿失禁症状治疗的药物是 ( )。

- A: 坦洛新
- B: 度他雄胺
- C: 托特罗定
- D: 托拉塞米

**答案：C**

68. 用于流脑，阻碍细菌二氢叶酸合成酶的药物是

- A: 利巴韦林
- B: 拉米夫定
- C: 氟康唑
- D: 磺胺嘧啶

**答案：D**

69. (2015 年真题) 李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是 ( )。

- A: 二甲双胍
- B: 辛伐他汀
- C: 米氮平
- D: 阿司匹林

**答案: C**

70. 洋地黄的主要适应症不包括

- A: 房室传导阻滞
- B: 急、慢性充血性心力衰竭
- C: 阵发性室上性心动过速
- D: 心房扑动

**答案: A**

71. 强心苷中毒所致的心室纤颤宜选用 ( )

- A: 普罗帕酮
- B: 地尔硫
- C: 利多卡因
- D: 胺碘酮

**答案: C**

72. 下列药品中，属于酰胺类的脑功能改善及记忆障碍药是

- A: 胞磷胆碱
- B: 利斯的明
- C: 多奈哌齐
- D: 吡拉西坦

**答案：D**

73. 避免同时使用“蜡质”脱毛方法的药物()

- A: 异维 A 酸
- B: 维 A 酸
- C: 壬二酸
- D: 阿达帕林

**答案：D**

74. 通过抑制 GABA 转移酶而达到抗癫痫作用的药物是

- A:  $\gamma$ -氨基丁酸类似物
- B: 脂肪酸类
- C: 二苯并氮革类
- D: 乙内酰脲类

**答案：A**

75. 对地高辛中毒出现严重心律失常者可静脉滴注

- A: 阿托品
- B: 利尿剂
- C: 氯化钾、葡萄糖注射液
- D: 苯妥英钠

**答案：C**

76. 氟他胺适用于治疗()。

- A: 晚期前列腺癌
- B: 晚期睾丸肿瘤
- C: 急性淋巴细胞白血病
- D: 绒毛膜上皮癌

**答案：A**

77. 妨碍铁剂在肠道吸收的物质是()

- A: 食物中的半胱氨酸
- B: 枸橼酸钠
- C: 维生素 C
- D: 食物中的高磷、鞣酸等

**答案：D**

78. 利福平抗结核杆菌的作用原理是

- A: 抑制蛋白质合成
- B: 抑制分枝菌酸合成
- C: 抑制 RNA 多聚酶
- D: 抑制结核杆菌叶酸的代谢

**答案：C**

79. 维生素 K

- A: 抑制血小板聚集
- B: 促进纤溶
- C: 促进四氢叶酸类辅酶的循环利用
- D: 促进凝血因子合成

**答案：D**

80. 可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

- A: 红霉素
- B: 他莫昔芬
- C: 维生素 C
- D: 氯丙嗪

**答案：B**

81. 主要用于复发转移乳腺癌、乳腺癌术后转移的辅助治疗和子宫内膜癌的治疗的药物是

- A: 他莫昔芬
- B: 依西美坦
- C: 来曲唑
- D: 氟维司群

**答案：A**

82. 属于白三烯受体阻断剂的平喘药是

- A: 沙美特罗
- B: 布地奈德
- C: 孟鲁司特
- D: 多索茶碱

**答案：C**

83. 属于 GLP-1 受体激动剂的药物是

- A: 阿格列汀
- B: 那格列奈
- C: 利拉鲁肽
- D: 伏格列波糖

**答案：C**

84. 吸入用布地奈德混悬液抗炎作用是强的松龙的

- A: 15 倍
- B: 25 倍
- C: 40 倍

D: 100 倍

**答案：A**

85. 抑制排卵避孕药的较常见不良反应是

A: 多毛、痤疮

B: 肾功能损坏

C: 子宫不规则出血

D: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌

**答案：C**

86. 首选用于伤寒、副伤寒的是()

A: 氯霉素

B: 青霉素

C: 克林霉素

D: 两性霉素 B

**答案：A**

87. 下列药动学/药效学 (PK/PD) 参数中，适用于浓度依赖型抗菌药物的评估指标

A: 血浆药物半衰期 ( $t_{1/2}$ )

B: 血浆药物峰浓度与最低抑菌浓度比值 ( $C_{max}/MIC$ )

C: 血浆药时曲线下面积与血浆达峰时间比值 ( $AUC/T_{max}$ )

D: 血浆药物峰浓度与达峰时间比值 ( $C_{max}/T_{max}$ )

**答案：B**

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/225141024131012033>