

2024 年护师类之主管护师通关提分题库及完整答案

单选题（共 45 题）

1、患者男，30 岁。颜面及四肢多处被强酸泼及，经评估烧伤总面积达45%应诊断为（ ）。

- A. 轻度烧伤
- B. 中度烧伤
- C. 重度烧伤
- D. 严重烧伤
- E. 特重烧伤

【答案】 C

2、老年痴呆症的“十大警号”不包括（ ）。

- A. 性格改变
- B. 判断力减退
- C. 失去做事主动性
- D. 睡眠质量下降
- E. 语言表达困难

【答案】 D

3、消化性溃疡患者需要服用硫糖铝治疗，服药时间最好是（ ）。

- A. 晨起空腹
- B. 与第 1 口饭同服
- C. 餐前 1 小时
- D. 餐后立即

E. 两餐中间

【答案】 C

4、夫妻情感上的第二危机时期是指（ ）。

A. 青年期

B. 中年期

C. 更年期

D. 老年期

E. 高寿期

【答案】 B

5、一位患有军团菌肺炎的病人，治疗时其首选的抗生素是

A. 红霉素

B. 万古霉素

C. 头孢菌素

D. 青霉素

E. 庆大霉素

【答案】 A

6、患者男，65岁。既往冠心病史多年，近日心绞痛发作次数频繁，日常活动明显受限，一般行走时即可发生心前区疼痛、呼吸困难等症状。该患者心绞痛分级为（ ）。

A. I级

B. II级

C. III级

D. IV级

E. V级

【答案】 C

7、下列有关妇科腹部手术病人术后引流管的护理内容应除外

A. 随时观察引流液的性质和量

B. 保持引流管通畅

C. 引流瓶应隔日更换

D. 引流管需要每日更换

E. 每日测体温 3 次，以及早发现感染征兆

【答案】 C

8、最狭窄的骨盆平面是

A. 骨盆入口平面

B. 中骨盆平面

C. 大骨盆平面

D. 小骨盆平面

E. 骨盆出口平面

【答案】 B

9、关于母儿血型不合，下列不正确的解释是

A. 母儿 Rh 血型不合时，第一胎时便可发生新生儿溶血症

B. 母儿 ABO 血型不合时，第一胎便可发生新生儿溶血症

C. 母 Rh 阳性，父 Rh 阳性，新生儿一般不会发生溶血

D. 母血型为 O，父血型为 A 或 B 时，可能发生新生儿溶血

E. 母血型为 A，一般不会发生新生儿 AB0 溶血

【答案】 A

10、男，61 岁。患慢性迁延性肝炎 23 年，因全身明显乏力、食欲缺乏、腹胀、腹泻 1 个月而入院。入院时查体面色灰暗，体型消瘦，皮肤巩膜轻度黄染，腹部膨隆，叩诊有移动性浊音。对该病人做饮食护理时，应限制病人摄入的离子是

A. 钾

B. 铁

C. 磷

D. 钙

E. 镁

【答案】 C

11、已婚妇女产后 6 个月的避孕方法是

A. 宫内节育器

B. 短效口服避孕药

C. 输卵管结扎术

D. 探亲避孕药

E. 皮下埋植

【答案】 A

12、术后疼痛对于病人的影响不包括

A. 肺通气功能增加，二氧化碳排出过多

- B. 血压升高，心动过速
- C. 胃肠道蠕动能力下降
- D. 免疫系统受到抑制
- E. 产生不良情绪

【答案】 A

13、以下不属于口服避孕药副反应的是（ ）。

- A. 闭经
- B. 色素沉着
- C. 骨质疏松
- D. 突破性出血
- E. 体重增加

【答案】 C

14、慢性疾病的发展规律，不正确的是（ ）。

- A. 慢性病起病隐匿
- B. 慢性病可以治愈或根除
- C. 慢性病潜伏期较长，病情迁延
- D. 部分轻型慢性病人，可以通过非药物治疗控制病情
- E. 应重视心理、精神因素在慢病发生中的作用

【答案】 B

15、有关持续质量改进的叙述，以下错误的是

- A. 强调通过检查手段提高质量

- B. 强调顾客的需要和诚信
- C. 强调对员工尊重、引导、激励、授权
- D. 强调通过改进持续性提高质量
- E. 强调全员参与

【答案】 A

16、患者女性，39 岁，因阴道分泌物增多半年于门诊就诊。妇科检查：宫颈重度糜烂。宫颈 TCT 检查结果为 ASCUS，HPV（-），对该患者而言，恰当的处理是

- A. 宫颈活组织检查
- B. 6~12 个月复查宫颈 TCT
- C. 子宫颈锥切术
- D. 子宫颈切除术
- E. 子宫切除术

【答案】 B

17、男，50 岁，近半年来反复出现咳嗽、胸闷、气短，支气管镜检示原发性支气管肺癌，对此病人首选的治疗方法是（ ）。

- A. 手术治疗
- B. 化学药物疗法
- C. 放射疗法
- D. 内分泌治疗
- E. 中药治疗

【答案】 A

18、患儿，男，40 天。过期产，出生后第 3 天出现黄疸，至今尚未完全消退。生后少哭，少动。吃奶尚可，大便 2 天 1 次，色黄。腹软较胀，有脐疝，肝肋下 2cm。血清总胆红素 $170\mu\text{mol/L}$ ，结合胆红素 $21\mu\text{mol/L}$ ，血红蛋白 110g/L ， $\text{RBC}3.8\times 10^{12}/\text{L}$

- A. 新生儿肝炎
- B. 先天性胆道闭锁
- C. 先天性甲状腺功能减低症
- D. 败血症
- E. 先天性巨结肠

【答案】 C

19、缩唇呼吸训练时，吸气与呼气时间之比为（ ）。

- A. 4:1
- B. 2:1~3:1
- C. 1:1
- D. 1:2~1:3
- E. 1:4

【答案】 D

20、预防异位妊娠最主要的措施是（ ）。

- A. 加强锻炼
- B. 预防盆腔炎
- C. 卧床休息
- D. 加强营养
- E. 注意个人卫生

【答案】 B

21、新生儿，出生时胸骨左缘第 2 肋间可闻及收缩期杂音，出生后 24 小时内杂音消失，应考虑该新生儿（ ）。

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管功能上关闭
- D. 肺动脉狭窄
- E. 法洛四联症

【答案】 C

22、患者女，41 岁。近半年阴道分泌物增多，呈白色粘液状，伴腰骶部位疼痛，下坠感。妇科检查：宫颈糜烂占宫颈面积 1/3，子宫及双侧附件未见异常。下一步最应该采取的检查是（ ）。

- A. 阴道镜
- B. 宫腔镜
- C. 腹腔镜
- D. 宫颈刮片检查
- E. 诊断性宫颈锥切术

【答案】 D

23、妊娠期容易发生心衰的时间是

- A. 妊娠 20～24 周
- B. 妊娠 24～28 周
- C. 妊娠 28～30 周

D. 妊娠 32~34 周

E. 妊娠 34~38 周

【答案】 D

24、肝癌患者肝区疼痛的规律是

A. 持续性钝痛或胀痛

B. 空腹时疼痛，进食后缓解

C. 饭后半小时刺痛

D. 疼痛放射致肩背部

E. 剧烈的绞痛

【答案】 A

25、患者女，18 岁，因反复发热半月余入院，查体：T 39.8℃，P 100 次/分，R 25 次/分，精神萎靡，呈中度贫血貌；未见皮下出血点，伴有全身淋巴结肿大，胸骨下端明显压痛；心肺（-）肝脾均肋下 2cm，无压痛，实验室检查：WBC $110 \times 10^9/L$ ，Hb 65g/L，血小板 $70 \times 10^9/L$ ；外周血中可见到原始及幼淋巴细胞。该患者最可能的诊断是（ ）。

A. 急性粒细胞白血病

B. 急性淋巴细胞白血病

C. 急性非淋巴细胞白血病

D. 慢性粒细胞白血病

E. 慢性淋巴细胞白血病

【答案】 B

26、病人因脑血管病导致智能损害早期表现为（ ）。

- A. 病理性赘述
- B. 流利型失语
- C. 近记忆障碍
- D. 被偷窃妄想
- E. 强制性哭笑

【答案】 C

27、对处于艾滋病窗口期感染者状况的描述，正确的是（ ）。

- A. 个体无特殊不适
- B. 传染性极强
- C. 病毒数量不多
- D. 血清抗体阳性
- E. 血中病毒呈阴性

【答案】 B

28、患者男，50 岁。食管癌切除术后 1 天，生命体征稳定，患者主诉伤口疼痛，护理措施错误的是（ ）。

- A. 吸氧
- B. 遵医嘱予适当止痛
- C. 尽量避免咳嗽
- D. 病情平稳后取半卧位
- E. 禁食，输液

【答案】 A

29、应用利尿剂治疗心功能不全的作用是（ ）。

- A. 排钠排水
- B. 提高心肌收缩力
- C. 增加心排量
- D. 减轻水肿
- E. 降低动脉压

【答案】 A

30、胃大部切除手术采取的体位是（ ）。

- A. 仰卧式
- B. 半坐卧式
- C. 侧卧式
- D. 俯卧式
- E. 膀胱截石卧式

【答案】 A

31、保持皮肤清洁、干燥，主要针对临终患者的哪项变化

- A. 肌张力丧失
- B. 胃肠蠕动减弱
- C. 循环功能减退
- D. 呼吸困难
- E. 疼痛

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/225244043140012004>