

2024 江西省珠山区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库附答案【夺分金卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 以下哪种铁剂口服吸收效果最差（）

- A: 琥珀酸亚铁（2 价铁）
- B: 乳酸亚铁（2 价铁）
- C: 右旋糖酐铁（2 价铁）
- D: 枸橼酸铁（3 价铁）

答案：D

2. 患者，男，58 岁，体重 68kg，高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰，伴发热，入院查体 BP：120/80mmHg，T38.9℃。化验结果：白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 86%。胸片示：右下肺纹理增粗，诊断为社区获得性肺炎，青霉素皮试阳性。

- A: 哌拉西林
- B: 头孢他啶
- C: 头孢曲松
- D: 阿奇霉素

答案：B

3. 细菌感染患者可出现

- A: 血小板增多
- B: 红细胞/血红蛋白减少
- C: 中性粒细胞增多

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案: C

4. 静脉注射阿昔洛韦的适宜溶媒是

A: 50%葡萄糖注射液

B: 0.9%氯化钠注射液

C: 5%葡萄糖注射液

D: 复方氨基酸注射液

答案: B

5. 促进铁剂吸收的

A: 牛奶、蛋类

B: 胰酶

C: 碳酸氢钠

D: 维生素 C

答案: D

6. 丝裂霉素

A: 溶血性尿毒症

B: 出血性膀胱炎

C: 心脏毒性

D: 肺纤维化

答案: A

7. 抗生素的理论效价指纯品的质量与效价单位的折算比率。以其特定的“盐” $1\mu\text{g}$ 作为 IU 的抗生素是

A: 土霉素

B: 链霉素

C: 红霉素

D: 四环素

答案: D

8. (2017 年真题) 患者，男，57 岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊，经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为 H1N1 甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是 ()

A: 利巴韦林

B: 金刚乙胺

C: 金刚烷胺

D: 奥司他韦

答案: D

9. 重组人促红素需要的特殊贮存条件是

A: 低温

B: 遮光

C: 不宜振摇

D: 密闭

答案: C

10. 医生开具处方，必须使用药品的名称是

A: 药品商标名

B: 药品习用名

C: 药品化学名

D: 药品通用名

答案: D

11. 可引起口渴、头晕的是

- A: 抗过敏药
- B: 东莨菪碱
- C: 阿米洛利
- D: 右美沙芬

答案：C

12. (2017 年真题) 急性细菌性扁桃体炎患者常表现为 ()

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 红细胞增多
- C: 血红蛋白减少
- D: 中性粒细胞增多

答案：D

13. 一般由葡萄糖与脂肪提供 NPC 的比例是

- A: NPC5: 5
- B: NPC7:3
- C: 100kcal:1gN
- D: 150kcal:1gN

答案：B

14. 对于不符合溶栓适应证且无抗血小板治疗禁忌证的急性脑梗死患者在发病后尽早给予阿司匹林，推荐剂量为

- A: 300~350mg/d
- B: 50~150mg/d
- C: 150~300mg/d
- D: 200~350mg/d

答案：C

15. 痛风患者急性关节炎期间常见单个关节出现红、肿、热、痛，最常见的病变部位是

- A: 颈椎关节
- B: 第一跖趾关节
- C: 腰椎关节
- D: 胸椎关节

答案：B

16. 患者，女，85 岁，既往有高血压病史，慢性心力衰竭，给予地高辛每日维持量治疗，近 1 周频发室性心动过速，检测血钾值在正常范围。

- A: 阿托品
- B: 苯巴比妥
- C: 苯海拉明
- D: 胺碘酮

答案：A

17. 适宜于睡前服用的药物是

- A: 沙丁胺醇
- B: 舒林酸
- C: 西咪替丁
- D: 氢化可的松

答案：A

18. 配制 10%葡萄糖注射液 500ml，现用 50%和 5%的葡萄糖注射液混合，需要

- A: 50%葡萄糖注射液 94ml 和 5%葡萄糖注射液 406ml
- B: 50%葡萄糖注射液 72ml 和 5%葡萄糖注射液 428ml
- C: 50%葡萄糖注射液 56ml 和 5%葡萄糖注射液 444ml

D: 50%葡萄糖注射液 85ml 和 5%葡萄糖注射液 415ml

答案：C

19. 下列哪种药对洋地黄中毒引起的快速型心律失常疗效最佳

A: 苯妥英钠

B: 普萘洛尔

C: 阿托品

D: 普鲁卡因胺

答案：A

20. 某患者，诊断为抑郁症，服用帕罗西汀 6 周，无明显效果，现考虑更换 MAOIs 类药物，必须先停用帕罗西汀

A: 5 天

B: 2 周

C: 3 天

D: 1 周

答案：B

21. 与头孢曲松钠注射液混合可产生肉眼难以观测到的白色细微沉淀的注射液是

A: 葡萄糖注射液

B: 乳酸钠林格注射液

C: 氯化钠注射液

D: 葡萄糖氯化钠注射液

答案：B

22. 患者，男性，30 岁，确诊为支气管哮喘，入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生嘱咐了一些用药注意事项。

- A: 钙通道阻滞剂
- B: 抗胆碱能药物
- C: B 受体阻断剂
- D: B 受体激动剂

答案：C

23. 已知 1%(g/mL) 枸橼酸钠溶液的冰点降低值为 0.185°C ，计算其等渗溶液的浓度是()。

- A: 2.61(%, g/mL)
- B: 2.81(%, g/mL)
- C: 3.11(%, g/mL)
- D: 2.91(%, g/mL)

答案：B

24. 治疗胃食管反流病，雷尼替丁的正确服药时间是

- A: 症状发作时、餐后 1.5h 和睡前
- B: 餐后、睡前
- C: 三餐前 30min
- D: 早餐前 30min

答案：B

25. 下列药物中属于弱阿片类药物的为 ()

- A: 可待因
- B: 哌替啶
- C: 吗啡
- D: 羟考酮

答案：A

26. 下列药物中，药师需要提示患者随身携带的是

- A: 硝酸甘油片
- B: 胰酶肠溶胶囊
- C: 高锰酸钾片
- D: 甲硝唑片

答案：A

27. 将药物治疗成本和所产生的效益规划为以货币为单位的数字，进行药物经济学评价。这一评价方法属于()

- A: 最小成本分析
- B: 成本-效益分析
- C: 成本-效用分析
- D: 成本-效果分析

答案：B

28. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，P108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 慢性支气管炎急性发作
- B: 支气管哮喘
- C: 急性左心衰竭
- D: 肺动脉栓塞

答案：C

29. 咳嗽较弱者宜选用的药物是

- A: 喷托维林
- B: 苯丙哌林

C: 氨溴索

D: 右美沙芬

答案: A

30. 不可震荡的是

A: 甘露醇注射剂

B: 重组人促红素

C: 乙醚

D: 降钙鼻喷雾剂

答案: B

31. 在药学信息服务中，三级信息源资料的最突出的优势是

A: 能看到研究细节如试验设计、数据处理等

B: 内容广泛、使用方便

C: 内容全面、细致

D: 提供的信息丰富、详实

答案: B

32. 怕热的药品

A: 根据不同性质要求，分别存放在阴凉处、凉暗处或冷处

B: 用棕色或黑色纸包裹的玻璃器包装

C: 可用玻璃瓶软木塞塞紧、蜡封、外加螺旋盖盖紧

D: 可贮存于严密的药箱内

答案: A

33. 巩固期隔日用药、初治短程化疗方案是

A: 2S(E)HR2/4HR

B: 1HS/11H2S2

C: 2HSP (E) /10HP (E)

D: 2S (E)HR2/4H3R3

答案：D

34. (2019 年真题) 下列通用名与别名的组合中，不是同一种药品的是

A: 桂利嗪与脑益嗪

B: 利可君与利血生

C: 醋酸氯己定与洗必泰

D: 氨甲苯酸与止血敏

答案：D

35. 对痛风急性发作者不宜服用，以防发生转移性痛风的是

A: 秋水仙碱

B: 泼尼松

C: 苯溴马隆

D: 别嘌醇

答案：C

36. 患者，男，45 岁，因消化不良（上腹饱胀，餐后明显）来药店咨询。下列说法错误的是（）

A: 可用助消化药对症治疗

B: 应除外器质性疾病

C: Hp 感染是引起消化不良的常见原因

D: 进餐时不要摄入过多的液体

答案：C

37. 美金刚的作用机制为（）

A: 抑制 N-甲基天冬氨酸受体

- B: 脑循环改善剂
- C: 钙通道阻滞剂
- D: 抑制胆碱酯酶

答案：A

38. 患者男,34 岁因糖尿病酮症酸中毒入院,需静脉给予胰岛素或胰岛素类似物,应选用的药物是 ()

- A: 低精蛋白锌胰岛素
- B: 普通胰岛素
- C: 精蛋白锌胰岛素
- D: 门冬胰岛素

答案：B

39. 临床实践验证,一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此,在进行排出毒物的同时,应积极使用特效的拮抗剂。

- A: 维生素 K
- B: 乙酰胺
- C: 维生素 B
- D: 阿托品

答案：A

40. 下列关于药物对孕妇的影响哪一项是错误的

- A: 受精后 3 周~3 个月接触药物最易发生先天畸形
- B: 孕妇不应过量服用含咖啡因的饮料
- C: 孕妇患有结核、糖尿病应绝对避免药物治疗以防止胎儿畸形
- D: 受精后的半个月几乎见不到药物的致畸作用

答案：C

41. 患者，男，36 岁。临床诊断“大三阳”，其临床意义是

- A: HBsAg 阳性
- B: HBeAg 阳性
- C: HBsAg、HBeAg 和 HBcAb 同为阳性
- D: HBsAg、HBeAb 和 HBcAb 同为阳性

答案：C

42. 右心衰竭最常见的症状是

- A: 劳力性呼吸困难
- B: 端坐呼吸
- C: 腹胀、食欲不振、恶心、呕吐
- D: 夜间阵发性呼吸困难

答案：C

43. 复方樟脑酊中毒时，宜首选的特殊解毒剂为

- A: 碳酸氢钠
- B: 纳洛酮
- C: 硫酸铜
- D: 氟马西尼

答案：B

44. 患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

- A: 美托洛尔会影响阿司匹林的抗血小板活性，应停用
- B: 同时使用双氯芬酸钠与阿司匹林会增加消化道出血风险，两药不宜合用
- C: 如大便次数规律（如每日 1 次），聚乙二醇 4000 散可按需使用

D: 阿托伐他汀钙用于冠心病的治疗，需长期规律用药

答案：A

45. 一般含服 5 分钟左右；用药后 30 分钟内不宜吃东西或饮水的是

A: 含漱剂

B: 阴道栓剂

C: 咀嚼片

D: 舌下片

答案：D

46. 可用于治疗夜盲症的药物是

A: 维生素

B: 复合维生素 B

C: 维生素 A

D: 维生素 C

答案：C

47. 患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

A: 利伐沙班

B: 肝素

C: 氯吡格雷

D: 阿司匹林

答案：D

48. 从事药学服务的药师应具备沟通能力，此项要求的重要性不包括

A: 是药师实施药学服务的基本技能

- B: 可杜绝投诉事件
- C: 可提高患者用药的依从性和满意度
- D: 可使患者获得有关的用药指导

答案：B

49. 以下对单纯疱疹的描述错误的是（）

- A: HSV 主要存在于感染者的疱疹液、唾液及粪便中
- B: 人与动物为 HSV 的主要自然宿主
- C: 分为 HSV- I 型和 HSV- II 型两个血清型
- D: HSV 是双股 DNA 病毒

答案：B

50. 急诊处方印刷用纸的颜色是

- A: 淡黄色
- B: 淡绿色
- C: 淡蓝色
- D: 淡红色

答案：A

51. 属于整合酶抑制剂(II)进入抑制剂的是

- A: 奈韦拉平
- B: 沙奎那韦
- C: 扎西他滨
- D: 恩夫韦替

答案：D

52. 患者，男，12 岁，因纳差、恶心、呕吐、腹泻就诊，主诉里急后重，每小时排便 3~4 次，水样便，初步诊断为急性感染性腹泻，处方如下：

- A: 存在重复用药
- B: 存在适应证不适宜用药
- C: 存在给药时间不合理
- D: 存在禁忌人群用药

答案：D

53. 患者，男，57 岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊，经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为 H1N1 甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是（）

- A: 金刚乙胺
- B: 金刚烷胺
- C: 利巴韦林
- D: 奥司他韦

答案：D

54. 皮肤接触腐蚀性毒物，须用中和液或解毒液冲洗，且冲洗的时间要达

- A: 15~30min
- B: 5~10min
- C: 20~30min
- D: 10~20min

答案：A

55. (2018 年真题) 患者, 女, 45 岁, 6 个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁, 在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗, 症状控制较好, 近 3 个月服用西咪替丁, 患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱, 该患者各地求医, 服用各种药物, 具体药物品种不详。围绕该病例, 医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

- A: 卡马西平
- B: 丙戊酸钠
- C: 苯巴比妥
- D: 地西泮

答案: B

56. 两种药物配伍之后效价降低的是()

- A: 头孢唑林钠与 0.9%氯化钠注射液
- B: 青霉素与 5%葡萄糖注射液
- C: 胰岛素与 0.9%氯化钠注射液
- D: 头孢曲松与复方氯化钠注射液

答案: B

57. 下列五种内服药品中, 应在餐前服用的药物是

- A: 胶体果胶铋胶囊
- B: 吡罗昔康片
- C: 氨茶碱片
- D: 呋塞米片

答案: A

58. IV 级临床研究的结论或 II、III 级临床研究的推论属于

- A: C 级
- B: B 级

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: E 级

D: D 级

答案：A

59. 血栓的发生率增加的指标是

- A: $INR < 3$
- B: $INR > 5$
- C: $INR > 3$
- D: $INR < 1.5$

答案：D

60. (2019 年真题) 患儿，男，2 岁，误服水银后，应选用的洗胃液是

- A: 1:5000 高锰酸钾溶液
- B: 淀粉溶液
- C: 牛奶与水等量混合
- D: 鸡蛋清

答案：D

61. 易风化的药物是()。

- A: 胃蛋白酶
- B: 硝酸甘油
- C: 硫酸镁
- D: 青霉素

答案：C

62. 核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂 ()

- A: PIs
- B: NRTIs
- C: FIs
- D: NNRTIs

答案：B

63. 乙醇、对乙酰氨基酚等血浆药物浓度升高，地西泮、利多卡因分布容积增大、消除缓慢，是由于

- A: 胆汁分泌缺乏
- B: 肝药酶活性的个体化差异影响大于年龄的增长
- C: 脂肪组织随年龄增长而增加，血浆白蛋白浓度降低
- D: 肾功能随年龄增长而减退

答案：C

64. 具有肾毒性，需要大量输注时，需同时给予利尿药的是

- A: 多柔比星
- B: 顺铂
- C: 紫杉醇
- D: 氨氯地平

答案：B

65. 下列哪种药品的别名是“心得安”

- A: 阿替洛尔
- B: 硝酸异山梨酯
- C: 普萘洛尔
- D: 甲氧氯普胺

答案：C

66. 易经乳汁分泌药物的特性是

- A: 分子量大
- B: 脂溶性高
- C: 弱酸性

D: 蛋白结合率高

答案：B

67. 肿瘤患者在化疗后出现焦虑，可对症给予

A: 劳拉西泮

B: 苯海拉明—利多卡因—氢氧化镁铝

C: 吗啡

D: 醋酸甲地孕酮—地塞米松

答案：A

68. 与胆酸螯合剂合用，应提前至少 2h 服用的是

A: 依曲康唑

B: 依折麦布

C: 螺内酯

D: 他汀类与烟酸联用

答案：B

69. 一旦误服中毒，必须用硫酸镁洗胃的是

A: 急性汞中毒

B: 香豆素类杀鼠药

C: 急性铅中毒

D: 磷化锌等杀鼠药

答案：C

70. 抗癫痫药应从小剂量起始给药，滴定增量，长期规律用药。成年癫痫患者药物治疗时

A: 苯妥英钠

B: 拉莫三嗪

C: 丙戊酸钠

D: 卡马西平

答案: B

71. 核苷酸类逆转录酶抑制剂

A: 依非韦伦

B: 齐多夫定

C: 利巴韦林

D: 利托那韦

答案: B

72. 患者，女，58 岁，因慢性阻塞性肺疾病住院 1 个月，近 5 天来出现高热、咳痰，伴呼吸困难。实验室检查血肌酐及尿素氮值正常，白细胞计数为 $12 \times 10^9/L$

A: 克林霉素

B: 头孢唑林

C: 甲氧西林

D: 万古霉素

答案: D

73. 分析以下用药错误的事例，属于"认知缺失"的是

A: 患者自行选购药品、误用假药、劣药

B: 调剂工作过于繁忙

C: 新手值班以及计算机医嘱系统缺陷

D: 医师非主观意愿的诊断错误、造成误诊误治

答案: D

74. 骨性关节炎伴轻-中度疼痛患者通常首选的药物是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 氨基葡萄糖
- C: 透明质酸钠
- D: 布洛芬

答案：A

75. 对混合型血脂异常，必须联用他汀类和贝特类，最佳的给药方案是

- A: 早晨用他汀类，晚上用贝特类
- B: 晚上联合服用他汀类和贝特类
- C: 早晨用贝特类，晚上用他汀类
- D: 早晚联合服用他汀类和贝特类

答案：C

76. 据统计，全国高血压患者已经超过 2 亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病，而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有用药物治疗，接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅三成左右。高血压死亡率不断升高。熟悉高血压及相关用药，对更有效地治疗高血压非常重要。

- A: 硝普钠静滴
- B: 哌唑嗪口服
- C: 卡托普利口服
- D: 硝苯地平口服

答案：A

77. 通过与肠黏膜接触，刺激肠壁的感受神经末梢，引起肠反射性蠕动增强而排出柔软成形粪便的药物是

- A: 硫酸镁
- B: 比沙可啶

C: 甘油栓

D: 乳果糖

答案: B

78. 即在体内有抗凝作用，又在体外有抗凝作用的药物是

A: 噻氯匹定

B: 尿激酶

C: 肝素

D: 华法林

答案: C

79. 下列药源性疾病中，其诱因主要是“基础疾病因素”的是

A: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病

B: 新生儿体内蓄积氯霉素呈现灰婴综合征

C: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强

D: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

答案: A

80. 属于治疗沙眼的处方药的是

A: 硫酸铜棒

B: 红霉素眼膏

C: 磺胺醋酰钠滴眼剂

D: 硫酸锌滴眼剂

答案: A

81. 一般给予肠外营养的热氮比为

A: NPC5: 5

B: 150kcal: 1gN

C: NPC7:3

D: 100kcal:1gN

答案: B

82. 患者，女，57 岁，最近因失眠来门诊就医。经医生咨询，患者反映以前没有过失眠现象，近期因工作原因导致压力加大，心理负担过重，白天想睡觉，晚上却无法入睡，每天睡眠不足 5h。医生给予患者建议平时要注意多增加运动，缓解压力，并开具了如下处方：地西泮片：5mg×20 / 5mgqd

A: 坚持每晚服用 1 片

B: 每周给药 2~3 次

C: 要防止晨起跌倒

D: 服药后第二天上班禁止开车

答案: A

83. 下列不属于药物警戒工作范畴的是

A: 发现药物不良反应

B: 发现药物相互作用

C: 药品致死率估计

D: 指导制定临床治疗方案

答案: D

84. 妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常，其中最易受到药物影响，可能产生形态或者功能上异常而造成胎儿畸形的阶段是：

A: 妊娠 13~27 周

B: 妊娠 3~12 周

C: 妊娠 27~32 周

D: 妊娠 1~2 周

答案：B

85. 可分泌到乳汁中引起新生儿黄疸的药物是()

- A: 复方磺胺甲噁唑
- B: 诺氟沙星
- C: 头孢克洛
- D: 阿莫西林

答案：A

86. (儿童用药特点) 针对儿童最方便、最安全、最经济的给药途径

- A: 皮下注射
- B: 口服给药
- C: 静脉给药
- D: 局部给药

答案：B

87. 美国食品药品监督管理局(FDA)根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 红霉素
- B: 奥美拉唑
- C: 卡马西平
- D: 氯化钾

答案：A

88. 以下对各类处方的描述中，不正确的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 第二类精神药品处方印刷用纸为白色，右上角标注“精二”

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/225324210114012033>