

福建省松溪县内部使用《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题完整版附答案下载

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2021 年真题）患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 加巴喷丁胶囊
- B: 双氯芬酸钠缓释片
- C: 吗啡控释片
- D: 颠茄片

答案：B

2. 服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

- A: 餐后
- B: 餐前 0.5~1 小时
- C: 餐前
- D: 餐后 1 小时

答案：B

3. 患者，男，48 岁，近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状，就诊后测定血压 160 / 100mmHg。

- A: β 受体阻断药
- B: ACEI
- C: AR

D: 钙通道阻滞药

答案：B

4. 维生素 E 用于

A: 防治佝偻病

B: 防治坏血病

C: 习惯性流产的辅助治疗

D: 防治夜盲症

答案：C

5. 非甾体类抗炎药引起的典型药源性疾病是

A: 血液系统疾病

B: 神经系统疾病

C: 胃肠道反应

D: 肌病

答案：C

6. 患者，男性，80 岁，患有帕金森病伴闭角型青光眼，近 2 个月出现尿频、尿急、夜尿增多，无法控制。诊断为急迫性尿失禁，给予米拉贝隆治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

A: 鼻咽炎和尿路感染

B: 卧位和坐位时高血压

C: 直立性低血压

D: 口干、便秘、尿潴留

答案：A

7. 有关血红蛋白的叙述正确的是

A: 血红蛋白常被称为"血色素"，是组成血液的主要成分

- B: 血红蛋白减少是诊断贫血的重要指标，并能确定贫血的类型
- C: 缺铁性贫血时红细胞计数的减少程度较血红蛋白的减少程度明显
- D: 血红蛋白承担着机体向器官组织运输氧气和运出二氧化碳的功能

答案：D

8. 可了解工作效果、并为之后工作的进一步完善的是

- A: 对查阅的资料进行评价、分析和整理
- B: 随访了解效果，并建立档案
- C: 对问题进行确定并归类
- D: 形成答案并以口头形式提供给询问者

答案：B

9. 若空腹服药，则胃排空较快，药物在短时间内可进入十二指肠与小肠。餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃黏膜的刺激。因此，许多药品适宜餐后服用。

- A: 清晨服用
- B: 餐中服用
- C: 餐后服用
- D: 餐前服用

答案：B

10. 患者，男，72 岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入沙丁胺醇气雾剂 100 μ g prn 吸入，氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg prn 舌下含服治疗。

- A: 普萘洛尔
- B: 非洛地平
- C: 缬沙坦

D: 维拉帕米

答案: C

11. 对过敏性结膜炎宜选用 ()

A: 醋酸氢化可的松

B: 0.1%利巴韦林

C: 阿昔洛韦

D: 0.1%羟苄唑

答案: A

12. 可减轻鼻窦、鼻腔黏膜血管充血，解除鼻塞症状，有助于保持咽鼓管和窦口通畅的鼻黏膜血管收缩药是

A: 颠茄浸膏片

B: 菠萝蛋白酶

C: 伪麻黄碱

D: 阿司匹林

答案: C

13. 治疗轻症、慢性疾病用药持久，最适宜选用的给药途径是

A: 直肠给药

B: 口服给药

C: 舌下含服

D: 吸入给药

答案: B

14. 血栓性疾病患者实施抗凝治疗，应该控制国际标准化比值为

A: 0.8~1.5

B: 2

C: >1.5

D: <0.8

答案: A

15. 治疗干眼症人工泪液合理的起始应用剂量是每只眼

A: 一滴，一日 4 次

B: 二滴，一日 4 次

C: 一滴，一日 2 次

D: 三滴，一日 4 次

答案: A

16. 受精后半个月以内

A: 可产生形态或功能的异常而造成畸形

B: 中枢神经系统发育迟缓

C: 几乎见不到药物的致畸作用

D: 女性生殖系统发育迟缓

答案: C

17. 恶性肿瘤

A: 红细胞沉降率减慢

B: 淋巴细胞增多

C: 血小板增多

D: 白细胞增多

答案: D

18. 高血压治疗药物选择噻嗪类利尿剂慎用于()

A: 心力衰竭患者

B: 痛风患者

C: 胃溃疡患者

D: 双侧肾动脉狭窄患者

答案: B

19. 一般高血压患者服用降压药，建议控制在

A: <130 / 80mmHg

B: <140 / 90mmHg

C: <140 / 80mmHg

D: <120 / 80mmHg

答案: B

20. 细菌性尿路感染最常见的致病菌是()

A: 肠球菌

B: 大肠埃希菌

C: 克雷伯杆菌

D: 铜绿假单胞菌

答案: B

21. 患混合型高脂血症，治疗时可与 ω -3 脂肪酸制剂联合应用的调脂药是

A: 氯贝丁酯

B: 依折麦布

C: 烟酸类

D: 辛伐他汀

答案: D

22. 不能发现"长时间应用才能发生或停药后迟发"的药品不良反应，缘于

- A: 管理漏洞
- B: 考察不全面
- C: 观察时间短
- D: 病例数目少

答案：C

23. 成人空腹血糖正常参考区间是

- A: 3.7~6.1mmol / L
- B: 3.3~5.5mmol / L
- C: 3.5~6.1mmol / L
- D: 3.9~6.1mmol / L

答案：D

24. 将药物治疗成本和所产生的效益归化为以货币为单位的数字，从而进行药物经济学评价，这一评价方法属于

- A: 成本-效用分析
- B: 成本-效果分析
- C: 最小成本分析
- D: 成本-效益分析

答案：D

25. 患儿，女，4岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 鞣酸蛋白?
- B: 洛哌丁胺?
- C: 药用炭?
- D: 小檗碱?

答案: B

26. 人体健康参数: 肥胖的腰围标准是

- A: 男性>90cm, 女性>80cm
- B: 男性>85cm, 女性>80cm
- C: 男性>90cm, 女性>85cm
- D: 男>95cm, 女性>85cm

答案: D

27. 融合抑制剂

- A: 齐多夫定
- B: 利巴韦林
- C: 依非韦伦
- D: 利托那韦

答案: B

28. 导致血糖异常、糖尿病的是

- A: 阿托伐他汀
- B: 己烯雌酚
- C: 罗非昔布
- D: 加替沙星

答案: D

29. 患者，女，52 岁，患骨质疏松症伴静脉血栓，该患者避免使用的治疗药是

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 特立帕肽
- C: 雷洛昔芬
- D: 鲑鱼降钙素

答案：C

30. 药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂，遇到 ADR 时，需要进行因果关系评价。患者，男，32 岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒。立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再给阿莫西林胶囊治疗，该 ADR 的因果关系评价结果是()

- A: 可能
- B: 可能无关
- C: 很可能
- D: 肯定

答案：C

31. 须在凉暗处保存的常用药品是

- A: 硫酸阿托品
- B: 双歧三联活菌制剂
- C: 复方甘草合剂
- D: 多巴胺

答案：C

32. 非糜烂性胃食管反流病的抑酸治疗疗程是

- A: 4 周
- B: 3 周

C: 2 周

D: 6 周

答案：A

33. 能够给予当即解答的就当即解答

A: 特别关注特殊人群

B: 解释的技巧

C: 保护患者的隐私

D: 及时回答不拖延

答案：D

34. 及时发现并确定“亮菌甲素事件”显示药物警戒的作用是

A: 药品上市前风险评估

B: 药品上市后风险评估

C: 发现与规避假、劣药品流入市场

D: 发现药品质量问题

答案：C

35. 孕妇的急性膀胱炎治疗时间为（）

A: 3-7 天

B: 5-10 天

C: 10-15 天

D: 8-10 天

答案：A

36. 成本-效果分析

A: 治疗结果采用临床指标表示，如治愈率

B: 成本和治疗结果均用货币表示

C: 是成本-效果分析的一种特例

D: 药物利用指数(DUI)

答案: A

37. 支气管哮喘急性发作期(轻度)可选用的药物是

A: 沙丁胺醇

B: 异丙托溴铵

C: 倍氯米松

D: 沙美特罗+氟替卡松

答案: A

38. 患儿，男，5个月，体重9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有“乒乓球”感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

A: 维生素 B12

B: 维生素 C

C: 维生素 A

D: 维生素 D

答案: D

39. 以硫酸镁治疗子痫，适宜

A: 口服给药

B: 直肠给药

C: 吸入给药

D: 肌肉注射

答案: D

40. 血常规是最常用的医学检查指标，血常规异常可提示人们罹患某些疾患荨麻疹患者常出现的血常规检查异常是

- A: 中性粒细胞增多
- B: 血小板计数增多
- C: 血红蛋白减少
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：D

41. 可以迅速缓解哮喘症状，起效快的药品是

- A: 非甾体抗炎药
- B: 吸入型糖皮质激素
- C: β -受体阻断剂
- D: 短效 β_2 -受体激动剂

答案：D

42. 患者向药师咨询停用口服避孕药后多久可备孕。下列答复中正确的是()

- A: 复方短效口服避孕药停药 6 个月后方可备孕
- B: 复方短效口服避孕药停药后即可备孕
- C: 长效避孕药停药后即可备孕
- D: 复方短效口服避孕药停药 3 个月后方可备孕

答案：B

43. 流感病毒感染使用抗菌药物

- A: 盲目联合用药
- B: 非适应证用药
- C: 过度治疗用药
- D: 超适应证用药

答案：B

44. 以下用药，属于“禁忌证用药”的是

- A: 无治疗指征盲目补钙
- B: 脂肪乳用于急性肝损伤、脂质肾病、脑卒中
- C: 黄体酮用于输尿管结石
- D: 治疗感冒、咳嗽给予抗菌药

答案：B

45. 静脉滴注青霉素的适宜溶媒是

- A: 复方氯化钠注射液
- B: 5%葡萄糖注射液
- C: 0.9%氯化钠注射液
- D: 50%葡萄糖注射液

答案：C

46. 医师无权调配处方，体现处方的

- A: 经济性
- B: 技术性
- C: 法律性
- D: 有效性

答案：C

47. 属于白三烯受体阻断剂的是

- A: 多索茶碱
- B: 曲尼司特
- C: 氨茶碱
- D: 孟鲁司特

答案：D

48. 口服给药方便、安全、经济，以下患者中，最适宜口服给药的是

- A: 吞咽困难的老年人
- B: 慢性病或轻症患者
- C: 病情危重的患者
- D: 胃肠反应大的患者

答案：B

49. 关于肿瘤疼痛控制的治疗原则，叙述不正确的是

- A: 按时给药
- B: 按需给药
- C: 按阶梯给药
- D: 提倡无创给药

答案：B

50. 属于雄激素受体拮抗剂，使增生的前列腺体积缩小的药品

- A: 氟他胺
- B: 黄酮哌酯
- C: 非那雄胺
- D: 阿夫唑嗪

答案：A

51. 发现处方存在或潜在的问题、制定并实施干预和改进措施，是

- A: 参与健康教育
- B: 药物信息服务
- C: 处方点评
- D: 处方审核

答案：C

52. 红肿较严重而起水泡，疼痛较剧烈，感觉迟钝或麻木，1~2 日后水泡吸收结痂，2~3 周后结痂脱落的为

- A: 3 度冻伤
- B: 1 度冻伤
- C: 2 度冻伤
- D: 4 度冻伤

答案：C

53. 服药期间饮酒可引起低血糖反应的是

- A: 硫酸亚铁
- B: 泼尼松
- C: 格列本脲
- D: 西咪替丁

答案：C

54. (2017 年真题) 患者, 男, 72 岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入沙丁胺醇气雾剂 100 μ g prn 吸入, 氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg prn 舌下含服治疗。

- A: 硝酸甘油剂量不足
- B: 布地奈德剂量太大
- C: 沙丁胺醇的不良反应
- D: 氨氯地平的不良反应

答案：C

55. 非那雄胺用于治疗充盈性尿失禁、前列腺增生症，其主要不良反应是

- A: 性功能减退、乳房增大
- B: 眼内压升高
- C: 体位性低血压
- D: Q-T 间期延长

答案：A

56. 患者，男，60 岁。因面部出现慢性湿疹到药店购药，药师应推荐的药品是

- A: 利巴韦林软膏
- B: 10%樟脑软膏
- C: 他克莫司软膏
- D: 特比萘芬乳膏

答案：C

57. 阻塞性黄疸可呈现

- A: 乳凝块便
- B: 鲜血便
- C: 柏油黑便
- D: 白陶土便

答案：D

58. 评价房颤患者抗凝出血风险的方法是

- A: FEV1 占预计值%
- B: CHA₂DS₂-VASc 评分
- C: HAS-BLED 评分
- D: CTP 分级

答案：C

59. 下列口腔溃疡治疗药物可降低毛细血管的通透性，减少炎症的渗出的是

- A: 维生素 C
- B: 甲硝唑含漱剂
- C: 地塞米松黏贴片
- D: 冰硼散

答案：C

60. 对于化疗药物引起的呕吐，正确的用药方法对急性或延迟性恶心呕吐发作者，可给予

- A: 羧甲司坦
- B: 阿瑞吡坦
- C: 苯海拉明
- D: 昂丹司琼

答案：B

61. 药名容易混淆的药物识别，安定 / 地西洋

- A: 抗高血压药
- B: 抗心绞痛药
- C: 退热药
- D: 抗焦虑药

答案：D

62. 禁止与单胺氧化酶抑制剂联用的药物不包括

- A: 5-HT
- B: 苯二氮

C: 三环类药物

D: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

答案：B

63. 患者，女性，25 岁，因面色苍白、头晕、乏力 1 年余，加重伴心悸 1 个月来诊。经诊断为缺铁性贫血。

A: 磺胺类及硝基呋喃类

B: 氨基糖苷类

C: 万古霉素

D: 氯霉素类

答案：A

64. 适用于年轻、震颤突出的患者

A: 恩托卡朋

B: 苯海索

C: 左旋多巴

D: 司来吉兰

答案：B

65. 归属于药历“用药记录”项下的是

A: 主要实验室检查数据

B: 医保和费用支付情况

C: 临床诊断

D: 联合用药

答案：D

66. 使用前应用青霉素进行皮试的药物是

A: 左氧氟沙星片

- B: 阿莫西林胶囊
- C: 注射用头孢曲松钠
- D: 阿奇霉素片

答案：B

67. 在应用碘解磷定时的注意事项中哪一项是错误的

- A: 对毒蕈碱样作用和防止呼吸中枢抑制的作用较差
- B: 在碱性溶液中易水解为氰化物，故忌与碱性药物配伍
- C: 用量过大、注射过快或未经稀释直接注射均可引起中毒
- D: 对有机磷农药急、慢性中毒均有效

答案：D

68. 关于三酰甘油的临床意义说法不正确的是

- A: 应用雌激素、避孕药可出现三酰甘油减少
- B: 血清三酰甘油增高可提示动脉硬化及高脂血症
- C: 大量饮酒可使三酰甘油出现假性升高
- D: 长期饥饿或食用高脂肪食品可导致三酰甘油升高

答案：A

69. 烟酸类

- A: 吉非贝齐
- B: 考来烯胺
- C: 阿昔莫司
- D: 辛伐他汀

答案：C

70. 对于形似或声似的药品要加用醒目的标识，是针对药品调配环节防范措施中的

- A: 环境整齐、安静
- B: 保证足够的人力配备
- C: 及时沟通
- D: 规范操作、坚持核对

答案：A

71. 根据循证医学证据分级，同质 RCT 的系统评价结果属于

- A: II b 类证据
- B: II a 类证据
- C: I a 类证据
- D: I b 类证据

答案：C

72. 肺结核最常见的传播方式为

- A: 呼吸道传播
- B: 垂直传播
- C: 血液传播
- D: 消化道

答案：A

73. (2016 年真题) 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 每 3-5 天调整 1 次
- B: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存
- C: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量
- D: 每次调整 1-4 单位

答案：B

74. 一级信息资料的最突出优点是

- A: 读者可以自己 对文献进行评价，免受他人观点的影响
- B: 内容广泛、使用方便
- C: 提供的信息丰富、详实
- D: 查阅时需要利用所提供的参考文献去验证

答案：A

75. (2015 年真题) 他汀类药物引起的典型药源性疾病是 ()。

- A: 神经系统疾病
- B: 血液系统疾病
- C: 胃肠类疾病
- D: 肝病

答案：D

76. 抗高血压药物属于钙通道阻滞剂的是 ()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 氨氯地平
- C: 依那普利
- D: 缬沙坦

答案：B

77. (2018 年真题) 瑞舒伐他汀钙的日剂量范围是 ()

- A: 10~20mg
- B: 5~20mg
- C: 40~200mg
- D: 10~80mg

答案：A

78. 属于妊娠 C 级毒性药品的是

- A: 氧氟沙星
- B: 辛伐他汀
- C: 水溶性维生素
- D: 青霉素、头孢哌酮一舒巴坦

答案：A

79. 红霉素易于在乳汁中出现的机制是

- A: 在母体血浆中处于结合状态
- B: 呈弱酸性
- C: 解离度大
- D: 呈弱碱性

答案：D

80. 少数人用后可出现视力降低和辨色困难

- A: 硝酸甘油
- B: 金刚烷胺
- C: 布洛芬
- D: 西咪替丁

答案：C

81. 为了避免夜间排便，泻药硫酸镁应该

- A: 睡前服用
- B: 清晨服用
- C: 餐前服用
- D: 餐后服用

答案：B

82. 某男性患者，57 岁，既往高血压病史 10 年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清，查体：BP220/120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激，左侧肢体不活动，左侧巴宾斯基征阳性。

- A: 止血
- B: 脱水
- C: 扩容
- D: 降血压

答案：B

83. 口服避孕药对机体代谢的影响，正确的为（）

- A: HDL-C 降低
- B: LDL-C 升高
- C: 三酰甘油降低
- D: 糖耐量异常

答案：D

84. 以延长患者生命时间为指标开展的药物经济学评价方法属于（）

- A: 最小成本分析
- B: 成本-效益分析
- C: 成本-效用分析
- D: 成本-效果分析

答案：D

85. 下列确诊医院获得性肺炎的最重要的依据是

- A: $WBC > 10 \times 10^9 / L$ 或 $< 4 \times 10^9 / L$
- B: 脓性气道分泌物

C: 发热 $>38^{\circ}\text{C}$

D: 肺部 X 线检查有新发或进展性浸润阴影

答案: D

86. 患者，男性，30 岁，确诊为支气管哮喘，入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生嘱咐了一些用药注意事项。

A: 特布他林气雾剂

B: 二丙酸倍氯米松气雾剂

C: 酮替酚

D: 异丙托溴铵气雾剂

答案: B

87. 杨某，女，19 岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39°C ；肺闻及湿性啰音； $\text{WBC}>13\times 10$

A: 左氧氟沙星

B: 利福霉素

C: 青霉素 G

D: 链霉素

答案: A

88. 下列关于血脂异常临床分型的叙述，不正确的是()。

A: 高胆固醇血症 TC 增高，TG 正常

B: 高三酰甘油血症主要为 TG 升高，而 TC 正常或轻度增加

C: 低高密度脂蛋白血症 TC 水平明显增高，TG 正常或偏高

D: 混合型高脂血症 TC 和 TG 均增高

答案: C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/225332130344012034>