

处方权（麻精药品、抗菌药物、抗肿瘤）授权考试

一、选择题

1.手术前预防用药目的是预防（）。[单选题]*

A、切口感染

B、手术深部器官或腔隙的感染

C、肺部感染

D、切口感染和手术深部器官或腔隙感染 ✓

2. I类切口手术术后预防用使用抗菌药物多数不超过（）。[单选题]*

A、手术后 3 天

B、术后 24 小时 ✓

C、术后 1 周

D、用至患者出院

3. MRSA 菌株是指金黄色葡萄球菌对下列哪一种抗菌药耐药。（）[单选题]*

A、甲氧西林或苯唑西林 ✓

B、万古霉素

C、利福平

D、氯霉素

4.围手术期预防性应用抗菌药物预防用药有循证医学证据的第一代头孢菌素是（）。[单选题]*

A、头孢西丁

B、头孢拉定

C、头孢呋辛

D、头孢唑啉 ✓

5.抗菌药物的选择及其合理使用是控制和治疗院内感染的关键和重要措施。不符合合理使用抗生素的原则的是。() [单选题]*

A、病毒性感染者不用

B、尽量避免皮肤粘膜局部使用抗生素

C、联合使用必须有严格指征

D、发热原因不明者若无明显感染的征象可少量应用 ✓

6.下列哪种手术宜预防性应用抗生素。() [单选题]*

A、疝修补术

B、甲状腺腺瘤摘除术

C、乳房纤维腺瘤切除术

D、开放性骨折清创内固定术 ✓

7.耐甲氧西林的葡萄球菌（MRSA ）的治疗应选用。() [单选题]*

A、青霉素

B、头孢拉定

C、头孢哌酮

D、万古霉素 ✓

8.感染患者行细菌学检查的最佳时机应是 () [单选题]*

A、应用抗菌药物之后

B、长期应用抗菌药物治疗效果不佳时

C、应用抗菌药物之前 ✓

D、以上都不对

9.关于喹诺酮类抗菌药，错误的是。（）[单选题]*

A、国内尿路感染的主要病原菌大肠埃希菌中，对喹诺酮类耐药株已达半数以上

B、不宜用于有癫痫或其他中枢神经系统基础疾病的患者

C、可能引起皮肤光敏反应，关节病变，肌腱断裂等

D、可用于治疗甲氧西林耐药的葡萄球菌 ✓

10.联合用药的目的不包括。（）[单选题]*

A、增加抗菌效果

B、增加药物剂量 ✓

C、减缓细菌耐药性

D、减少不良反应

11.胸外科手术后最常见的院内感染菌为：（）[单选题]*

A、铜绿假单胞菌感染

B、金黄色葡萄球菌 ✓

C、肠球菌属

D、凝固酶阴性葡萄球菌

12.对于头孢菌素认识错误的是。（）[单选题]*

A、治疗甲氧西林敏感葡萄球菌感染，最好选择头孢唑啉

B、随着头孢菌素代别增加，抗阴性菌活性增加

C、随着头孢菌素代别增加，抗菌谱扩宽

D、第四代头孢菌素抗阳性球菌活性最强 ✓

13.外科预防使用抗菌药物中不正确的是。（）[单选题]*

- A、手术感染将导致严重后果的外科手术需要预防应用抗菌药物
- B、术后使用抗菌药物时间不超过 48 小时
- C、大部分手术都应该预防性使用抗菌药物 ✓
- D、外科预防使用抗菌药物目的在于预防外科切口或手术污染菌感染

14. 门诊患者抗菌药物处方比例不超过（ ）。[单选题]*

- A、20% ✓
- B、25%
- C、30%
- D、40%

15. 对主要目标细菌耐药率超过____的抗菌药物，应当参照药敏试验结果选用。（）[单选题]*

- A、30%
- B、40%
- C、50% ✓
- D、75%

16. 住院患者抗菌药物使用强度应控制在（）[单选题]*

- A、每百人天 30DDD_s 以下
- B、每百人天 40DDD_s 以下 ✓
- C、每百人天 50DDD_s 以下
- D、每百人天 60DDD_s 以下

17. 对产生超广谱 β - 内酰胺酶的细菌感染的患者进行治疗时宜首选__类抗生素。（）[单选题]*

- A、碳青霉烯类 ✓
- B、氯霉素类

C、大环内酯类

D、氨基糖苷类

18. 在细菌所引起的医院内感染中，以感染在我国最常见。（）[单选题]*

A、尿路感染

B、术后伤口感染

C、肺部感染 ✓

D、皮肤感染

19. 药学专业技术人员调剂处方时必须做到（）。[单选题]*

A、三查七对

B、三查十对

C、四查七对

D、四查十对 ✓

20. 抗菌药物疗程，一般宜用至体温正常，症状消退后（）。[单选题]*

A、24-48 小时

B、48-72 小时

C、72-96 小时 ✓

D、5-7 天

21. 患者，男，65 岁，因重症肺炎入住 ICU 抗感染治疗，药物滴注过程出现全身皮肤潮红，停药 1 小时后消失，考虑与使用上述哪种药物有关（）。[单选题]*

A、氯霉素

B、青霉素

C、克拉霉素

D、阿米卡星

E、万古霉素 ✓

22. 患者，男，36 岁，临床诊断伤寒，使用药物治疗后出现骨髓抑制，首先出现网织红细胞减少，进而出现白细胞、血小板减少，考虑与使用上述哪种药物有关（）。[单选题]*

A、氯霉素 ✓

B、青霉素

C、克拉霉素

D、阿米卡星

E、万古霉素

23. 患者，男，45 岁，临床诊断丹毒，需要使用某种药物治疗，因该药物可以引起速发型的过敏性休克，用药前医生详细询问患者药物过敏史，并告诉患者用药前需要皮试，考虑与使用上述哪种药物有关（）。[单选题]*

A、氯霉素

B、青霉素 ✓

C、克拉霉素

D、阿米卡星

E、万古霉素

24. 患者，女，40 岁，二尖瓣关闭不全、房颤，长期使用华法林抗凝治疗，INR 稳定，最近因胃幽门螺杆菌感染使用相关药物治疗，用药后出现 INR 延长，考虑与使用上述哪种药物有关（）。[单选题]*

A、氯霉素

B、青霉素

C、克拉霉素 ✓

D、阿米卡星

E、万古霉素

25. 患者，女，35 岁，基础疾病重症肌无力，因肺部感染使用抗菌药物治疗，用药后出现呼吸困难，

考虑与使用上述哪种药物有关（）。[单选题]*

A、氯霉素

B、青霉素

C、克拉霉素

D、阿米卡星 ✓

E、万古霉素

26. 连续使用后易产生身体依赖性，能成瘾癖的药品是[单选题]*

A、毒性药品

B、麻醉药品 ✓

C、精神药品

D、放射性药品

E、戒毒药品

27. 毒性剧烈，治疗剂量与中毒剂量相近，使用不当会致人中毒或死亡的药品是[单选题]*

A、毒性药品 ✓

B、麻醉药品

C、精神药品

D、放射性药品

E、戒毒药品

28. 直接作用于中枢神经系统，使之兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性的药品是[单选题]*

A、毒性药品

B、麻醉药品

C、精神药品 ✓

D、放射性药品

E、戒毒药品

29. 用于临床诊断或治疗的放射性核素制剂或其标记药物 [单选题]*

A、毒性药品

B、麻醉药品

C、精神药品

D、放射性药品 ✓

E、戒毒药品

30. 控制并消除滥用阿片类药物成瘾者的急剧戒断症状与体征的治疗药品 [单选题]*

A、毒性药品

B、麻醉药品

C、精神药品

D、放射性药品

E、戒毒药品 ✓

31. 为门（急）诊患者开具麻醉药品、第一类精神药品注射剂，每张处方为（）常用量。 [单选题]*

A、一次 ✓

B、1 日

C、3 日

D、7 日

E、15 日

32.为门（急）诊患者开具麻醉药品、第一类精神药品控缓释制剂，每张处方不得超过（）常用量。[单选题]*

A、一次

B、1 日

C、3 日

D、7 日 ✓

E、15 日

33.为门（急）诊癌痛患者和中、重度慢性疼痛患者开具麻醉药品、第一类精神药品注射剂，每张处方不超过（）常用量。[单选题]*

A、一次

B、1 日

C、3 日 ✓

D、7 日

E、15 日

34.为门（急）诊癌痛患者和中、重度慢性疼痛患者开具麻醉药品、第一类精神药品控缓释制剂，每张处方不超过（）常用量。[单选题]*

A、一次

B、1 日

C、3 日

D、7 日

E、15 日 ✓

35. 第二类精神药品一般每张处方不得超过（）常用量。[单选题]*

- A、一次
- B、1 日
- C、3 日
- D、7 日 ✓
- E、15 日

36. 蒽环类抗肿瘤药物的剂量限制性毒性是（）。[单选题]*

- A、心脏毒性 ✓
- B、肾毒性
- C、肝毒性
- D、神经毒性

37. 需要采用亚叶酸钙解救的抗肿瘤药物是（）。[单选题]*

- A、多柔比星
- B、甲氨蝶呤 ✓
- C、氟尿嘧啶
- D、紫杉醇

38. 下列属于拓扑异构酶 II 抑制剂的是（）。[单选题]*

- A、伊立替康
- B、托泊替康
- C、羟基喜树碱
- D、依托泊苷 ✓

39. 伊立替康的剂量限制性毒性为（）。[单选题]*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/226002223131011101>