

2024 年海南省三沙市医疗三严三基理论考试题库及答案

医院科室：_____ 姓名：_____ 考场：_____ 考号：_____

一、选择题

1. 心壁的血液由什么动脉供给()

- A、降主动脉分支右冠状动脉
- B、主动脉弓分支左冠状动脉
- C、升主动脉分支左、右冠状动脉
- D、升主动脉分支右冠状动脉
- E、主动脉弓分支左、右冠状动脉

答案：

C

2. 医院污物的处理原则,下述哪项是错误的()

- A、防止污染扩散
- B、分类收集
- C、分别处理
- D、少量医疗垃圾可 与生活垃圾一同处理

E、尽可能采用焚烧处理

答案：

D

3. 高压氧治疗一氧化碳中毒的主要机制是()

A、血液中物理溶解氧量增加

B、血液中结合氧量增加

C、血液中血红蛋白增加

D、氧和血红蛋白的亲合力增加

E、机体的摄氧能力增强

答案：

A

4. 糖尿病控制饮食的主要目的不是()

A、纠正代谢紊乱

B、稳定血糖

C、保护胰岛功能

D、预防慢性并发症

E、控制血脂升高

答案：

E

5. 脑膜瘤血管造影的特征表现是()

A、肿瘤染色

B、静脉早显

C、颈外动脉供血

D、肿瘤血管栏栅状排列

E、血管弧形包绕移位

答案：

C

6. 杀灭细菌芽胞最有效的方法是()

A、煮沸法

B、巴氏消毒法

C、高压蒸汽灭菌法

D、紫外线照射

E、90% 乙醇消毒

答案：

C

7. 诊断消化性溃疡最可靠的方法是()

A、根据临床症状

B、测胃酸

C、钡餐

D、胃镜

E、大便隐血试验

答案：

D

8. 气管切开术后出现广泛皮下气肿,最简单的处理方法是()

A、抽吸气体

B、松解伤口缝线

C、更换气管套管

D、让其自行吸收

E、理疗

答案：

B

9. 二氧化硅尘致病力最强的是()

A、<5 微米

B、>5 微米

C、<3 微米

D、1-2 微米

E、3-4 微米

答案：

D

10. 下列哪项不是缺隙保持器的适应症

A、乳牙早失、恒牙胚牙根形成不足 1/2

B、恒牙胚牙冠上覆盖有较厚的骨组织

C、间隙缩小或有缩小趋势者

D、一侧或双侧多数乳磨牙早失,影响患儿咀嚼功能者

E、恒牙胚牙根已形成 1/2 以上者,牙冠上无骨组织覆盖者

答案：

E

11. 有关胸腔穿刺的方法,下列哪项不正确()

- A、穿刺抽液时,穿刺点取浊音明显部位,一般取肩胛线 7~9 肋间隙或腋中线 6~7 肋间
- B、穿刺抽气时,穿刺点取患侧锁骨中线第 2 肋间
- C、穿刺时应沿肋骨下缘进针
- D、抽液量每次不超过 1000 mL
- E、抽气量每次可大于 1000 mL

答案:

C

12. 关于血液净化室的医院内感染管理,下列哪项不正确()

- A、应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查
- B、工作人员定期体格检查,加强个人防护
- C、透析器、管路应一次性使用
- D、传染病病人在隔离净化室进行血液净化,专机透析
- E、急诊病人不需固定透析机

答案:

E

13. 乳果糖治疗肝性脑病的机理是()

- A、抑制肌肉产 NH

- B、抑制肠道产 NH 和对 NH 的吸收
- C、抑制肾产 NH 和促进 NH 向原尿分泌
- D、加强鸟氨酸循环,促进尿素合成
- E、以上均不是

答案:

B

14. 盆腔炎的合并症或后遗症极少见的是

- A、输卵管卵巢囊肿
- B、输卵管积水
- C、弥漫性腹膜炎
- D、输卵管妊娠
- E、粘连性子宫后屈

答案:

C

15. 以下肿瘤中具有恶性倾向的是()

- A、牙龈瘤
- B、血管瘤

C、淋巴管瘤

D、乳头状瘤

E、纤维瘤

答案：

E

16．动脉血压升高可导致()

A、心房收缩期延长

B、心室舒张期延长

C、心室射血相延长

D、等容收缩相延长

E、心室收缩期延长

答案：

D

17．斯氏并殖吸虫所致的皮下包块病理学检查可见

A、嗜酸性肉芽肿

B、虫卵

C、尾蚴

D、夏科-雷登晶体

E、成虫

答案：

A

18. 下列有关新生儿肠肝循环特点的叙述,正确的是

A、新生儿肠道内没有建立正常菌群

B、肠道内的未结合胆红素不能被还原成尿胆原、粪胆原

C、新生儿肠道内 β -葡萄糖醛酸酶活性高

D、未结合胆红素可经肠黏膜吸收经门静脉到达肝脏

E、以上说法都正确

答案：

E

19. 尿干化学分析仪检查白细胞和红细胞与显微镜检查白细胞和红细胞的关系()

A、都有对应关系

B、都无对应关系

C、只白细胞有对应关系

D、只红细胞有对应关系

、尿液混浊时才有对应关系

B

20. 上颌窦穿刺若疑发生气栓,应使患者取()

A、头低位和左侧卧位

B、头低位和右侧卧位

C、头低位和平卧位

D、平卧位

E、左侧卧位

答案:

A

21. 细菌性痢疾通常属于哪类炎症()

A、纤维素性炎症

B、化脓性炎症

C、卡他性炎症

D、浆液性炎症

E、出血性炎症

A

22. 休克期血中儿茶酚胺的含量()

A、高于正常

B、低于正常

C、近于正常

D、可高可低

E、以上均可

答案：

A

23. 关于咽丛描述正确的是

A、位于咽后壁外膜层内

B、位于咽侧壁

C、位于鼻咽顶部

D、位于喉咽下部

E、位于咽前壁

答案：

24. 隐孢子虫病的主要传播途径是

- A、性传播
- B、胎盘传播
- C、呼吸道传播
- D、消化道传播
- E、注射传播

D

25. 儿童病人长期应用抗癫痫药苯妥英钠时,易发生的不良反应是()

- A、嗜睡
- B、软骨病
- C、心动过速
- D、过敏
- E、记忆力减退

答案:

B

· 下列穿刺部位,哪项不正确()

- A、股静脉穿刺点在腹股沟韧带下方紧靠股动脉外侧 0.5 cm 处
- B、颈内静脉穿刺在颈部中段,颈总动脉外侧刺入
- C、颈内静脉穿刺,在胸锁乳突肌锁骨头、胸骨头与锁骨形成的三角区顶部刺入
- D、锁骨下静脉穿刺,在右锁骨下缘中点或内中 1/3 或外、中 1/3 交界处刺入
- E、动脉穿刺常选用股动脉、肱动脉或桡动脉

A

27. 中心性发绀常具有下列哪项特点()

- A、常出现在肢体末梢
- B、伴有皮肤温度降低
- C、见于右心衰时
- D、见于发绀型先天性心脏病时
- E、见于严重休克时

答案:

D

28. 麻醉中发生呼吸道梗阻的原因中下列哪项不正确()

、舌后坠

B、呼吸道异物

C、气管受压

D、喉痉挛

E、麻醉药产生的呼吸抑制

E

29. 下述哪项属特异性感染()

A、金黄色葡萄球菌感染

B、变形杆菌感染

C、铜绿假单胞菌感染

D、链球菌感染

E、假丝酵母菌病

答案:

E

30. 显示组织及细胞内多肽和蛋白的最佳方法是: ()

A、免疫细胞化学术

、同位素示踪术

C、PAS 反应

D、Feulgen 反应

E、H-E 染色

A

31. 手部开放性损伤争取清创时间是()

A、2~4 小时

B、4~6 小时

C、6~8 小时

D、8~10 小时

E、10~12 小时

答案:

C

32. 早产女婴,4天,因不吃不哭、下肢硬肿2天而于1月24日来院急诊。生后食少,仅喂以糖水及少量母乳。体格检查:体温不升,反应低下,双下肢硬肿,皮肤呈暗红色。有关发病机制,下列哪项不符()

- A、新生儿皮下饱和脂肪酸含量较多
- B、新生儿体温调节中枢不够完善
- C、早产儿棕色脂肪含量多,产热储备能力差
- D、摄食不足,机体产热少
- E、天气寒冷,致皮下脂肪凝固

答案:

C

33. 高钾血症时心电图的特点是()

- A、T波高尖,QRS波群增宽
- B、T波低平,QT间期缩短
- C、T波低平,QT间期延长
- D、T波正常,QT间期延长
- E、T波低平,出现U波

答案:

A

34. 与建的动力平衡无关的为

- A、向前的动力

B、向后的动力

C、左右的动力

D、上下的动力

E、内外的动力

答案：

C

35. 重度子痫前期患者,血压 210/120mmHg, 首先的降压药是()

A、甲基多巴

B、卡托普利

C、肼屈嗪

D、甲基多巴

E、降压灵

答案：

C

36. 轮状病毒肠炎发病机理是()

A、通过 cAMP 的作用使肠液中 Na^+ , Cl^- 水分泌明显增加

B、病毒颗粒侵入肠粘膜,引起广泛的充血,水肿炎症细胞浸润

- C、致使病变肠粘膜双糖酶活性明显减低
- D、通过 cGMP 的作用,使小肠分泌增加,导致水样腹泻
- E、抑制小肠上皮细胞对钠的转运

答案:

C

37. 吗啡的呼吸抑制作用是因为()

- A、激动丘脑内侧的阿片受体
- B、降低呼吸中枢对血液二氧化碳张力的敏感性
- C、激动中枢盖前核的阿片受体
- D、激动脑干的阿片受体
- E、激动蓝斑核的阿片受体

答案:

B

38. 描述一组偏态分布资料的平均水平,以下列哪个指标较好()

- A、算术均数
- B、几何均数
- C、百分位数

D、四分位数间距

E、中位数

答案：

E

39. 天然牛奶中缺乏哪种营养素()

A、优质蛋白质

B、钾

C、铁

D、钙

E、乳糖

答案：

C

40. 神经细胞静息电位的形成是由于:()

A、K 平衡电位

B、K 外流及 Na 内流

C、K 外流及 Cl 外流

D、Na 内流及 Cl 内流

E、Na 内流及 K 内流

答案：

A

41. 下述体表肿瘤中哪一种是真性肿瘤()

A、皮脂囊肿

B、腱鞘囊肿

C、皮样囊肿

D、表皮样囊肿

E、滑膜囊肿

答案：

C

42. 治疗耐青霉素 G 的金黄色葡萄球菌败血症,可首选()

A、苯唑西林

B、氨苄西林

C、羧苄西林

D、氯唑西林

E、红霉素

答案：

A

43. 冠内固位形不包括()

A、鸠尾形

B、沟形

C、针形

D、箱状形

E、片切型

答案：

E

44. 年龄相关性白内障与核硬化的不同是()

A、屈光度增加

B、晶状体核密度增加

C、视力下降

D、晶状体透明度降低

E、晶状体颜色加深

答案：

C

45. 下列有关维生素 K 临床应用的叙述中,哪一条是错误的()

- A、任何一种维生素 K 都可用于防止由于维生素 K 缺乏而引起的出血症
- B、中国药典只收载了维生素 K₁,但维生素 K₃和维生素 K 也是临床常用止血药
- C、维生素 K 可用于肌肉注射或缓慢静脉滴注
- D、本类药物是止血药,凡与此目的不符的应用应认为是不合理用药
- E、肌肉注射维生素 K 比口服效果好

答案:

D

46. 一侧瞳孔直接对光反应消失,间接光反应存在,病变在()

- A、同侧动眼神经
- B、对侧动眼神经
- C、同侧视神经
- D、对侧视神经
- E、视交叉

答案:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/226030212150010230>