

主治医师考试《全科》训练试卷含答案

一、单项选择题（共 130 题，每题 1 分）。

1、隐血试验阳性见于下列疾病，但除外

- A、溃疡性结肠炎
- B、钩虫病
- C、结肠息肉
- D、胃出血
- E、黏液性肠炎

【参考答案】：E

2、下列哪种成人白血病经系统治疗后预后最好

- A、急性 T 淋巴细胞白血病
- B、急性非淋巴细胞白血病 M3
- C、慢性粒细胞白血病
- D、除 M3 外的急性非淋巴细胞白血病
- E、急性 B 淋巴细胞白血病

【参考答案】：B

3、上消化道出血部位一般是指

- A、食管
- B、贲门
- C、幽门
- D、十二指肠球部
- E、屈氏韧带以上的消化器官

【参考答案】：E

4、一建筑工地因野蛮施工使煤气管破裂，煤气外溢，致使多名工人及附近居民中毒。其中昏迷者被送到医院。此时最有效的抢救措施是

- A、鼻导管吸氧
- B、20%甘露醇快速静脉滴入
- C、亚冬眠治疗
- D、血液透析
- E、高压氧舱治疗

【参考答案】：E

5、原发性头痛是指

- A、丛集性头痛
- B、脑膜炎头痛
- C、脑出血头痛
- D、肿瘤性头痛
- E、低颅压性头痛

【参考答案】：A

6、在腰腿痛患者中，出现哪项症状时，应考虑腰椎管狭窄症

- A、腰腿痛症状发作剧烈
- B、出现大小便异常
- C、马鞍区感觉异常
- D、踝反射消失、踝阵挛出现
- E、行走一段路程后，出现腰腿痛，需休息片刻后，方可继续行走

【参考答案】：E

7、女，42岁，心尖区闻及舒张期局限性隆隆样杂音，肝大，下肢水肿。化验：肝功正常，尿蛋白(+)，血清白蛋白 30g / L。该病人水肿是

- A、肝性水肿
- B、肾性水肿
- C、营养不良性水肿
- D、心性水肿
- E、下腔静脉阻塞

【参考答案】：D

8、女，21岁，医学院学生，近1周来睡眠不足。上午在参观手术时自觉胸闷、乏力，继而出现精力不集中、颜面苍白、出冷汗跌倒伴意识不清数秒。此后检查血压、脉搏、心脏听诊、神经系统检查、胸部X线、心电图等未见明显异常。既往中学2年级时类似发作1次。其可能的诊断

- A、特发性直立性低血压
- B、血管神经性晕厥
- C、脑缺氧发作
- D、一过性脑缺血发作
- E、脑血管畸形

【参考答案】：B

9、女，22岁，乳房内有多个分界不清的结节，月经来潮时疼痛，月经后缓解，提示

- A、乳腺增生病
- B、急性乳腺炎
- C、乳腺癌

D、乳管内乳头状瘤

E、乳腺纤维腺瘤

【参考答案】：A

10、脑栓塞最常发生在

A、大脑前动脉

B、前交通动脉

C、椎动脉

D、基底动脉

E、大脑中动脉

【参考答案】：E

11、男性，40岁，胃溃疡史6年，半年来加重，尤以进食后明显，近2天来呕血2次，排黑便4次，不宜选择的治疗是

A、口服去甲肾上腺素止血

B、三腔双囊管压迫止血

C、输血补液

D、禁食

E、肌注立止血

【参考答案】：B

12、X线钡餐检查发现胃溃疡，下列提示恶变的可能为

A、多发性胃溃疡

B、溃疡位于胃窦

C、溃疡位于胃小弯

D、溃疡位于胃大弯

E、溃疡龛影直径>2.5cm

【参考答案】：C

13、传染病基本特征是下列哪项

A、有传染性、传播途径和免疫性

B、有病原体、传染性、免疫性及流行性

C、有病原体、传染性、流行性、地方性、季节性、免疫性

D、有病原体，免疫性与传染性

E、有传染性、流行性、地方性、季节性和易发性

【参考答案】：B

14、编制家系图时，其基本设计应为

A、含三代或三代以上

B、在家系图上应标明家庭中出现的各种压力事件和发生时间

C、子女应按年龄大小一次从左向右排列

D、夫妻应男在左、女在右，并标明婚姻状况

E、包括以上全部内容

【参考答案】：E

15、用前鼻镜检查鼻腔，病人头前倾后仰的3个位置是

A、 0° 、 30° 、 60°

B、头稍低、 30° 、 60°

C、 30° 、 60° 、 90°

D、 0° 、 45° 、 90°

E、上述都不是

【参考答案】：B

16、下述哪种疾病不易引起继发性肾病综合征

- A、糖尿病
- B、过敏性紫癜
- C、多发性骨髓瘤
- D、SLE
- E、类风湿关节炎

【参考答案】：E

17、5 岁儿童，生后即在颈部正中长一肿物，居舌骨与甲状腺之间，圆形、光滑、逐年长达 2cm，伸舌时可上下活动，临床考虑

- A、腮裂囊肿
- B、囊性水肿
- C、甲状舌骨囊肿
- D、甲状腺腺瘤
- E、淋巴结炎症

【参考答案】：C

18、下述哪项不是 1 型糖尿病的临床特点

- A、对胰岛素敏感
- B、胰岛素释放曲线峰值延迟
- C、典型糖尿病临床症状
- D、可出现蜜月期
- E、易发生酮症

【参考答案】：B

19、男性，61 岁，3 个月来上腹部不适，纳差，早饱，体重下降，大便隐血(+)。下列哪项诊断可能性大

- A、胃溃疡
- B、慢性萎缩性胃炎
- C、胃癌
- D、慢性胰腺癌
- E、促胃液素瘤

【参考答案】：C

20、病因推断原则中，没有下列哪一条

- A、联系的强度
- B、剂量反应关系
- C、对联系进行统计学检验所得P值的大小
- D、因果关系的时间顺序
- E、研究中病因的量与发病率的量有相关关系

【参考答案】：C

21、COPD并发慢性肺心病，急性加重期最重要的治疗手段是

- A、应用强心剂
- B、应用利尿剂
- C、控制肺部感染
- D、应用血管扩张剂
- E、应用呼吸兴奋剂

【参考答案】：C

22、下述哪种肠梗阻最易引起肠绞窄

- A、肠结核引起的肠梗阻
- B、蛔虫性肠梗阻

- C、粘连性肠梗阻
- D、肠扭转
- E、肠道肿瘤

【参考答案】：D

23、外周免疫器官包括

- A、骨髓、淋巴结、脾脏
- B、胸腺、脾脏、黏膜、淋巴组织
- C、腔上囊、脾脏、扁桃体
- D、脾脏、淋巴结、其他淋巴组织
- E、扁桃腺、骨髓、淋巴结

【参考答案】：D

24、对于急性乳腺炎的治疗，下列哪项是不正确的

- A、托起乳房、理疗、局部热敷
- B、吸乳器吸净乳汁
- C、使用抗生素
- D、感染严重，终止哺乳
- E、切开引流

【参考答案】：E

25、现况调查中常见的偏性不包括

- A、选择偏性
- B、无应答偏性
- C、入院率偏性
- D、测量偏性

E、调查员偏性

【参考答案】：C

26、1%麻黄碱液的主要目的

A、收缩血管降低通透性

B、收缩鼻黏膜抑制腺体分泌

C、松弛平滑肌减轻鼻肺反射

D、收缩鼻黏膜改善鼻通气和鼻窦引流

E、收缩血管减轻炎症反应

【参考答案】：D

27、绝经后妇女出现男性化体征的可能原因是

A、FSH LH水平变化

B、雌、孕激素水平的变化

C、卵巢分泌睾酮上升而雌激素水平下降

D、促甲状腺素水平升高

E、生长激素水平升高

【参考答案】：C

28、以下哪项不是围绝经期的症状

A、血管舒缩失调症状：潮红、潮热、出汗等

B、接触性出血

C、神经心理症状

D、泌尿生殖器萎缩症状

E、月经不规律

【参考答案】：B

、推算预产期的最可靠依据是

- A、胎动始觉时间
- B、早孕反应开始时间
- C、末次月经第 1 日
- D、基础体温测定
- E、子宫底的高底

30、对构成比的描述以下哪个正确

- A、其合计应大于 100%
- B、其合计应小于 100%
- C、其合计应等于 100%
- D、其合计可大于 100%也可小于 100%
- E、以上都不对

【参考答案】： C

31、对于一个体重为 75kg 的人来讲，如果他 1 小时内饮 340g 啤酒（或 30g 烈性酒或 120g 果酒），其血流中的酒精浓度不会超过

- A、0.02%
- B、0.03%
- C、0.04%
- D、0.05%
- E、0.06%

【参考答案】： D

32、哪一种方法是治疗骨质疏松的最佳方案

- 、运动疗法和补钙
- B、单纯补钙
- C、多吃含钙食品
- D、多吃高蛋白食物
- E、多吃高蛋白食物和补充钙剂

33、男，40岁，因呕血急诊入院，查体：心率160次/分，呼吸急促，血压：60/30mmHg 估计其出血量大约为

- A、500~1500ml
- B、1000~2000ml
- C、1500~2500ml
- D、2000~3000ml
- E、>3000ml

【参考答案】：C

34、弱视是

- A、由于眼球先天异常引起矫正视力低于正常
- B、由于视网膜病变引起矫正视力低于正常
- C、由于视觉细胞的有效刺激不足引起矫正视力低于正常
- D、由于大脑皮质发育不全引起矫正视力低于正常
- E、由遗传造成

【参考答案】：C

35、粉剂适用于以下哪种皮肤病

- A、脓疱病

- 、脓癣
- C、寻常性银屑病
- D、无渗出的急性皮炎
- E、有渗出的急性皮炎

36、我国正常人眼压范围(mmHg)为

- A、9~20
- B、10~21
- C、9~21
- D、10~20
- E、11~21

【参考答案】： B

37、与支气管哮喘发作有关的因素为

- A、接触过敏原
- B、化学物质刺激
- C、感染
- D、遗传因素
- E、以上都是

【参考答案】： E

38、下列除哪一条外，都是影响喉头可能造成死亡的原因

- A、水肿
- B、神经麻痹
- C、血肿

、碎骨片移位

E、喉痉挛

39、病态窦房结综合征(病窦)心电图表现为

A、持续而显著的窦性心动过缓(心率 50 次 / 分，且并非由于药物所致

B、表现为心动过缓-心动过速综合

C、可出现窦性停搏与窦房阻滞

D、房室交界性逸搏心律

E、以上都是

【参考答案】： E

40、残疾一级预防的措施是

A、健康的生活方式

B、及时的伤病治疗

C、心理健康

D、防止继发残疾

E、避免各种残疾因素

【参考答案】： E

41、老年瘙痒症最常见的原因是

A、季节干燥

B、生活习惯

C、皮肤干燥

D、微生物

、皮肤病早期

42、52 岁男性，突发脑出血，头痛，呕吐，昏迷，血压 25 / 12kPa，应迅速给予

- A、止血治疗
- B、降血压治疗
- C、降颅压治疗
- D、维持生命体征
- E、防治血管痉挛

【参考答案】：C

43、心源性休克最常继发于

- A、风心病
- B、高心病
- C、扩张性心肌病
- D、心肌炎
- E、急性心肌梗死

【参考答案】：E

44、分泌性腹泻可见于下列疾病，但除外

- A、慢性肠炎
- B、霍乱
- C、血管活性肽瘤
- D、促胃液素瘤
- E、小肠吸收不良综合征

、重症肺炎发生腹胀大多因为

- A、低钠血症
- B、低钾血症
- C、中毒性肠麻痹
- D、消化不良
- E、肠梗阻

【参考答案】： C

46、肺癌时，肿瘤压迫或侵犯邻近器官引起的症状，错误的是

- A、霍纳综合征
- B、声音嘶哑
- C、吞咽困难
- D、上腔静脉阻塞综合征
- E、下腔静脉阻塞综合征

【参考答案】： E

47、最常见的银屑病类型

- A、红皮病型
- B、脓疱型
- C、关节病型
- D、泛发型
- E、寻常型

【参考答案】： E

48、急性肾炎出现轻度贫血的最主要原因是

- A、缺铁
- B、促红细胞生成素减少
- C、水钠潴留，血液稀释
- D、骨髓受抑制
- E、红细胞寿命缩短

【参考答案】：C

49、午时茶适用于

- A、暑湿感冒，脘腹胀痛，呕吐泄泻
- B、风热感冒，头痛，咽喉疼痛
- C、感冒风寒，内伤积食
- D、头痛咳嗽，咽痒鼻塞
- E、中暑，头晕

【参考答案】：C

50、男，35岁，饮酒及大量进食后1小时突发上腹刀割样疼痛，查血压80 / 60mmHg 腹膜刺激征阳性。最可能的诊断是

- A、消化性溃疡穿孔
- B、急性阑尾炎穿孔
- C、急性出血坏死性胰腺炎
- D、胆道蛔虫症
- E、急性胆囊炎

【参考答案】：C

51、对于抽样误差，恰当的为

- A、样本统计量与总体参数之间的差别

- B、在搜集资料的过程中由于过失而产生的误差
- C、由于抽样产生的各观察值之间的差别
- D、抽样误差的大小是不可计算的
- E、以上均正确

【参考答案】：A

52、对乙肝病毒感染具有保护作用的是

- A、抗核抗体
- B、抗 HBe
- C、抗 HBs
- D、抗 HBc
- E、DNA聚合酶

【参考答案】：C

53、关于小儿牙齿，以下哪种说法最准确、最全面

- A、乳牙是未钙化的牙齿，因而不如恒牙坚硬耐磨
- B、一般若 10 个月未出牙，应高度警惕先天无牙胚
- C、共有 20 个乳牙，乳牙萌出时间一般为 4~12 个月龄
- D、一般于 4~10 个月龄时萌出
- E、乳牙萌出顺序无个体差异

【参考答案】：C

54、男，72 岁，进行性尿频、排尿困难 3~4 年，近 2 个月来症状加重，表现为尿线细、无力，排尿时间延长及尿后滴沥。检查：膀胱区充盈，尿道外口及尿道无异常。B 超测残余尿为 250ml。血前列腺表面抗原(PSA)正常。首先考虑的诊断是

- A、前列腺癌合并慢性尿潴留

- B、神经源性膀胱炎
- C、膀胱痉挛合并慢性尿潴留
- D、前列腺增生合并慢性尿潴留
- E、尿道狭窄合并慢性尿潴留

【参考答案】：D

55、老年男性，因冠心病服用阿司匹林后恶心，呕吐咖啡样物约300ml，排黑便200g，头晕心悸，无腹痛，查体：BP14 / 11kPa，P102次 / 分，心音低钝，心律齐，双肺呼吸音清，腹软，上腹正中压痛，无反跳痛，肝脾未触及。关于出血原因，最可能的诊断为

- A、食管静脉曲张破裂
- B、消化性溃疡
- C、胃癌
- D、马洛里-魏斯综合征(Mallory-Weiss 综合征)
- E、急性胃黏膜病变

【参考答案】：E

56、男性27岁，转移性右下腹痛20小时，伴呕吐1次，诊断为急性阑尾炎。一般来说，导致发病的最可能的原因是

- A、抵抗力下降
- B、饱餐后剧烈运动
- C、饮食不洁
- D、阑尾腔阻塞
- E、大量细菌进入机体

【参考答案】：D

57、对于胃溃疡的诊断

- A、餐后半小时至2小时上腹痛，下餐缓解
- B、餐后立即上腹痛——剧烈持续
- C、空腹夜间上腹痛——进餐缓解
- D、进餐后脐周痛——排便后缓解
- E、进餐后上腹痛——逐渐缓解

【参考答案】：A

58、对脑血管病(卒中)病人康复治疗时，利用病理无能无力模式的方法是

- A、PNF方法
- B、Bobath 方法
- C、运动再学方法
- D、Brunnstrom 方法
- E、Rood 方法

【参考答案】：D

59、问卷的缺点不包括

- A、客观性差，有时效率较低
- B、所获得资料不适于计算机处理
- C、难以评判回答者的误解或错误
- D、不适于文盲人群
- E、问卷设计不好，将影响整个调查质量，很难补救

【参考答案】：B

60、除下列哪项外均能导致缺铁性贫血

- A、胃大部切除术后

- B、痔疮出血
- C、月经过多
- D、长期素食
- E、脾功能亢进

【参考答案】： E

61、45 岁，女，双下肢大隐静脉曲张 12 年，近 2 年出现左下肢瘙痒，足靴区色素沉着，皮下硬结，湿疹。并有时出现轻度下肢肿胀。以下临床表现中哪项不是由于皮肤营养性变化引起的

- A、瘙痒
- B、湿疹
- C、皮下硬节
- D、下肢肿胀
- E、色素沉着

【参考答案】： D

62、用两种不同成分的培养基(分别为 701 批与 702 批)分布培养鼠疫杆菌，重复试验单元数为 5 个，将 48 小时内各试验单元上生长的活菌数记录如下

701 批：488490123171

702 批：9011612422584

那么该资料的类型为

- A、计数资料
- B、计量资料
- C、等级资料
- D、以上均不是

【参考答案】： B

63、对于腰椎间盘突出症患者的保健疗法，哪项是不恰当的

- A、最好长期佩带腰围
- B、腰背肌锻炼
- C、长期坐位工作者，需注意桌椅的高度，定时改变姿势
- D、寒冷季节，腰背部注意保暖
- E、避免突发性的腰部活动

【参考答案】： A

64、下述辅助检查中，哪一项不符合一般重度妊高征的血液生化改变

- A、血浆蛋白降低
- B、尿酸升高
- C、二氧化碳结合力升高
- D、尿素氮升高
- E、血液浓缩

【参考答案】： C

65、对固定性药疹下列哪一项是不恰当的

- A、是特定药物引起的药疹
- B、停药致敏药物后可以痊愈
- C、边界清楚的红斑
- D、经常发作可使病变数增加
- E、有水疱发生

【参考答案】： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/226104222110010224>