

2023-24 年广西壮族自治区藤县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库【达标题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 促胃肠动力药是()

- A: 甲氧氯普胺
- B: 肾上腺素
- C: 阿托品
- D: 熊去氧胆酸

答案：A

2. 金刚烷胺与多潘立酮合用

- A: 增加锥体外系不良反应的风险
- B: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)
- C: 增加肾毒性
- D: 可增加抗胆碱不良反应的危险

答案：A

3. (2017 年真题) 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162mmHg，心率 72 次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 氨氯地平+氢氯噻嗪
- B: 利血平+氨苯蝶啶
- C: 特拉唑嗪+氢氯噻嗪

D: 硝酸甘油+美托洛尔

答案：A

4. (2018 年真题) 肾病综合征患者长期使用泼尼松时，用法为隔日清晨给药一次，这种给药方法的原理是 ()

A: 利用人体糖皮质激素分泌的昼夜节律性原理

B: 利用糖皮质激素的脉冲式分泌原理

C: 利用糖皮质激素与盐皮质激素互为补充的原理

D: 利用外源性糖皮质激素的生物等效原理

答案：A

5. 治疗金黄色葡萄球菌感染导致的骨髓炎首选

A: 头孢克洛

B: 青霉素

C: 克林霉素

D: 阿米卡星

答案：C

6. 作用于远曲小管近端的中效利尿药是

A: 氨苯蝶啶

B: 氢氯噻嗪

C: 呋塞米

D: 乙酰唑胺

答案：B

7. 氯霉素类

A: 禁用于 8 岁以下儿童

B: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

C: 禁用于早产儿、新生儿

D: 禁用于胆道阻塞患者

答案: C

8. 2~3 分钟起效，5 分钟达最大效应的硝酸酯类药物是

A: 硝苯地平

B: 哌唑嗪

C: 普萘洛尔

D: 硝酸甘油

答案: D

9. 关于 α 葡萄糖苷酶抑制剂的作用特点描述，不正确的是

A: 口服吸收很少

B: 可单用于老年患者或餐后高血糖患者

C: 临床用于各型糖尿病

D: 易导致低血糖

答案: D

10. 仅在体内有抗凝血作用的药物是

A: 肝素

B: 华法林

C: 尿激酶

D: 噻氯匹定

答案: B

11. 临床上用于控制子痫发作的是

A: 卡巴西平

B: 苯妥英钠

C: 苯巴比妥

D: 硫酸镁

答案: D

12. 抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶 IV 的抗菌药是

A: 甲硝唑

B: 喹诺酮类

C: 苯唑西林

D: 四环素

答案: B

13. 具有杀灭痤疮丙酸杆菌作用，用于治疗痤疮的药品是

A: 异维 A 酸

B: 阿达帕林

C: 过氧苯甲酰

D: 维 A 酸

答案: C

14. 下列说法中错误的是

A: 他莫昔芬是目前临床上最常用的乳腺癌内分泌治疗药

B: 芳香氨酶抑制剂主要包括来曲唑和阿那曲唑

C: 芳香氨酶抑制剂可用于绝经前乳腺癌患者

D: ER 阳性者，绝经前、后均可使用他莫昔芬

答案: C

15. 治疗肺孢子菌肺病的首选药物的是()

A: 磺胺嘧啶

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 磺胺米隆

D: 柳氮磺吡啶

答案: B

16. 青霉素类用药后发生过敏性休克，属于

A: IV型变态反应

B: III型变态反应

C: II型变态反应

D: I型变态反应

答案: D

17. 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是()

A: 精蛋白锌胰岛素注射液

B: 甘精胰岛素注射液

C: 普通胰岛素注射液

D: 预混胰岛素注射液

答案: C

18. 可乐定的降压机制是()

A: 扩张血管

B: 影响NA释放

C: 激动外周 α

D: 激动中枢突触后膜和外周突触前膜的 α

答案: D

19. 下列哪类药物属于快速杀菌药()

A: 氯霉素类

B: 氨基糖苷类

C: 多黏菌素 B

D: 红霉素

答案: B

20. 伊曲康唑属于

A: 抗生素类

B: 吗啉类

C: 丙烯胺类

D: 唑类

答案: D

21. 对曲霉无效的药物是

A: 伏立康唑

B: 氟康唑

C: 两性霉素 B

D: 伊曲康唑

答案: B

22. 四环素类抗菌药物抗菌谱广，但无抗菌作用的是

A: 铜绿假单胞菌

B: 立克次体

C: 支原体

D: 衣原体

答案: A

23. (2019 年真题) 关于氢氯噻嗪临床应用的说法，错误的是 ()

A: 服药期间应关注有无肌痉挛、耳鸣、听力障碍等症状

B: 对血糖和尿酸无影响，可长期服用

C: 老年患者服药后易发生低血压及肾功能损害

D: 与磺胺类药物存在交叉过敏反应

答案: B

24. 糖皮质激素诱发或加重感染的主要原因是()

A: 激素用量不足，无法控制症状

B: 患者对激素不敏感，未反映出相应的疗效

C: 激素促使许多病原微生物繁殖

D: 抑制机体的免疫功能

答案: D

25. 可用于治疗乙型肝炎病毒感染的药物是

A: 金刚烷胺

B: 阿昔洛韦

C: 恩替卡韦

D: 更昔洛韦

答案: C

26. 下列不属于胃肠解痉药的是

A: 山莨菪碱

B: 阿托品

C: 多潘立酮

D: 颠茄

答案: C

27. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 顺铂

B: 泼尼松

C: 奥沙利铂

D: 吉西他滨

答案: A

28. 急性化脓性中耳炎的局部治疗方案正确的是

A: 鼓膜穿孔前用无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用 2%酚甘油滴耳序贯治疗

B: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，再用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道以防止进一步感染

C: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

D: 鼓膜穿孔前可使用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，鼓膜穿孔后可用 2%酚甘油滴耳，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

答案: C

29. 没有镇静和"宿醉"现象，不属于巴比妥类和苯二氮

A: 地西洋

B: 佐匹克隆

C: 异戊巴比妥

D: 阿普唑仑

答案: B

30. 羟基脲属于()

A: 胸腺核苷合成酶抑制剂

B: 核苷酸还原酶抑制剂

C: DNA 多聚酶抑制剂

D: 二氢叶酸还原酶抑制剂

答案: B

31. 患者女，55 岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

A: 2 周

B: 3 周

C: 4 周

D: 1 周

答案：A

32. 蒽醌类抗肿瘤药柔红霉素可引起心脏毒性，临床应用的解毒方案是（）

A: 在用柔红霉素前 30min, 使用柔红霉素 2 倍量的氟马西尼

B: 在用柔红霉素前 30min, 使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生

C: 在用柔红霉素后 30min, 使用柔红霉素 2 倍量的右雷佐生

D: 在用柔红霉素同时, 使用柔红霉素等量的右雷佐生

答案：B

33. 基于甲状旁腺激素研发出的促进骨形成的药是

A: 特立帕肽

B: 唑来膦酸

C: 雷洛昔芬

D: 依普黄酮

答案：A

34. 对钙及骨矿物质具有极强的吸附性，主要分布在骨骼中发挥疗效的药物是（）

A: 阿仑膦酸钠

- B: 帕米膦酸二钠
- C: 依替膦酸二钠
- D: 氯屈膦酸二钠

答案：D

35. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的药物是

- A: 阿格列汀
- B: 利拉鲁肽
- C: 伏格列波糖
- D: 那格列奈

答案：C

36. 下述药物中属于减鼻充血药的是

- A: 盐酸麻黄碱溶剂
- B: 链霉素溶剂
- C: 复方薄荷樟脑溶剂
- D: 色甘酸钠溶剂

答案：A

37. 毛花昔丙经弱碱水解去乙酰化的产物是

- A: 地高辛
- B: 毛花昔丙（西地兰 C）
- C: 洋地黄毒苷
- D: 去乙酰毛花昔（西地兰 D）

答案：D

38. 人工合成的第一个应用于临床的单环 β -内酰胺类抗生素是()

- A: 头孢唑林

- B: 氨曲南
- C: 舒巴坦
- D: 氨苄西林

答案：B

39. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

- A: 铁剂不应与浓茶同服，浓茶含有的鞣酸可与铁形成沉淀，使铁剂的吸收减少
- B: 宜在餐后或餐时服用
- C: 治疗期间应定期检查血象和血清铁水平
- D: 进食可促进铁剂的吸收

答案：D

40. 其缓释片剂应与食物同服的是

- A: 克拉霉素
- B: 红霉素
- C: 氨曲南
- D: 阿奇霉素

答案：A

41. 与多柔比星合用或配伍与多柔比星合用或配伍

- A: 阿糖胞苷
- B: 利福平
- C: β 受体阻断剂
- D: 甲氨蝶呤

答案：A

42. (2018 年真题) 属于促凝血因子合成的药物是 ()

- A: 卡巴克络
- B: 鱼精蛋白
- C: 蛇毒血凝酶
- D: 甲萘氢醌

答案: D

43. (2016 年真题) 耐甲氧西林金黄色葡萄菌感染宜首选的抗菌药物是

- A: 头孢曲松
- B: 罗红霉素
- C: 头孢他啶
- D: 利奈唑胺

答案: D

44. 体内、外均有抗凝血作用的药物是

- A: 维生素 B12
- B: 维生素 K
- C: 肝素
- D: 香豆素类

答案: C

45. 可导致坏死性结肠炎的是

- A: β 受体阻断剂
- B: 甲氨蝶呤
- C: 阿糖胞苷
- D: 利福平

答案: C

46. 以下有关 ACEI 药物治疗高血压的监护叙述中，不正确的是

- A: 心力衰竭加重所致的咳嗽应当停用 ACEI
- B: 我国对 ACEI 在肾病方面的建议：用药初 2 个月血肌酐升幅大于 30%~50%时应停药
- C: 对已接受多种或大剂量利尿剂的患者，在首剂治疗时注意低血压反应
- D: 对伴低钠血症、脱水、低血容量患者在首剂治疗时注意低血压反应

答案：A

47. 华法林应用过量可选用的拮抗药是()

- A: 氨基己酸
- B: 鱼精蛋白
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 维生素 K

答案：D

48. 常见不良反应为关节痛的药物是()

- A: 对氨基水杨酸
- B: 异烟肼
- C: 利福平
- D: 吡嗪酰胺

答案：D

49. 可用于洋地黄中毒导致的室上性心律失常的药物首选

- A: 奎尼丁
- B: 氟西汀
- C: 美西律
- D: 苯妥英钠

答案：D

50. 新生儿出血宜选用

- A: 香豆素类
- B: 维生素 K1
- C: 肝素
- D: 维生素 B12

答案：B

51. 硝酸甘油抗心绞痛的机制主要是

- A: 减慢心率，降低心肌耗氧量
- B: 阻断 β 受体，降低心肌耗氧量
- C: 选择性扩张冠脉，增加心肌供血
- D: 扩张静脉，降低前负荷；扩张动脉，降低心肌耗氧

答案：D

52. 以下食物与华法林钠不存在相互作用的是

- A: 洋葱
- B: 红叶苋菜
- C: 脱皮黄瓜
- D: 菠菜叶

答案：C

53. 使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是

- A: 果糖
- B: 硫酸镁
- C: 氯化钙
- D: 氯化钾

答案：C

54. 通过监测国际标准化比值（INR）调整给药剂量的药物是（）

A: 丙戊酸钠

B: 地高辛

C: 华法林

D: 茶碱

答案：C

55. 抑制细菌依赖性 DNA 的 RNA 聚合酶，阻碍 mRNA 合成的药物是

A: 利福平

B: 磺胺嘧啶

C: 两性霉素

D: 氧氟沙星

答案：A

56. 属于植物制剂，用于治疗前列腺增生的药物是（）

A: 特拉唑嗪

B: 十一酸睾酮

C: 非那雄胺

D: 普适泰

答案：D

57. （2019 年真题）患者女，58 岁，血糖升高 10 年，口服二甲双胍治疗，高血压病史 5 年，未规律治疗，近期查体：血压 158/95mmHg，尿常规示蛋白尿（+++），适宜该患者使用的降压药物是（）

A: 普萘洛尔

B: 硝苯地平

C: 依那普利

D: 甲基多巴

答案: C

58. 噻托溴铵平喘的主要机制是 ABCDE

A: 抑制白三烯受体

B: 拮抗 M 胆碱受体

C: 激动肾上腺素 β_2 受体

D: 阻断腺苷受体

答案: B

59. 布美他尼属于下列哪类利尿药

A: 中效利尿药

B: 强效利尿药

C: 保钾利尿药

D: 碳酸酐酶抑制药

答案: B

60. 镇静作用明显的 H

A: 西咪替丁

B: 阿司咪唑

C: 组胺

D: 苯海拉明

答案: D

61. 对革兰阳性菌作用强，对革兰阴性菌作用弱的药物是

A: 第二代头孢菌素

B: 第一代头孢菌素

C: 第四代头孢菌素

D: 第三代头孢菌素

答案: B

62. 对某些癌症患者，在抗癌药物治疗后，还需使用重组人粒细胞刺激因子，其目的是

A: 预防出血过多

B: 预防过敏反应

C: 预防粒细胞缺乏

D: 预防癌症复发

答案: C

63. 属于助消化药的是()

A: 胃蛋白酶

B: 胶体果胶铋

C: 莫沙必利

D: 奥美拉唑

答案: A

64. 铂类化合物

A: 喜树碱类

B: 顺铂

C: 丝裂霉素

D: 环磷酰胺

答案: B

65. 长期大量服用维生素 A 会出现()

A: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

- B: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- C: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活
- D: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、体重减轻、贫血、眼球突出等中毒现象

答案：D

66. 患者。女,43 岁,左乳浸润性导管癌术后放、化疗 3 年后复发左肺门、左锁骨上、左腋窝淋巴结转移现采用卡培他滨+多西他赛行复发后第一周期化疗化疗后第 2 日,患者出现重度恶心、呕吐,根据化疗药物致吐分级,宜选用的对症治疗药物是 ()

- A: 甲氧氯普胺
- B: 奥美拉唑
- C: 地塞米松
- D: 昂丹司琼

答案：D

67. 属于 5a 还原酶抑制剂的是

- A: 坦洛新
- B: 度他雄胺
- C: 西地那非
- D: 他达拉非

答案：B

68. 苯巴比妥与口服抗凝药合用 ()

- A: 子宫内膜突破性出血
- B: 代谢加快而失效
- C: 代谢加速而导致意外怀孕
- D: 抑制排酸作用

答案：B

69. 一名癫痫大发作的患者，因服用过量的苯巴比妥而引起昏迷，呼吸微弱，送医院急救。请问不该采取哪项措施

- A: 静滴呋塞米
- B: 静滴氯化铵
- C: 人工呼吸
- D: 静滴碳酸氢钠

答案：B

70. 以下可作为缓解轻、中度急性哮喘症状首选药的是

- A: 氨茶碱
- B: 沙美特罗
- C: 孟鲁司特
- D: 特布他林

答案：D

71. 属于促凝血因子合成的药物是()

- A: 甲萘氢醌
- B: 蛇毒血凝酶
- C: 卡巴克络
- D: 鱼精蛋白

答案：A

72. 可致肌痛、骨关节病损、跟腱断裂的药物

- A: 大环内酯类
- B: 氨基糖苷类
- C: 氟喹诺酮类

D: 四环素类

答案：C

73. 大剂量碘剂

A: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状

B: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌

C: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧

D: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成

答案：C

74. 人体主要的热能来源是

A: 葡萄糖

B: 氨基酸

C: 维生素

D: 果糖

答案：A

75. ()用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

A: 克林霉素

B: 红霉素

C: 万古霉素

D: 克拉霉素

答案：C

76. 广泛用于各种吸虫药的治疗，还能用于绦虫病的药物是

A: 甲硝唑

B: 三苯双脒

C: 吡喹酮

D: 乙胺嘧啶

答案: C

77. 加重洋地黄中毒的易感因素为

A: 低镁血症

B: 伴有房颤的心功能不全

C: 甲状腺功能减退症

D: 低钾血症

答案: C

78. 对焦虑型、夜间醒来次数较多或早醒者可选用的苯二氮?类镇静催眠药是

A: 非苯二氮?类药物

B: 苯二氮?类药物

C: 氟西洋

D: 地西洋

答案: C

79. 抑制 H⁺, K⁺-ATP 酶活性的药物是

A: 氢氧化铝

B: 雷尼替丁

C: 奥美拉唑

D: 哌仑西平

答案: C

80. 作用机制是竞争雌激素受体的是

A: 巯嘌呤

B: 枸橼酸他莫昔芬

C: 吉非替尼

D: 紫杉醇

答案: B

81. 依普黄酮可用于

A: 妊娠期及哺乳期妇女

B: 低钙血症者

C: 绝经期超过 2 年以上的妇女

D: 儿童及青少年

答案: C

82. 下列唯一被批准用于临床的选择性胆固醇吸收抑制剂是

A: 非诺贝特

B: 依折麦布

C: 瑞舒伐他汀

D: 盐酸

答案: B

83. 属于雄激素类的是

A: 甲地孕酮

B: 睾酮

C: 己烯雌酚

D: 他莫昔芬

答案: B

84. 属于非麻醉性镇痛药的是

A: 美沙酮

B: 布洛芬

C: 吗啡

D: 可待因

答案: B

85. 患者女，59 岁，既往高脂血症病史 5 年，心功能 II 级。因发现血压升高 7 天入院。入院查体血压 172/95mmHg，心率 62 次 / 分。该患者目前服用的药物除抗高血压药外有辛伐他汀。

A: 普伐他汀

B: 辛伐他汀

C: 阿托伐他汀

D: 洛伐他汀

答案: C

86. (2019 年真题) 依托泊苷注射液的溶媒选择要求是 ()

A: 5%葡萄糖注射液稀释

B: 先用氯化钠注射液溶解，再用 5%葡萄糖注射液进一步稀释

C: 先用乳酸钠注射液溶解，再用氯化钠注射液或 5%葡萄糖注射液进一步稀释

D: 氯化钠注射液稀释

答案: D

87. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食，增强运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片 20mg / d 治疗。

A: CK

B: Cr

C: BUN

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: AST

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/226114034105011030>